

Suomen loispistiäisluettelo (Hymenoptera, Parasitica)

Osa 3. heimo Ichneumonidae, alaheimo Cryptinae

Martti Koponen, Reijo Jussila & Veli Vikberg

Koponen, Martti, Jussila, Reijo & Vikberg, Veli: Suomen loispistiäisluettelo (Hymenoptera, Parasitica). Osa 3. heimo Ichneumonidae, alaheimo Cryptinae. [A check list of Finnish Hymenoptera, Parasitica, part 3. family Ichneumonidae, subfamily Cryptinae.] -Sahlbergia 4: 19-52.

491 species of Cryptinae (Ichneumonidae) are listed from present-day Finland. 40 species are reported as new to the area.

Koponen, M., Department of Applied Zoology, P.O. Box 27 (Viikki C), FIN-00014 University of Helsinki, Finland

Jussila, R., Krouvintie 92, FIN-21330 Paattinen, Finland.

Vikberg, V., Liinalammintie 11 as 6, FIN-14200 Turenki, Finland

Johdanto

Tämä loispistiäisluettelomme kolmas osa käsittää heimosta Ichneumonidae alaheimon Cryptinae (Opinion 1757). Alaheimosta on käytetty myös nimiä Gelinae (Townes 1970), Hemitelinae (Fitton & Gauld 1976) ja Phygadeuontinae (Fitton & Gauld 1978).

Luettelossa käytetty suvun nimi *Thaumatogelis* ja sen synonyymi *Cryptogelis* eivät täytä nimitys- ja nimitys-vaatimuksia (Carlson 1979). Luettelo on laadittu samaan tapaan kuin edelliset osat (Koponen & al. 1995, 1997).

Tämä kirjoitus on samalla kirjallisuuskatsaus Suomen Cryptinae-lajeista. Kunkin lajin kohdalla on kirjallisuusviittaukset. Lajien esiintymistä nyky-Suomen alueella on pyritty varmistamaan kokoelmien avulla. Tässä on käytetty hyväksi Helsingin yliopiston Luonnontieteellisen keskusmuseon (lyhennys MZH) ja Soveltavan eläintieteen laitoksen (DAZH) sekä Jussilan (RJ) ja Vikbergin (VV) kokoelmia. Luettelomme tässä osassa on 491 lajia nyky-Suomesta. Niistä 40 on alueelle uusia. Lisäksi luettelossa on hakasulukeissa 11 lajia, jotka on ilmoitettu vain alueilta, jotka jatkosodan jälkeen luovutettiin Neuvostoliitolle.

Suomelle uusia lajeja

Pleurogyrus cyclogaster (Thomson, 1884). RJ:ssa on 1 ♂ (täysin naaraan näköinen), St: Huittinen, Kyttälänhaara (679:26), 5.8.1996, R. Jussila leg. ja 1 ♀ Ta: Urjala, 1.7.1965, T. Reilin leg. Laji on kuin *P. pumilus* (Hellen), mutta keskiruumis on propodeumia lukuunottamatta kiiltävä ja tuntosarvien tyvi oranssi.

Aclastus eugracilis Horstmann, 1980. RJ:ssa on 1 ♀, Ab: Korppoo, Löholm (669:19), 18.6.1992, R. Jussila leg.

Aclastus flavipes Horstmann, 1980. RJ:ssa on 1 ♂ (jota ei ole vielä kuvattu), Al: Lumparland (668:12), 30.6.1984, R. Jussila leg.

Polyaulon stiaivnicensis (Capek, 1956). DAZH:ssa on 1 ♀, N: Hanko (6649:290), 17. 6. 1980 M. Koponen leg., V. Vikberg det.

Dichrogaster genalis (Habermehl, 1925). DAZH:ssa ja RJ:ssa on yhteensä 30 ♂; Ab: Vihti, Siikajärvi (668:36), 23.8.1964, 11.8.1967, V. J. Karvonen leg.; N: Helsingin pit. (668:38), 14.8.1967, V. J. Karvonen leg., 7.9.1968, Eero Karvonen, Helsingin mlk. (667:38), 25.7.-20.8.1972, Karvonen leg., Helsinki (667:38), 2.-9.8.1966, 5.-21.8.1967, 15.8.-4.9.1968, 13.-

20.8.1972, Karvonen leg.; St: Pori (684:20), 20.8.1968, V. Lauro leg.

Gelis alopecosae Horstmann, 1986. Hellén (1967) kuvasi uuden suvun *Arctodeuon*, jonka tyyppilajiksi hän nimesi lajin *Hemiteles glacialis* Holmgren. Suvun kuvaus ei kuitenkaan sovi *Gelis glacialis* (Holmgren)-lajiin. Suomalaiset yksilöt 1 ♀: Ok: Suomussalmi, Sorsakoski leg., 2 ♀; Li: Utsjoki, W. Hellén leg. (ZMH) ovatkin myöhemmin kuvattua lajia *Gelis alopecosae* (det. V. Vikberg). Laji on kasvatettu Ruotsissa Lycosidae-heimon hämähäkin *Alopecosa aculeata* (Clerck) munista (Horstmann 1986b).

Gelis bicolor (Villers, 1789). RJ:ssa on 18 ♀♀ (osa det. Martin Schwarz) maakunnista Al, Ab, St, Ta ja Oa. Tämä on pieni tummahko laji, jonka pää ja takaruumis 2. jaokkeesta alkaen ovat mustat.

Gelis discendens (Foerster, 1850). RJ:ssa on 20 ♀; Ab: Korppoo, Lökhalm (669:19), 6.1991, 6.1992 R. Jussila leg., Turku, Paattinen (672:24), 8.7.1984, J. Jussila leg.; St: Huittinen, Kytälänhaara (669:19), 27.7.1991, 3.7.1996, R. Jussila leg., Pori, Ahlaisten Lampi (687:21), 14.7.1994, R. Jussila leg., Rauman mlk., Sorkka (699:20), 2.7.1986, R. Jussila leg.,. Kuuluu *bicolor*-lajiryhmään. Musta, tuntosarvien tyvi, proja mesothorax, takaruumiin 3 ensimmäistä tergiittiä (ja neljännen apikaalireuna) ja jalat punaiset (reidet enemmän tai vähemmän tummat).

Gelis longulus (Zetterstedt, 1838) = *speculator* (Foerster, 1851). DAZH:ssa ja RJ:ssä on yhteensä 5 ♂ ja 12 ♀; Ab: Korppoo Lohm (667:20), 5.8.1995, Nauvo Nötö (666:20), 29.7.1992, R. Jussila leg., Turku Pomponrahka (671:23), 27.6.-21.7.1993, V.-M. Mukkala leg.; N: Espoo, 5.-20.6.1919, 15.6.1927, kasvatettu pussikoista *Siederia* sp. (Lepidoptera, Psychidae), Karvonen leg., Helsinki (668:39), 11.-25.7.1977, J. Karvonen leg., Kirkkonummi, Siikajärvi (668:36), 19.7.1970, V. J. Karvonen leg.; Kb: Pyhäselkä (692:65), 12.7.1988, P. Turunen leg.; Oa: Ilmajoki (697:24), 12.6.1988, (697:27), 2.7.-20.8.1989, V.-M. Mukkala leg.; Om: Haapavesi

Köyryrimpi (712:42), 10.7.1995, R. Jussila leg.. Lisäksi RJ:ssa on mahdollisia koiraita yhteensä 5, Al: Föglö, Ka: Virolahti, St: Pori Reposaari, Ta: Jokioinen.

Gelis thomsoni (Schmiedeknecht, 1933). RJ:ssa on 2 ♀, Ab: Sauvo, Karuna (669:25), 24.6.1970, Turku, Ruissalo (671:23), 3.7.1991, R. Jussila leg. Lajilla on hyvin lyhyet, melkein näkymättömät tynkäsiivet sekä lyhyt, suora munanasetin, jonka kärjessä nodus ja hampaat ovat selvät (Horstmann 1993, Schwarz 1994).

Endasys bicolor (Lundbeck, 1896). DAZH:ssa on 8 ♂ ja RJ:ssa 3 ♀; Ab: Vihti (669:35), 26.7.1970, V. J. Karvonen leg.; N: Snappertuna (665:31), 23.7.1969, Karvonen leg.; Tb: Toivakka (688:45), 30.6.1976, Eila Tiihonen leg.; Le: Enontekiö, Kilpisjärvi (767:25), 13.-14.7.1964, 12.-15.7.1966, V. J. Karvonen leg.; Li: Utsjoki Kevo (774:50), 11.7.1956, 12.7.1961, R. Jussila leg.

Endasys eurycerus (Thomson, 1896). DAZH:ssa ja RJ:ssa on 2 ♂; N: Helsinki (667:38), 20.-30.6.1974, Karvonen; St: Huittinen, Ailus (679:26), 28.6.1995, R. Jussila leg..

Endasys testaceipes (Brischke, 1891). DAZH:ssa on 12 ♂; Ab: Vihti, Siikajärvi (668:36), 20.8.1959, 18.6.1960, 23.6.1963, 9.8.1967, 15.6.1968, 22.6.1973, V. J. Karvonen leg., 6.1971, 1.-13.7.1972, 24.6.-6.7.1973, A. Petramaa leg.; Tb: Toivakka (688:45), 2.7.1977, Eila Tiihonen leg.

Charitopes brunneus (Morley, 1907). RJ:ssa on yksilöitä ainakin Turusta (Ab) ja Vaasasta (Oa). Townesin (1983) mukaan se on lajin *Charitopes areolaris* (Thomson, 1884) synonyymi. Pidämme niitä kuitenkin eri lajeina.

Orthizema eleganticornis (Schmiedeknecht, 1933). DAZH:ssa on 4 ♀; Ab: Vihti, Siikajärvi (668:36), 18.7.1964, 8.8.1965, 23.8.1966, 12.7.1971, V. J. Karvonen leg.

Orthizema subannulata (Bridgman, 1883). DAZH:ssa on 11 ♀ ja RJ:ssa 10 ♂; Ab: Korppoo, Turku, R. Jussila leg., Vihti, Siikajärvi (668:36), 20.6.1955, 21.6.1958, 21.7.1962, 18.8.1964,

25.6.1966, V. J. Karvonen leg.; N: Kauniainen (667:37), 10.-19.7.1972, Karvonen, Kirkkonummi (667:36), 22.6.1962, V. J. Karvonen leg., Kirkkonummi, Siikajärvi (668:36), 24.8.1955, 5.6.1960, 18.6.1962, 7.6.1967, V. J. Karvonen leg., Siuntio, R. Jussila leg.; Ka: Virolahti, R. Jussila leg.; Ta: Kuhmoinen, R. Jussila leg.; Tb: Saarijärvi, R. Jussila leg.; Sb: Nilsiä, R. Jussila leg.; ObN: Tervola; R. Jussila leg.; Li: Utsjoki, R. Jussila leg.

Theroscopus trochanteratus (Thomson, 1884). DAZH:ssa on 2 ♀ ja RJ:ssa 2 ♂; Ab: Korppoo, Björkö (669:19), 6.8.1985, R. Jussila leg., Vihti, Siikajärvi (668:36), 8.8.1965, 27.8.1966, V. J. Karvonen leg.; St: Mouhijärvi (683:28), 29.6.1993, R. Jussila leg.

Phygadeuon alpinus (Thomson, 1884). DAZH:ssa ja RJ:ssa on yhteensä 6 ♂ ja 18 ♀; Le: Enontekiö Saana, W. Hellén leg.; Li: Inari (764:50), 2.7.1968, Karvonen leg., Inari, Ivalo (761:52), 6.-7.7.1965, 25.-26.6.1969, V. J. Karvonen leg., Utsjoki (775:50), 1.-4.7.1967, Karvonen leg.

Phygadeuon brevitarsis Thomson, 1884. DAZH:ssa on 6 ♂ ja 4 ♀; Ab: Vihti (669:35), 29.7.1961, V. J. Karvonen leg., Vihti, Siikajärvi (668:36), 13.7.1963, 8.8.1965, 21.8.1968, V. J. Karvonen leg.; N: Helsinki (667:38), 4.8.1966, Karvonen leg., Kirkkonummi, Siikajärvi (668:36), 14.8.1953, 22.8.1954, V. J. Karvonen leg.; Ka: Virolahti (671:53), 13.-24.8.1975, Karvonen leg.; Sa: Hirvensalmi (684:46), 28.7.1972, O. Ranin leg.

Phygadeuon crassicornis (Gravenhorst, 1829). DAZH:ssa on 1 ♀; N: Helsinki (666:39), 28.6.-10.7.1977, J. Karvonen leg., V. J. Karvonen det.

Phygadeuon punctiventris Thomson, 1884. DAZH:ssa on 9 ♀ ja RJ:ssa 7 ♂; Ab: Vihti, Siikajärvi (668:36), 27.6.1965, 24.6.1966, 20.8.1966, 19.6.1971, V. J. Karvonen leg.; N: Helsingin pitäjä (668:39), 18.6.1968, V. J. Karvonen, Helsinki (668:38), 8.8.1978, O. Ranin leg., Kirkkonummi, Siikajärvi (668:36), 23.6.1960, 26.6.1965, V. J. Karvonen leg.; Oa: Vaasa

(701:22), 15.6.1958, R. Jussila leg.; Le: Enontekiö Keski-Urtaspakti (768:26), *Angelica archangelica* kukinnolta, Enontekiö Kilpisjärvi, W. Hellén leg.; Li: Inari (764:50), 6.7.1967, Karvonen leg., Utsjoki Kevo (774:50), 5.-13.7.1959, R. Jussila leg., 5.-15.8.1981, S. Koponen & E. T. Linnaluoto leg.

Phygadeuon stilpninus Thomson, 1888. DAZH:ssa ja RJ:ssa on yhteensä 11 ♂ ja 18 ♀; Al: Lemland (667:11), 30.8.1978, Maarianhamina (668:10), 21.-24.8.1975, R. Jussila leg.; Ab: Turku Paattinen (627:24), 16.6.1983, R. Jussila leg., Vihti, Siikajärvi (668:36), 19.6.1964, 8.6., 28.7.1968, 14.6.1969, 2.7.1970, 3.-16.6.1973, 15.-21.6., 31.8.1974, V. J. Karvonen leg.; N: Helsingin pitäjä (668:39), 7.9.1966, Eero Karvonen leg., Helsinki (667:38), 15.8.1968, Karvonen leg., Kirkkonummi, Siikajärvi (668:36), 30.8.1968, A. Petramaa leg.; Ka: Virolahti (671:53), 10.9.-6.10.1978, Karvonen leg., (671:77), 20.7.1977, R. Jussila leg.; Ta: Lempäälä (680:32), 1966, O. Sotavalta leg.; Oa: Vaasa (701:22), 5.6.1966, R. Jussila leg.; Le: Enontekiö, Kilpisjärvi (767:25), 3.7.1962, V. J. Karvonen leg.; 15.7.1966, Karvonen leg.; Li: Inari, Ivalo (761:52), 1.7.1965, V. J. Karvonen leg., Utsjoki (775:50), 1.7.1967, Karvonen leg.

Mesoleptus filicornis (Thomson, 1884). RJ:ssa on 1 ♂, N: Helsinki (668:39), 31.8.1978, M. Koponen leg.

Mesoleptus marginatus (Thomson, 1884). DAZH:ssa on 10 ♂ ja 3 ♀; Ab: Vihti, Siikajärvi (668:36), 13.6.1963, V. J. Karvonen leg.; N: Espoo (667:37), 14.6.1979, Eila Karvonen leg., Helsinki (667:38), 3.6.1950, Karvonen leg., 10.1964, 7.1965, I. Jalas leg., 9.6.1975, Eila Karvonen leg., 6.7.1975, V. Karvonen leg.; Ka: Virolahti (671:53), 24.7.-2.8.1973, 27.7.-8.8.1976, Karvonen leg.; Sa: Punkaharju, Punkasalmi (685:62), 17.-19.8.1971, J. Karvonen leg.; Li: Inari (764:50), 6.7.1967, Karvonen leg. V. J. Karvonen käytti lajista nimeä *Exolytus petiolaris* (Thomson, 1884), joka on Jonaitisin (1981) mukaan synonyymi.

Atractodes (Atractodes) townesi Jussila, 1983 = *holmgreni* Jussila, 1979, homonym. RJ:ssa on 1 ♀ Al: Föglö, Jyddö (668:13), 23.7.1976, R. Jussila leg.

Oresbius brevialetus (Schmiedeknecht, 1915). RJ:ssa on 1 ♂ ja 1 ♀, Om: Vihanti (714:42), 12.7.1995, R. Jussila leg.; Li: Utsjoki Kevo (774:50), 12.7.1956, R. Jussila leg.

Plectocryptus digitatus (Gmelin in Linnaeus, 1790). DAZH:ssa ja RJ:ssa on yhteensä 16 ♂ ja 2 ♀; Ab: Sauvo, Karuna (669:25), 18.6.1977, R. Jussila leg., Kaarina, Rauhalinna (670:24), 18.-24.6.1994, V.-M. Mukkala leg., Turku, Ruissalo (671:23), 20.-29.6.1988, R. Jussila leg.; N: Espoo (667:37), 12.6.1979, Eila Karvonen leg.; Ta: Hämeenlinna, Aulanko (677:36), 13.6.1976, M. Viitasaari leg.

Aptesis nigritula (Thomson, 1885). DAZH:ssa ja RJ:ssa on yhteensä 7 ♂ ja 1 ♀; Ab: Vihti, Siikajärvi (668:36), 22.6.1969, 21.7.1973, V. J. Karvonen leg.; Ta: Forssa, 24.6.1968, R. Jussila leg., 16.6.1970, J. Laukkanen leg., Pälkäne (680:35), 7.1970, A. Aalto leg.; Oa: Mustasaari (700:22), 23.6.1968, R. Jussila leg., Vaasa (700:22), 15.6.1957, R. Jussila leg.; Li: Utsjoki (775:50), 5.7.1967, Karvonen leg.

Pycnocryptus explorator (Tschek, 1870). RJ:ssa on 1 ♂ ja 4 ♀; Ab: Korppoo (668:19), 13.7.1993, A. Haarto leg., Turku, 5.4.1972, e.l., A. K. Merisuo leg., (672:24), 23.7.1989, R. Jussila leg., Turku, Kastu (671:24), 6.10.1990, A. Avanto leg.; ObN: Rovaniemen mlk., 1984, A. K. Merisuo leg.

Trychosis gradaria (Tschek, 1870) = *nitidula* (Thomson, 1896). DAZH:ssa on 1 ♀; Ab: Vihti (669:35), 7.7.1959, V. J. Karvonen leg. ja det.

Enclisis ornaticeps (Thomson, 1885). DAZH:ssa ja RJ:ssa on yhteensä 7 ♂; Ab: Sauvo Karuna (669:25), 10.7.1966, 29.6.1981, Turku Paattinen (672:24), 23.6.1991, R. Jussila leg., Vihti, Siikajärvi (668:36), 7.7.1974, V. J. Karvonen leg. (det. J. Sawoniewicz); Ta: Jokioinen, 19.6.1969, E. Saaristo leg., Urjala, 12.7.1966, T. Brander leg.; Li: Utsjoki Kevo (774:50), 11.7.1956, R.

Jussila leg.

Nyky-Suomelle uusia lajeja

Mastrus fumipennis (Thomson, 1884). RJ:ssa on Ka: Virolahti (671:53), 21.8.1975, R. Jussila leg. Hellén (1937) ilmoitti sen Koivistolta.

Subhemiteles mixtus (Bridgman, 1883). Hellén (1967) ilmoitti sen nimellä *Phyzelus flavitarsis* (Dalla Torre) Käkisalimesta. DAZH:ssa on 1 ♀; N: Helsinki (668:38), 26.7.1978, O. Ranin leg. ja V. J. Karvonen det.

Cubocephalus punctulatus (Kriechbaumer, 1871). MZH:ssa on 3 ♀; N: Pernå = Pernaja, 26.6.1945, 28.6.1945, 22.7.1961, Å. Nordström leg. Hellén (1939) ilmoitti lajin Kirjavalahdesta.

Aptesis albulatoria (Gravenhorst, 1829). RJ:ssa on useita yksilöitä mm. rantakasvillisuudesta ja karhunputken kukinnoilta, Ab: Korppoo, Lökhholm (669:19), 28.6.1962, Sauvo, Karuna (669:25), 20.-27.7.1969; Ka: Virolahti (671:53), 21.8.1975, 26.7.1977; St: Huittinen, Kyttälänhaara (678:26), 22.7.1991, Rauma (679:20), 30.6.1986; Om: Haapajärvi (707:41), 8.8.1974; ObN: Tervola, Koivun Ossaus (734:41), 6.7.1989, kaikki R. Jussila leg. Hellén (1937) ilmoitti lajin Karjalan Kannakselta, Vammeloelta.

Aptesis sericans (Gravenhorst, 1829). RJ:ssa on 9 ♂ ja 3 ♀; Al: Finström, Husö (670:10), 6.8.1975, R. Jussila leg.; Ab: Houtskari, Hyppeis (669:18), 28.7.-8.8.1986, H. Bruun leg., Sauvo, Karunan Karinkorva (669:25), 27.7.1969, 23.6.1979, R. Jussila leg., Turku, Ruissalo (671:23), 3.7.1991, R. Jussila leg., Vahto, Tirava (672:24), 27.6.1990, R. Jussila leg.; N: Nurmi-järvi, Klaukkala (669:37), 10.6.1978, R. Jussila leg.; St: Kokemäki, Puurijärvi (672:26), 30.5.1993, R. Jussila leg.; Oa: Ilmajoki (697:27), 7.7.-4.8.1990, V.-M. Mukkala leg., Isokyrö, Ventälä, 9.6.1956, R. Jussila leg. Krogerus (1938) ilmoitti lajin Sallan Vuorijärveltä, nykyisen itärajamme takaa.

Aptesis subguttata (Gravenhorst, 1829). MZH:ssa on 1 ♂; N: Tvärminne, L. v. Essen leg.

Hellén (1937) ilmoitti lajin Pyhäjärveltä.

Aptesis terminata (Gravenhorst, 1829). RJ:ssa on 1 ♂, Ab: Sauvo, Karunan Karinkorva (669:25), 29.7.1981, R. Jussila leg. Von Essen (1910) ilmoitti lajin Raudusta.

Ethelurgus sodalis (Taschenberg, 1896). Von Essen (1910) ilmoitti sen Jaakimvaarasta. DAZH:ssa on ainakin 10 ♂ ja 6 ♀, Al: Eckerö, 26.7.1963, 13.-19.8.1972, J. Karvonen leg., Jomala, 19.6.1966, J. Karvonen leg., Lemland, 17.6.1966, J. Karvonen leg., Maarianhamina (668:10), 28.7.1975, R. Jussila leg., Saltvik (6704:116), 30.6.1983, M. Koponen leg.; N: Elimäki, Mustila (673:46), 9.8.1975, R. Jussila leg., Helsingin pitäjää, 25.8.1963, J. Perkiömäki leg., Helsinki, 20.6.1962, J. Perkiömäki leg.; Ka: Hamina, 1968, I. Jalas leg.; Ta: Lahti (6769:431), 5.9.1981, M. Koponen leg.; Sa: Ristiina (6826:502), 26.8.1978, M. Koponen leg.; Oa: Vaasa, 17.6.1956, R. Jussila leg.; ObS: Oulu, 8.1978, J. Karvonen leg.

Sulcarius hellbachi (Schmiedeknecht, 1905). Emme tiedä, mistä Hellén (1940) on saanut lajin luettelonsa Koska se saattaa olla nyky-Suomelle uusi, ilmoitamme, että DAZH:ssa ja RJ:ssa on 4 ♂ ja 7 ♀ Suomesta, Ab: Korppoo, Lökholm (669:19), 12.6.1994, R. Jussila leg., Turku, Ruissalo (676:23), 18.6.-29.7.1994, R. Jussila leg., Vihti, 6.6.1952, V. J. Karvonen leg.; Ta: Forssa, 4.5.1965, M. Nylund leg.; Sa: Valkeala Utti, 12.6.1940, V. J. Karvonen leg.; Oa: Maxmo = Maksamaa, 4.-14.6.1964, W. Hellén leg.; Tb: Karstula (697:38), 30.6.1973, R. Jussila leg., Toivakka (688:45), 6.6.1973, Eero Karvonen leg.; Sb: Leppävirta (693:34), 6.6.1972, Eero Karvonen leg.; Kb: Pielisjärvi Koli, 26.6.1968, R. Jussila leg.

Luetteloon palautettava laji

Idiolispa obfuscator (Villers, 1789) palaute-taan Suomen lajiluetteloon. Hellén (1937) ilmoitti sen jo aiemmin nimellä *I. tenuicornis* (Thomson, 1896), mutta poisti sen myöhemmin (Hellén 1957).

Nimet ovat synonyymejä (Schwarz 1988). DAZH:ssa on 2 ♂; Li: Inari (764:50), 6.7.1967, Karvonen, Inari, Ivalo (761:52), 27.6.1969, V. J. Karvonen leg. ja det.

Luettelosta poistettava laji

Polyaulon rufipes Foerster, 1871 on poistettu luettelosta, koska sen ilmoitus (Jussila 1984) perustui väärinmääritykseen.

Nyky-Suomesta puuttuvia lajeja

Neuvostoliitolle luovutetulta alueelta mutta ei nyky-Suomesta ilmoitettuja lajeja ovat *Gelis edentatus* (Foerster, 1850), *G. helleni* Kolarov, 1993 = *breviceps* (Hellén, 1967), *G. vulnerans* (Foerster, 1850), *Charitopes macrocerus* Hellén, 1967, *Leptocryptoides clavipes* (Thomson, 1888), *Phygadeuon lateareolatus* Hellén, 1967, *P. striiventris* Hellén, 1967, *Atractodes alpestris* Roman, 1918, *A. podagricus* (Roman, 1909), *Apsilops aquaticus* (Thomson, 1874) ja *Schreineria annulata* (Brischke, 1864). Ne on tässä luettelossa pantu hakasulkeisiin.

Kiitokset: Janusz Sawoniewicz ja Martin Schwarz ovat määrittäneet materiaalia, Jonny Perkiömäki, Hans Silfverberg, Gergely Varkonyi ja Matti Viitasaari ovat lukeneet ja kommentoineet käsikirjoitustamme. Heille parhaat kiitokset..

Lajiluettelo kirjallisuusviittein

CRYPTINAE

=GELINAE

=HEMITELINAE

=PHYGADEUONTINAE

PHYGADEUONTINI

=HEMITELINI

=GELINI

Chiroticina

Handaioia Seyrig, 1952*bellicornis* (Thomson, 1888)

Hellén 1967, 1971, Horstmann 1982, Silfverberg 1986

= *incarnata* (Schmiedeknecht, 1933)

Hellén 1967, 1971

Chirotica Foerster, 1869*decorator* (Villiers, 1789)= *trifasciator* (Thunberg, 1822)

Hellén 1937, 1940, 1967

maculipennis (Gravenhorst, 1829)

Hellén 1937, 1940, 1967

Acrolytina

Encrateola Strand, 1916*laevigata* (Ratzeburg, 1848)

Hellén 1967

mediovittata (Schmiedeknecht, 1897)

Hellén 1967

Eudelus Foerster, 1869*infirmus* (Gravenhorst, 1829)

Jussila 1965, 1966d, 1984, Hellén 1966a, 1967

limbatus (Gravenhorst, 1829)

Hellén 1967

simillimus (Taschenberg, 1865)

Jussila 1984, Silfverberg 1986

= *pallicarpus* (Thomson, 1884)= *pallidicarpus* auct.

Jussila 1965, 1966d, Hellén 1966a

= *scabriculus* (Thomson, 1884)

Forsius 1924, Hellén 1926, [1931], 1940,

Krogerus [1927, 1932], 1934

Acrolyta Foerster, 1869= *Rhadinocera* Foerster, 1869*distincta* (Bridgman, 1883)

Jussila 1984

nens (Hartig, 1838)

Komonen 1997

= *submarginata* (Bridgman, 1883)

Hellén 1967, 1971

rufocincta (Gravenhorst, 1829)

Horstmann 1979b, Jussila 1984

= *capreola* Thomson, 1884

Forsius 1925, Hellén 1926, 1940, 1967, Jussila

1965, 1968a

Diaglyptellana Horstmann, 1976*puncta* (Holmgren, 1857)= *sisyphii* (Verhoeff, 1891)

Hellén 1967

Diaglyptidea Viereck, 1913*conformis* (Gmelin in Linnaeus, 1790)

Horstmann 1982

= *secernenda* (Schmiedeknecht, 1897)

Hellén 1967, 1971

Lysibia Foerster, 1869*marginata* (Bridgman, 1883)

Hellén 1967

nana (Gravenhorst, 1829)

Krogerus 1934, Hellén 1967

Hemitelina

= *Gnyptomorphina**Pleurogyrus* Townes, 1970*cyclogaster* (Thomson, 1884)

Suomelle uusi laji

pumilus (Hellén, 1967)

Hellén 1967, Townes 1969, Horstmann 1990b, 1995

=*pusillus* auct.

Hellén 1971

Obisiphaga Morley, 1907

stenoptera (Marshall, 1868)

Hellén 1937, 1940, 1967

Arotrephes Townes, 1970

minor (Pfankuch, 1924)

=*glabriculus* (Hellén, 1967)

Hellén 1967, 1971, Horstmann 1990b, 1995

nivosus (Hellén, 1967)

Hellén 1967, 1971, Jussila 1973, 1976, Horstmann 1990b, 1995

parvipennis (Thomson, 1884)

Hellén 1967, 1971

perfusor (Gravenhorst, 1829)

Hellén 1957, 1961, 1967, Jussila 1984, Silfverberg 1986

speculator (Gravenhorst, 1829)

Gravenhorst 1829, von Essen 1910, Hellén 1940, 1967, Frilli 1974, Horstmann 1993, 1995

Xiphulcus Townes, 1970

constrictus (Thomson, 1884)

Hellén 1967, 1971, Jussila 1984, Silfverberg 1986

floricolorator (Gravenhorst, 1829)

Jussila 1984

=*longulus* (Thomson, 1884)]

[Hellén 1967, 1971]

=*longicauda* (Hellén, 1967)

Hellén 1967, 1971, Horstmann 1974, 1990

Hemiteles Gravenhorst, 1829

bipunctator (Thunberg, 1822)

Hellén 1940, 1967, Jussila 1984

=*tristator* (Gravenhorst, 1829)

Woldstedt 1874, Hellén 1923

=*cingulator* (Gravenhorst, 1829)

Woldstedt 1874

similis (Gmelin in Linnaeus, 1790)

Woldstedt 1874, Hellén 1923, 1940, Meyer 1933, Jussila 1965, 1984

=*unicolor* Thomson, 1884

Hellén 1967, 1971

Aclastus Foerster, 1869

borealis (Boheman, 1866)

[Hellén 1967, 1971], Jussila 1989

eugracilis Horstmann, 1980

Suomelle uusi laji

flavipes Horstmann, 1980

Suomelle uusi laji

gracilis (Thomson, 1884)

Krogerus 1934, 1960, Hellén 1940, 1967, Kanervo 1963, Jussila 1965, 1976, 1984, Horstmann 1980b, 1990b, Silfverberg 1986

=*furcifer* Hellén, 1967

Hellén 1967, 1971, Horstmann 1990b

longicauda Horstmann, 1980

Jussila 1989

micator (Gravenhorst, 1829)

Hellén 1937, 1940, 1967, Jussila 1965, 1976, Horstmann 1979a, 1980b, Silfverberg 1981

=*caudator* Hellén, 1967

Hellén 1967, 1971

minutus (Bridgman, 1886)

Krogerus 1932, Hellén 1940, 1966a, Jussila 1976

solitudinum Roman, 1923

Hellén 1967, 1971, Jussila 1984

solutus (Thomson, 1884)

Hellén 1937, 1940, Jussila 1984, Silfverberg 1986

transversalis Horstmann, 1980

Jussila 1989

Gnyptomorpha Foerster, 1869

obscura (Bridgman, 1883)

Horstmann 1979b

=*aperta* (Thomson, 1884)

Hellén 1967, 1971

Polyaulon Foerster, 1869

paradoxus (Zetterstedt, 1838)

- Hellén 1944b, 1947, 1959, 1961
stiavnicensis (Capek, 1956)
 Suomelle uusi laji
- Gelina
- Xenolytus* Foerster, 1869
 = *Sternocryptus* Roman, 1925
bitinctus (Gmelin in Linnaeus, 1790)
 von Essen 1910, Pfankuch 1923, Hellén 1926,
 1940, 1967
 = *melanarius* var. 1. (Gravenhorst, 1829)
 Gravenhorst 1829
- Dichrogaster* Doumerc, 1855
aestivalis (Gravenhorst, 1829)
 [Krogerus 1927, 1932], Hellén [1931, 1940],
 1967
genalis (Habermehl, 1925)
 Suomelle uusi laji
heteropus (Thomson, 1896)
 Jussila 1989, Horstmann 1992, Silfverberg
 1996
longicaudata (Thomson, 1884)
 Hellén 1967, 1971
 = *mandibularis* auct.
 Townes 1983
nigrithorax Horstmann, 1976
 Jussila 1989
perlae (Doumerc, 1855)
 Jussila 1989
- Blapsitodes Foerster, 1869
vicinus (Gravenhorst, 1829)
 = *melanarius* (Gravenhorst, 1829)
 Hellén 1941b, 1941c, Grönblom 1964
- Gelis* Thunberg, 1827
 = *Pezomachus* Gravenhorst, 1829
 = *Pezolochus* Foerster, 1859
 = *Alegina* Foerster, 1869
 = *Rhadiurgus* Foerster, 1869, preocc.
 = *Arctodeuon* Hellén, 1967
 = *Rhadiurginus* Hellén, 1967
- acarorum* (Linnaeus, 1758)
 [Krogerus 1927, Hellén 1931, 1940], 1970a,
 1971, Jussila 1965, 1976, 1984, Lei & al. 1997,
 Lei 1997
 = *sericeus* (Foerster, 1850)
 Forsius 1925, Hellén 1926, 1940, 1953, 1970a,
 1971, Tahvonen 1933, Krogerus 1934, [1938],
 1960, Nuorteva 1962, 1965, 1973, 1976, 1984,
 Grönblom 1964, Pyörmilä 1976
 = *corruptor* auct.
 Hellén 1940
agilis (Fabricius, 1775)
 Nylander 1859, Forsius 1912, Hellén 1923,
 1940, 1970a, Krogerus [1927, 1932], 1934,
 [1938], 1960, Jussila 1976, Schwarz 1995, Lei
 & al. 1997, Lei 1997, Komonen 1997
 = *instabilis* (Foerster, 1850)
 = Forsius 1925, Meyer 1933, [Krogerus 1938],
 Hellén 1940, 1953, 1970a, Jussila 1962, 1965a,
 1968a, 1976, 1984, Grönblom 1964, Pyörmilä
 1976
 = *breviceps* (Thomson, 1884)
 Hellén 1970a, 1971
 = *cephalotes* Hellén, 1970
 [Hellén 1970a, 1971, Horstmann 1990b]
albipalpus (Thomson, 1884)
 Koponen 1988
alopecosae Horstmann, 1986
 Suomelle uusi laji
 = *glacialis* auct.
 Hellén 1967, 1971
alpivagus (Strobl, 1901)
 Jussila 1965, Hellén 1966a
anthracinus (Foerster, 1850)
 = *linearis* (Foerster, 1851)
 Jussila 1989
 = *gonatopinus* (Thomson, 1884)
 Hellén 1970a, 1971
areator (Panzer, 1804)
 Forsius 1924, Hellén 1926, 1940, Krogerus
 [1927, 1932], 1934, 1960, Grönblom 1964,
 Carlberg 1980, Jussila 1984, Vikberg & Viitasaari
 1991
 = *pulchellus* (Gravenhorst, 1829)

- Hellén 1937, 1940
 =*orbiculatus* (Gravenhorst, 1829)
 =*orbicularis* auct.
 Hellén 1937, 1940
balteatus (Thomson, 1884)
 Horstmann 1979b
 =*brevistylus* (Hellén, 1967)
 Hellén 1967, Horstmann 1986b, 1990
bicolor (Villers, 1789)
 Suomelle uusi laji
cinctus (Linnaeus, 1958)
 Hellén 1940, 1967, 1971
 =*bicolorinus* (Gravenhorst, 1829)
 Gravenhorst 1829, Nylander 1859, Woldstedt 1874, Hellén 1923
cursitans (Fabricius, 1775)
 Gravenhorst 1829, Krogerus 1932, 1934, [1938], 1960, Hellén 1940, 1970a, Grönblom 1964, Jussila 1984, Vikberg & Viitasaari 1991
discedens (Foerster, 1850)
 Suomelle uusi laji
 =*vagans* auct.
 [= *edentatus* (Foerster, 1850)]
 [Hellén 1970a, 1971]
elymi (Thomson, 1884)
 Jussila 1989
exareolatus (Foerster, 1850)
 Krogerus 1932, Jussila 1965, 1984, Hellén 1970a, 1971, Schwarz 1995
 =*nigritus* (Foerster, 1850)
 [Krogerus 1938, 1960]
 =*lapponicus* Hellén, 1970
 Hellén 1970a, 1971, Horstmann 1990b
fallax (Foerster, 1850)
 =*nigricornis* (Foerster, 1850) preocc.
 Hellén 1970a, 1971
fasciitinctus (Dalla Torre, 1902)
 Koponen 1988
festinans (Fabricius, 1798)
 Krogerus 1927, [1932], Hellén [1931], 1940, 1970a, 1971, Jussila 1965, 1984
 =*pumilus* (Foerster, 1850)
 [Krogerus 1927, 1932], Hellén [1931, 1940], 1970a
 =*exareolatus* auct.
 Krogerus 1932
gibbifrons (Thomson, 1884)
 Hellén 1967, 1971
glacialis (Holmgren, 1869)
 Jussila 1976, 1984
 [= *helleni* Kolarov, 1993]
 =*breviceps* (Hellén, 1967), preocc.
 [Hellén 1967, 1971, Horstmann 1986b, 1990]
hortensis (Gravenhorst, 1829)
 Nylander 1859, Hellén 1923, 1940, 1970a, Meyer 1933, Jussila 1965, 1984
 =*impotens* (Foerster, 1850)
 Hedwig 1956, Hellén 1961, Jussila 1984
intermedius (Foerster, 1850)
 Krogerus 1932
 =*furax* (Foerster, 1850)
 Reuter 1900, Hellén 1940, 1941c
kiesenwetteri (Foerster, 1850)
 Hellén 1944a, 1947, 1970a, Jussila 1965, 1984
longicauda (Thomson, 1884)
 Hellén 1937, 1940, 1967, Jussila 1984
longulus (Zetterstedt, 1838)
 Suomelle uusi laji
 =*speculator* (Foerster, 1851)
melanocephalus (Schrank, 1781)
 [Krogerus 1938, 1960], Hellén [1940, 1941c], 1970a, Jussila 1984
 =*fasciatus* (Fabricius, 1793)
 Woldstedt 1874, Hellén 1923, 1940, Forsius 1925, Krogerus 1932, 1960
melanogaster (Thomson, 1884)
 Jussila 1965, 1984, Hellén 1966a, 1967
meuseli (Lange, 1911)
 Horstmann 1993, Silfverberg 1996
micrurus (Foerster, 1850)
 Krogerus [1927], 1932, Hellén [1931, 1940], 1970a
mutillatus (Gmelin in Linnaeus, 1790)
 =*vagans* (Olivier, 1792)
 Forsius 1924, Hellén 1926, 1940, 1970a, Krogerus 1960, Jussila 1965, 1984
 =*pedicularius* (Fabricius, 1793)
 Krogerus 1960, Hellén 1970a, 1971

- nigritulus* (Zetterstedt, 1838)
Komonen 1997
- obesus* (Ashmead, 1902)
Hellén 1970a, Jussila 1976, 1984
- ornatulus* (Thomson, 1884)
Krogerus [1927], 1932, Hellén [1931], 1940, 1967
- proximus* (Foerster, 1850)
Schwarz 1995, Silfverberg 1996, Komonen 1997
- = *ochraceus* (Foerster, 1850)
Hellén 1970a, 1971
- = *attentus* (Foerster, 1850)
Hellén 1970a, 1971, Jussila 1976
- = *analís* (Foerster, 1850)
Hellén 1970a, 1971, Jussila 1976, 1984
- = *tonsus* (Foerster, 1850)
Forsius 1924, Hellén 1926, 1940, 1970a, Jussila 1965, 1976, 1984
- = *parvulus* (Foerster, 1851)
- = *inflatipes* Hellén, 1970
[Hellén 1970a, 1971, Horstmann 1990b]
- rubricollis* Thomson, 1884)
Hellén 1967, 1971
- ruficollis* (Thomson, 1884)
Hellén 1967
- ruficornis* (Retzius, 1783)
Lei & al. 1997, Lei 1997
- = *agilis* auct.
- = *instabilis* auct.
- rufipes* (Foerster, 1850)
Hellén [1937, 1940], 1944a, 1947, Jussila 1984
- rufogaster* (Thunberg, 1827)
- = *carnifex* (Foerster, 1850)
Krogerus 1927, 1960, Hellén [1931], 1940, 1970a
- = *lutescens* (Foerster, 1850)
Krogerus [1927], 1932
- spinulus* (Thomson, 1884)
Hellén 1970a, 1971
- = *exareolatus* auct.
Krogerus 1932
- thomsoni* (Schmiedeknecht, 1933)
Suomelle uusi laji
- = *dispar* (Thomson, 1885), homonym
- trux* (Foerster, 1850)
- = *ruficornis* (Thunberg, 1827), preocc.
Krogerus [1927], 1932, 1934, 1960, Hellén [1931], 1940
- = *comes* (Foerster, 1850)
[Krogerus 1927, 1932]
- vagabundus* (Foerster, 1850)
Hellén 1970a, 1971
- viduus* (Foerster, 1850)
- = *mandibularis* (Thomson, 1884)
Hellén 1970a, 1971
- [*vulnerans* (Foerster, 1850)]
[Krogerus 1960]
- Thaumtogelis* Kupka in Schmiedeknecht, 1933
- = *Cryptogelis* Hellén, 1944
- audax* (Olivier, 1792)
- = *zonatus* (Foerster, 1850)
Forsius 1924, Hellén 1926, 1940, 1944a, 1970a, 1971
- = *vulpinus* auct.
Hellén 1944a, 1947
- lichtensteini* (Pfankuch, 1913)
Hellén 1959, 1961
- neesii* (Foerster, 1850)
Hellén 1944, 1947
- sylvicola* (Foerster, 1850)
Hellén 1944a, 1947, 1970a
- vulpinus* (Gravenhorst, 1829)
- = *aquisgranensis* (Foerster, 1850)
Hellén 1944a, 1947. 1970a, Jussila 1976
- Catalytus* Foerster, 1851
- mangeri* (Gravenhorst, 1829)
Horstmann 1976
- = *fulveolatus* (Gravenhorst, 1829)
Hellén 1937, 1940, 1967
- Agasthenes* Foerster, 1869
- = *Asthenoptera* Foerster, 1869
- subarcticus* (Jussila, 1965)
Jussila 1965, 1984, Hellén 1966a, 1967

varitarsus (Gravenhorst, 1829)
 Hellén 1967, 1971, Silfverberg 1981
 = *stagnalis* (Thomson, 1884)
 Hellén 1940, 1967, Krogerus 1960

Ethelurgina

Rhembobius Foerster, 1869
bifrons (Gmelin, 1790)
 Hellén 1941a, 1941c, Jussila 1984
 = *rufoniger* (Bridgman, 1889)
 Krogerus 1934, Hellén 1940
caudatus (Roman, 1909)
 Jussila 1965, 1984, Hellén 1966a
nigricollis (Thomson, 1883)
 Nordström 1952
perscrutator (Thunberg, 1822)
 [Meyer 1933, Hellén 1937, 1940], Jussila 1962
quadrispinus (Gravenhorst, 1829)
 Gravenhorst 1829, Woldstedt 1874, von Es-
 sen 1910, Krogerus 1934, 1960, Hellén 1940

Ethelurgus Foerster, 1869
sodalis (Taschenberg, 1896)
 [von Essen 1910, Hellén 1940, 1967], nyky-
 Suomelle uusi laji
 = *vulnerator* auct.
 Townes 1983

Endaseina

Medophron Foerster, 1869
afflictor (Gravenhorst, 1829)
 Gravenhorst 1829, Krogerus 1934, 1906,
 Hellén 1940, 1967, Frilli 1974
 = *affligator* auct.
 Nylander 1859, Hellén 1923
armatulus (Thomson, 1888)
 Hellén 1937, 1940, 1967
caudatulus (Dalla Torre, 1902)
 Nordström 1948, Hellén 1952a, 1967, Jussila
 1984
 = *afflictor* auct.
 Jussila 1965a

flavitarsis (Dalla Torre, 1902)
 [Hellén 1967], nyky-Suomelle uusi laji
nigriceps (Thomson, 1883)
 Hellén 1937, 1940
nigritus (Gravenhorst, 1829)
 Woldstedt 1874

Endasys Foerster, 1869
 = *Stylocryptus* Thomson, 1873
alutaceus (Habermehl, 1912)
 Sawoniewicz & Luhman 1992, Silfverberg 1996
analisis (Thomson, 1883)
 von Essen 1910, Hellén 1940, 1957, Sawon-
 iewicz & Luhman 1992
annulatus (Habermehl, 1912)
 Jussila 1996, 1999
bicolor (Lundbeck, 1896)
 = *melanurus* (Roman, 1909)
 Suomelle uusi laji
brevis (Gravenhorst, 1829)
 Gravenhorst 1829, Woldstedt 1874, Hedwig
 1956, [Krogerus 1960], Hellén 1967, Sawon-
 iewicz & Luhman 1992
cnemargus (Gravenhorst, 1829)
 Sawoniewicz & Luhman 1992, Silfverberg 1996
 = *kriegeri* (Habermehl, 1912)
 Jussila 1986
erythrogaster (Gravenhorst, 1829)
 von Essen 1910, Hellén 1940, 1957, 1961,
 1967, Jussila 1965a, 1968a, 1984, Sawoniewicz
 & Luhman 1992
 = *brevis* auct.
 von Essen 1910, Hellén 1940
eurycerus (Thomson, 1896)
 Suomelle uusi laji
euxestus (Speiser, 1908)
 Sawoniewicz & Luhman 1992, Silfverberg 1996
lissonulus Sawoniewicz & Luhman, 1992
 Sawoniewicz & Luhman 1992, Silfverberg 1996
microcellus Sawoniewicz & Luhman, 1992
 Sawoniewicz & Luhman 1992, Silfverberg 1996
minutulus (Thomson, 1883)
 von Essen 1910, Hellén 1957, 1961, 1967,
 Sawoniewicz & Luhman 1992

- parviventris* (Gravenhorst, 1829)
 von Essen 1910, Hellén 1940, 1957, 1961, Frilli 1974, Sawoniewicz & Luhman 1992
 ?=*fusciventris* (Habermehl, 1916)
 =*kriegeri* auct.
 Nordström 1940, Hellén 1940, 1941c, 1942
- plagiator* (Gravenhorst, 1829)
 Nylander 1859, Hellén 1923, Sawoniewicz & Luhman 1992, Silfverberg 1996
- rusticus* (Habermehl, 1912)
 Sawoniewicz & Luhman 1992, Silfverberg 1996
- senilis* (Gmelin in Linnaeus, 1790)
 Jussila 1984
 =*parviventris* auct.
 Jussila 1965a
- striatus* (Kiss, 1924)
 Sawoniewicz & Luhman 1992, Silfverberg 1996
- testaceipes* (Brischke, 1891)
 Suomelle uusi laji
 =*coxalis* (Schmiedeknecht, 1905)
- testaceus* (Taschenberg, 1865)
 Hellén 1957?, Sawoniewicz & Lohmar 1992
- thunbergi* Sawoniewicz & Luhman, 1992
 Sawoniewicz & Luhman 1992, Silfverberg 1996
- =*rubicator* (Thunberg, 1822), homonym
 Hellén 1937, 1940, 1942, 1947, Jussila 1962
- =*eurycerus* auct.
 von Essen 1910, Hellén 1940
- transverseareolatus* (Strobl, 1901)
 Sawoniewicz & Luhman 1992, Silfverberg 1996
- varipes* (Gravenhorst, 1829)
 Woldstedt 1874, von Essen 1910, Hellén 1957, 1961, 1967, Frilli 1974, Sawoniewicz & Luhman 1992
- Glyphicnemis* Foerster, 1869
- atrata* (Strobl, 1901)
 Sawoniewicz 1985, Silfverberg 1986
- =*suffolciensis* Morley, 1907
- clypealis* (Thomson, 1883)
 Hellén 1937, 1940, 1967, Sawoniewicz 1985
- profligator* (Fabricius, 1775)
 Nylander 1859, von Essen 1910, Hellén 1923, 1940, 1967, Krogerus 1960, Jussila 1962, Sawoniewicz 1985
- vagabunda* (Gravenhorst, 1829)
 Hellén 1937, 1940, 1957, 1961, 1967
 =*suffolciensis* auct.
 von Essen 1910, Hellén 1940
- Amphibulus* Kriechbaumer, 1893
- fennicus* Sawoniewicz, 1990
 Sawoniewicz 1990
- gracilis* Kriechbaumer, 1893
 Hellén 1953, 1957, 1961, 1967, Jussila 1962, Sawoniewicz 1985
 =*aertsi* (Habermehl, 1926)
 Nordström 1944, Frey 1946, Hellén 1947
- Mastrina
- Charitopes* Foerster, 1869
- arcticus* (Thomson, 1884)
 Hellén 1940, 1966a, 1967, 1971, Jussila 1965a, 1976, 1984
 =*apertus* Roman, 1909
 Hellén 1937
- areolaris* (Thomson, 1884)
 Jussila 1965a, 1984, Hellén 1966a, Townes 1983, Silfverberg 1986
- =*carri* (Roman, 1923)
 Hellén 1967, 1971, Jussila 1984
- brunneus* (Morley, 1907)
 Suomelle uusi laji
- clausus* (Thomson, 1888)
 Hellén 1937, 1940, 1967, Jussila 1984
- curticauda* Hellén, 1967
 Hellén 1967, 1971
- gastricus* (Holmgren, 1869)
 Townes 1983
- =*chrysopae* (Brischke, 1890)
 Hellén 1967, 1971
 [*macrocerus* Hellén, 1967]
 [Hellén 1967, 1971, Horstmann 1990b]
- Brachypimpla* Strobl, 1902
- brachyura* Strobl, 1902
 Hellén 1937, 1940

Pygocryptus Roman, 1925

grandis (Thomson, 1884)

Hellén 1967

rufofacialis (Schmiedeknecht, 1933)

=*faciator* (Aubert, 1970)

Jussila 1986

=*facialis* (Thomson, 1884), preocc.

Mastrus Foerster, 1869

costalis (Thomson, 1884)

Hellén 1967, 1971

deminuens (Hartig, 1838)

=*castaneus* (Taschenberg, 1865)

Hellén 1967

fumipennis (Thomson, 1884)

[Meyer 1933, Hellén 1937, 1940, 1967],

nyky-Suomelle uusi laji

parviceps (Hellén, 1967)

Hellén 1967, 1971, Jussila 1976, 1984,

Horstmann 1978, 1990

pictipes (Gravenhorst, 1829)

Jussila 1996, 1999

rufulus (Thomson, 1884)

Hellén 1967, 1971

sordipes (Gravenhorst, 1829)

Jussila 1965, 1976, 1984, Hellén 1966a,

Silfverberg 1986

?=*sordidus* auct.

Hellén 1967

tenuicosta (Thomson, 1884)

Jussila 1996, 1999

varicoxis (Taschenberg, 1865)

Hellén 1967, 1971, Horstmann 1988

Odontoneura Foerster, 1869

annulicornis (Thomson, 1884)

Hellén 1937, 1940, 1967, Jussila 1984,

Silfverberg 1986

Zoophthorus Foerster, 1869

=*Chaetomastrus* Hellén, 1967

=*Stiboscopus* Townes, 1970

anglicanus (Morley, 1907)

Hellén 1967, 1971

cynipinus (Thomson, 1884)

Hellén 1937, 1940, 1967, Jussila 1965, 1984

laticinctus (Brullé, 1832)

=*hirticeps* (Thomson, 1885)

Hellén 1967, 1971, Jussila 1976, 1984

microstomus (Thomson, 1884)

Jussila 1965, 1984, Hellén 1966a

=*microtomus* auct.

Hellén 1967

notaticrus (Thomson, 1888)

Hellén 1967, 1971, Jussila 1984

palpator (Müller, 1776)

Horstmann 1979

=*incisus* (Bridgman, 1883)

Hellén 1967, 1971

platygaster (Schmiedeknecht, 1897)

Hellén 1967, 1971

plumbeus (Thomson, 1884)

Hellén 1967, 1971

punctiventris (Thomson, 1884)

Jussila 1965, 1984, Hellén 1966a, Silfverberg 1986

Clypeoteles Horstmann, 1973

distans (Thomson, 1884)

Horstmann 1973

=*fennicus* (Hellén, 1967)

Hellén 1967, 1971, Horstmann 1990b

Isadelphus Foerster, 1869

armatus (Gravenhorst, 1829)

Hellén 1967, 1971, Jussila 1976

coriarius (Taschenberg, 1865)

Jussila 1986

gallicola (Bridgman, 1880)

Hellén 1967, 1971, Jussila 1984, Silfverberg 1981

=*nigriventris* (Thomson, 1884)

Hellén 1967, 1971

inimicus (Gravenhorst, 1829)

Forsius 1911, Krogerus 1934, Hellén 1940, 1967, Fulmek 1968, Jussila 1984

=*obscuripes* (Thomson, 1884)

Hellén 1967, 1971
pusillus Hellén, 1967
 Hellén 1967, 1971, Horstmann 1990b

Helcostizus Foerster, 1869
 = *Brachycentrus* Taschenberg, 1865 preocc.
 = *Heterocryptus* Woldstedt, 1874
restaurator (Fabricius, 1775)
 Jussila 1969
 = *brachycentrus* (Gravenhorst, 1829)
 Gravenhorst 1829, Woldstedt 1874, von Essen 1910
 = *albator* (Thunberg, 1822)
 Hellén 1940, 1941a, 1941c, Jussila 1962, 1965
 = *maculatus* (Woldstedt, 1874)
 Woldstedt 1874

Lochetica Kriechbaumer, 1892
westoni (Bridgman, 1880)
 Hellén 1937, 1940
 = *pimplaria* (Thomson, 1884)
 Hellén 1967

Bathytrichina

Bathythrix Foerster, 1869
 = *Ischnurgops* Foerster, 1869
 = *Leptocryptus* Thomson, 1873
aerea (Gravenhorst, 1829)
 Kanervo 1963, Sawoniewicz 1980
 = *brevis* (Thomson, 1884)
 Hellén 1941a, 1941c, 1967
argentata (Gravenhorst, 1829)
 Jussila 1986
clavigera (Taschenberg, 1865)
 von Essen 1910, [Krogerus 1938], Hellén 1940, 1967, Jussila 1962, 1965a, 1984, Sawoniewicz 1980
collaris (Thomson, 1896)
 Sawoniewicz 1980, Silfverberg 1981
fragilis (Gravenhorst, 1829)
 Hellén 1967, Sawoniewicz 1980
 = *geniculosa* (Thomson, 1884)
 Hellén 1941a, 1941c

lamina (Thomson, 1884)
 Krogerus 1934, Hellén 1940, 1957, 1961, Sawoniewicz 1980
 = *collaris* auct.
 Hellén 1937, 1940
maculata (Hellén, 1957)
 Hellén 1957, 1961, Sawoniewicz 1980, Horstmann 1990b, Silfverberg 1981
 = *rugulosa* auct.
 Hellén 1941a, 1941c
 = *protuberator* Aubert, 1964
montana (Schmiedeknecht, 1905)
 Jussila 1984, Silfverberg 1996
pellucidator (Gravenhorst, 1829)
 Krogerus 1934, 1960, Hellén 1940, 1957, 1961, 1967, Jussila 1965a, 1984, Silfverberg 1981
 = *rubens* (Kriechbaumer, 1892)
 Hellén 1957, 1961
 = *ruficaudata* (Bridgman, 1883)
 Hellén 1941a, 1941c, 1967, Jussila 1965a
strigosa (Thomson, 1884)
 von Essen 1910, Hellén 1967, 1971
 = *aerea* auct.
 Forsius 1924, Hellén 1926, 1940
tenuis (Gravenhorst, 1829)
 Hellén 1957, 1961
 = *bellulus* auct.
 Hellén 1941a, 1941c, 1957
thomsoni (Kerrich, 1942)
 [Sawoniewicz 1980], Jussila 1986

Phygadeuontina

Oecotelma Townes, 1970
gracilipes (Thomson, 1884)
 Hellén 1967, 1971
Platytrichus Townes, 1970
monodon (Thomson, 1884)
 Hellén 1967, 1971
Sulcarius Townes, 1970
biannulatus (Gravenhorst, 1829)

- Sitala & Nielsen 1906, Hellén 1923, 1940, 1967, Jussila 1965a, 1984, Silfverberg 1981
hellbachi (Schmiedeknecht, 1905)
 Hellén 1940, 1967, mahdollisesti nyky-Suomelle uusi laji
nigricornis (Thomson, 1884)
 von Essen 1910, Hellén 1940, 1957, 1961, Townes 1983
 =*homocerus* (Thomson, 1885)
 Krogerus 1932, Hellén 1940
thunbergi (Hellén, 1967)
 Hellén 1967, 1971, Townes 1983, Horstmann 1990b
- Tropistes* Gravenhorst, 1829
falcatus (Thomson, 1884)
 Hellén 1940, 1941a, 1941c, 1967
nitidipennis Gravenhorst, 1829
 Hellén 1915
- Orthizema* Foerster, 1869
 =*Phyzelus* Foerster, 1869
boreophila (Hellén, 1967)
 Hellén 1967, 1971, Jussila 1984
eleganticornis (Schmiedeknecht, 1933)
 Suomelle uusi laji
glabricula (Hellén, 1967)
 Hellén 1967
hadrocera (Thomson, 1884)
 Hellén 1967, 1971, Jussila 1984
 =*fasciata* (Brischke, 1888)
 Hellén 1941a, 1941c
opaciotum (Hellén, 1967)
 Hellén 1967, 1971, Horstmann 1980b, 1990b
pullator (Gravenhorst, 1829)
 Hellén 1967, 1971, Jussila 1984
subannulata (Bridgman, 1883)
 Suomelle uusi laji
 =*ornata* (Bridgman, 1890)
triannulata (Thomson, 1885)
 Hellén 1967, 1971, Jussila 1984
- Tricholinum* Foerster, 1869
ischnocerus (Thomson, 1888)
- =*pimploides* (Roman, 1930)
 Krogerus 1932, Meyer 1933, Hellén 1940, 1967
 [*Leptocryptoides* Horstmann, 1976
clavipes (Thomson, 1888)]
 [Hellén 1937, 1940, 1967]
- Gnotus* Foerster, 1869
chionops (Gravenhorst, 1829)
 Hellén 1967, 1971
macrurus (Thomson, 1884)
 Hellén 1967, 1971
tenuipes (Gravenhorst, 1829)
 Hellén 1937, 1940, 1967, Jussila 1965a, 1984
- Hedylus* Foerster, 1869
crassicornis Ashmead, 1899
 Horstmann 1990b
 =*setosus* Hellén, 1967
 Hellén 1967, 1971, Horstmann 1980b, Jussila 1984
- Stibeutes* Foerster, 1850
cinctellus (Boyer de Fonscolombe, 1851)
 Horstmann 1980a
 =*curvispina* (Thomson, 1884)
 Hellén 1937, 1940, 1967, 1971
gravenhorstii Foerster, 1850
 Hellén 1967, 1971
 =*acutipennis* auct.
 Hellén 1937, 1940, [Krogerus 1938]
heinemanni Foerster, 1850
 [Hellén 1937, 1940], 1967, Horstmann 1993
infernalis (Ruthe, 1859)
 [Hellén 1937, 1940], 1967, Jussila 1965a, Fitton 1978
 =*liogaster* (Thomson, 1884)
 Jussila 1984, Silfverberg 1986
- Subhemiteles* Horstmann, 1976
mixtus (Bridgman, 1883)
 nyky-Suomelle uusi laji
 =*flavipes* (Thomson, 1888), preocc.

- =*flavitarsis* (Dalla Torre, 1902)
[Hellén 1967, 1971]
- Theroscopus* Foerster, 1850
- boreaphilus* (Hellén, 1967)
Hellén 1967, Jussila 1984, Horstmann 1990b
- dromicus* (Gravenhorst, 1815)
Hellén 1967
- esenbeckii* (Gravenhorst, 1815)
Meyer 1933
- =*subzonatus* (Gravenhorst, 1815)
Hellén 1937, 1940, 1967, Jussila 1965a, 1976, 1984
- hemipteron* (Riche, 1791)
- =*hemipterus* (Fabricius, 1793)
Hellén 1937, 1940, 1967, Jussila 1965a, 1976, 1984
- melanopygus* (Gravenhorst, 1829)
Hellén 1967, 1971
- ornaticornis* (Schmiedeknecht, 1897)
Nordström 1948, Hellén 1967, 1971
- pedestris* (Fabricius, 1775)
Nordström 1948, Hellén 1967, Horstmann 1993
- rufulus* (Gmelin in Linnaeus, 1790)
Meyer 1933
- trochanteratus* (Thomson, 1884)
Suomelle uusi laji
- ungularis* (Thomson, 1884)
Hellén 1937, 1940, 1967
- Megacara* Townes, 1970
- hortulana* (Gravenhorst, 1829)
- =*rusticellae* (Bridgman, 1886)
Meyer 1933, Krogerus 1960
- vagans* (Gravenhorst, 1829)
Hellén 1937, 1940, 1967, Krogerus 1960, Jussila 1984
- Phygadeuon* Gravenhorst, 1829
- =*Iselix* Foerster, 1869
- acutipennis* Thomson, 1884
Jussila 1984, Horstmann 1993, Silfverberg 1996
- alpinus* (Thomson, 1884)
Suomelle uusi laji
- austriacus* (Gravenhorst, 1829)
Horstmann, 1990
- =*elfvingi* (Hellén, 1967)
Hellén 1967, 1971
- brachyurus* Thomson, 1884
Meyer 1933, Hellén 1937, 1940, 1967, 1971, Jussila 1965a, 1976, 1984
- =*stilpninus* auct.
Hellén 1937, 1940
- brevitarsis* Thomson, 1884
Suomelle uusi laji
- canaliculatus* Thomson, 1889
Hellén 1937, 1957, 1961, 1967, Jussila 1965a, 1984
- cephalotes* (Gravenhorst, 1829)
Hellén 1937, 1940, 1967
- clotho* Kriechbaumer, 1892
- =*lachesis* Kriechbaumer, 1892
Hellén 1967, 1971
- =*forticornis* auct.
Hellén 1957, 1961
- crassicornis* (Gravenhorst, 1829)
Suomelle uusi laji
- cubiceps* Thomson, 1884
Hellén 1937, 1940, 1967, Jussila 1984
- curviscapus* Thomson, 1889
Hellén 1967
- cylindraceus* Ruthe, 1859
Krogerus [1927], 1932, Hellén [1931], 1940, 1967, Jussila 1965a, 1976, 1984
- detestator* (Thunberg, 1822)
ssp. *detestator* (Thunberg, 1822)
Hellén 1940, Jussila 1965a, Hellén 1966a, 1967
- =*fumator* (Gravenhorst, 1829)
Nylander 1859, Woldstedt 1874, Hellén 1923, Jussila 1984
- ssp. *nivalis* Holmgren, 1883
Jussila 1968a, 1976, 1984
- dimidiatus* Thomson, 1884
Hellén 1937, 1940, 1967
- dubius* (Gravenhorst, 1829)
- =*scaposus* Thomson, 1884

- Hellén 1937, 1940, 1967
elegans (Foerster, 1850)
 Horstmann 1993, Silfverberg 1996
 = *cingulatus* Foerster, 1850
 Nylander 1859, Hellén 1923, Nordström 1948
exiguus (Gravenhorst, 1829)
 Hellén 1937, 1940, 1967, Jussila 1965a, 1984
flavicans Thomson, 1884
 von Essen 1910
flavimanus (Gravenhorst, 1829)
 von Essen 1910, Hellén 1940
geniculatus (Kriechbaumer, 1892)
 Hellén 1937, 1957, 1961, 1967
grandiceps Thomson, 1884
 von Essen 1910
hercynicus (Gravenhorst, 1829)
 Hellén 1937, 1957, 1961, 1967
inaris (Hellén, 1967)
 Hellén 1967, 1971, Jussila 1984, Horstmann
 1990b
inflatus Thomson, 1884
 Hellén 1967, 1971
 = *infelix* (Dalla Torre, 1902)
laeviventris Thomson, 1884
 Hellén 1937, 1940, 1967, Jussila 1965a, 1976,
 1984
lapponicus Thomson, 1884
 Krogerus 1934, 1938, 1906, Hellén 1940,
 1967, Jussila 1965a, 1984
 [*lateareolatus* Hellén, 1967]
 [Hellén 1967, Horstmann 1990b]
leucostigmus (Gravenhorst, 1829)
 Hellén 1967, 1971, Jussila 1984
 = *punctigena* Thomson, 1884
 Hellén 1957, 1961, 1967
liosternus Thomson, 1884
 Hellén 1937, 1940, 1967
longigena Thomson, 1884
 Hellén 1937, 1940, 1967
nanus (Gravenhorst, 1829)
 Forsius 1925, Hellén 1926, 1940, 1967
nitidus (Gravenhorst, 1829)
 Hellén 1937, 1940, 1967
occisor Habermehl, 1923
 Jussila 1996, 1999
oppositus Thomson, 1884
 Krogerus 1942, Hellén 1940, 1967, Jussila
 1965a, 1984, Nuorteva & Jussila 1967
ovatus (Gravenhorst, 1829)
 Hellén 1937, 1940, 1967, Sawoniewicz 1986
 = *caliginosus* (Gravenhorst, 1829)
pallicarpus Thomson, 1884
 Hellén 1967, Jussila 1989
 = *pallidicarpus* auct.
 Krogerus 1942, 1960, Frey 1943, Hellén 1947,
 Jussila 1984, Silfverberg 1986
 = *rugipectus* (Thomson, 1884)
 von Essen 1910, Hellén 1940, 1967, Jussila
 1965a, 1984
paradoxus (Bridgman, 1889)
 Horstmann 1993, Silfverberg 1996
pegomyiae Habermehl, 1928
 Hellén 1967, 1971
planicollis (Hellén, 1967)
 Hellén 1967, 1971, Jussila 1976, Horstmann
 1980b, 1990
punctipleuris Thomson, 1884
 Hellén 1967
punctiventris Thomson, 1884
 Suomelle uusi laji
rotundipennis Thomson, 1884
 Hellén 1937, 1940, 1967, Horstmann 1993
ruficornis (Gravenhorst, 1829)
 = *nobilitatus* Schmiedeknecht, 1905
 Hellén 1967
rugulosus (Gravenhorst, 1829)
 Hellén 1937, 1940, 1967, Jussila 1965a, 1984
 = *semipolitus* Taschenberg, 1865
 [von Essen 1910]
stilpninus Thomson, 1888
 Suomelle uusi laji
 [*striiventris* Hellén, 1967]
 [Hellén 1967, Horstmann 1990b]
subspinosus (Gravenhorst, 1829)
 Krogerus 1934, [1938], 1960, Hellén 1940,
 1967
subtilis (Gravenhorst, 1829)
 Hellén 1940, 1967, Jussila 1984

- tenuiscapus* Thomson, 1884
 Hellén 1937, 1940, 1967
thomsoni Roman, 1924
 Hellén 1957, 1961
trichops Thomson, 1884
 von Essen 1910, Krogerus 1934, [1938], 1960,
 Hellén 1940, 1967, Jussila 1976, 1984, Silfver-
 berg 1981
 = *ocularis* Thomson, 1889
 Krogerus 1934, Hellén 1940, 1967
trogodytes (Gravenhorst, 1829)
 Nordström 1948, Hellén 1952a, 1967, Jussila
 1984
variabilis (Gravenhorst, 1829)
 Hellén 1939, 1940, 1967
vexator (Thunberg, 1822)
 Hellén 1937, 1940, 1967
- Ceratophygadeuon* Viereck, 1924
longiceps (Thomson, 1884)
 Hellén 1957, 1961, 1967
- Stilpnina
- Stilpnus* Gravenhorst, 1829
 sg. *Polythembia* Foerster, 1869
oligomerus (Foerster, 1876)
 Jussila 1987
tenebricosus (Gravenhorst, 1829)
 Krogerus 1932, Hellén 1940, Jussila 1965a,
 1984, 1987
 = *nitidulator* Zetterstedt, 1838
 Woldstedt 1874, Hellén 1923
 = *vestalis* (Haliday, 1838)
 Woldstedt 1874
- sg. *Xestophyes* Foerster, 1869
dryadum Curtis, 1832
 Jussila 1987
montanus (Foerster, 1876)
 Jussila 1987
- sg. *Stilpnus* Gravenhorst, 1829
blandus Gravenhorst, 1829
 Hellén 1937, 1940, Jussila 1987
bottnicus Jussila, 1987
 Jussila 1987
crassicornis Thomson, 1884
 Krogerus 1934, [1960], Hellén 1940, Jussila
 1987
gagates (Gravenhorst, 1829)
 Woldstedt 1874, Hellén 1923, 1940, Jussila
 1987
parvulus Foerster, 1876
 Jussila 1987
pavoniae (Scopoli, 1763)
 Hellén 1937, 1940, Jussila 1987
 = *angustus* Thomson, 1884
 Hellén 1937
rectangulus Roman, 1918
 Jussila 1987
subzonulus Foerster, 1876
 Jussila 1987
 = *tenuipes* Thomson, 1884
 Hellén 1937, 1940
- Mesoleptus* Gravenhorst, 1829
 = *Exolytus* Holmgren, 1859
filicornis (Thomson, 1884)
 Suomelle uusi laji
laevigatus (Gravenhorst, 1829)
 Woldstedt 1874, Krogerus 1934, 1960, Hellén
 1940, 1953, Hedwig 1956, Jussila 1962
marginatus (Thomson, 1884)
 Suomelle uusi laji
 = *petiolaris* (Thomson, 1884)
ripicola (Thomson, 1884)
 Nordström 1940, Hellén 1941c
scrutator (Haliday, 1838)
 Krogerus 1938, [1960], Hellén 1940, [1941c],
 Jussila 1965a, 1984
 = *flavipes* (Thomson, 1884)
- Atractodes* Gravenhorst, 1829
 Sg. *Atractodes* Gravenhorst, 1829
 [*alpestris* Roman, 1918]
 [Jussila 1979]
arator Haliday, 1838

- Jussila 1979, Silfverberg 1981
bicolor Gravenhorst, 1829
 ssp. *bicolor* Gravenhorst, 1829
 Gravenhorst 1829, Krogerus 1932, [1938, 1960], Hellén 1940, Jussila 1979
 =*petulans* (Foerster, 1850)
 [Krogerus 1927, 1932, Meyer 1933]
 ssp. *arcticus* Holmgren, 1872
 Jussila 1979
brevipennis Jussila, 1979
 Jussila 1979, Silfverberg 1981
fumatus Haliday, 1838
 Jussila 1979, Silfverberg 1981
gilvipes Holmgren, 1859
 Hellén 1937, 1940, Jussila 1965a, 1979, 1984
gravidus (Gravenhorst, 1829)
 [Krogerus 1932, Hellén 1940], Jussila 1965a, 1979, 1984, Silfverberg 1981
 =*fraternus* Foerster, 1876
 [Hellén 1937, 1940]
 =*archangelicae* Roman, 1913
lapponicus Jussila, 1979
 Jussila 1979, Silfverberg 1981
obsoletor (Zetterstedt, 1838)
 Jussila 1994
 =*neophytus* Foerster, 1876
 Jussila 1979, Silfverberg 1981
pauxillus Foerster, 1876
 Jussila 1979, 1984
 =*breviscapus* Thomson, 1884
 Krogerus 1934, Hellén 1940, Jussila 1965a
pusillus Foerster, 1876
 Jussila 1975, 1979, 1984
 =*liogaster* Thomson, 1884
 Hellén 1937, 1940
ruficollis Jussila, 1979
 Jussila [1979], 1993, Silfverberg 1996
townesi Jussila, 1983
 Suomelle uusi laji
 =*holmgreni* Jussila, 1979, homonym
- Sg. *Hadratractodes* Jussila, 1979
romani Jussila, 1979
 Jussila 1997, 1999
- vicinus* Foerster, 1876
 Jussila 1994
 =*intersectus* Foerster, 1876
 Jussila 1979
 =*crassicornis* Thomson, 1884
 [Krogerus 1838, Hellén 1940, 1941c]
- Sg. *Rugatractodes* Jussila, 1979
alpinus Foerster, 1876
 Hellén 1937, 1940, Jussila 1965a, 1968a, 1979, 1984, Silfverberg 1986
fennoscandicus Jussila, 1979
 Jussila 1979, 1997, Silfverberg 1981
incrassator Roman, 1914
 [Krogerus 1938, 1960, Hellén 1940, 1941c], Jussila 1975, 1979, 1984
pediophilus Foerster, 1876
 Jussila 1975, 1979
procerus Foerster, 1876
 Jussila 1975, 1979, Silfverberg 1981
remotus Jussila, 1997
 Jussila 1997 (stat. n.)
robustus Roman, 1939
 Hellén 1952b, 1956
- Sg. *Asyncrita* Foerster, 1876
acuminator Roman, 1909
 Krogerus 1938, 1960, Hellén 1937, 1940, Jussila 1979, 1984, Silfverberg 1981
ambiguus Ruthe, 1859
 Jussila 1979, 1984, Silfverberg 1981
angustipennis Foerster, 1876
 Hellén 1937, 1940, [Krogerus 1960], Jussila 1965a, 1975, 1979, 1984
assimilis Foerster, 1876
 Jussila 1979, Silfverberg 1981
croceicornis Haliday, 1838
 Krogerus 1934, [1938], 1960, Hellén 1940, 1953, Jussila 1962, 1965a, 1975, 1979, 1984
cryptobius Foerster, 1876
 Jussila 1994
 =*parallelus* Thomson, 1884
 Hellén 1937, 1940, Jussila 1965a, 1968a
 =*eryptobius* auct.

Jussila 1979, 1984
cultellator Haliday, 1838
 Woldstedt 1874
designatus (Foerster, 1876)
 Jussila 1979, 1984, Silfverberg 1981
exilis Haliday, 1840
 Woldstedt 1874, Hellén 1937, 1940, Krogerus
 1960, Jussila 1965a, 1979, 1984, Nuorteva &
 Jussila 1967, 1969
exitialis Foerster, 1876
 [Hellén 1940, 1941c]
 ssp. *exitialis* Foerster, 1876
 Jussila 1979
 = *exstialis* auct.
 [Krogerus 1938]
 ssp. *alpigena* Foerster, 1876
 Jussila 1979, 1984
foveolatus Gravenhorst, 1829
 Gravenhorst 1829, Hellén 1937, 1940, 1944,
 1947, Jussila 1965a, 1965b, 1979, Silfverberg
 1981
 = *canaliculatus* (Hellén, 1944)
 Hellén 1944a, 1947, Jussila 1965a, Horstmann
 1990b
genuinus Foerster, 1876
 Jussila 1979, 1984, Silfverberg 1981
holmgreni Roman, 1918
 Jussila 1979, Silfverberg 1981
picipes Holmgren, 1859
 Hellén 1937, 1940, Jussila 1979
 [*podagricus* (Roman, 1909)]
 [Jussila 1979]
scutellatus (Hellén, 1944)
 Kangas & Leskinen 1943, Hellén 1944a, 1947,
 Jussila 1976, 1979, Pulkkinen 1989, Horstmann
 1990b
spiraculator Roman, 1918
 Hellén 1942, 1947, Jussila 1965a, 1979, 1984,
 Nuorteva & Jussila 1967
striativentris Jussila, 1979
 Jussila 1979, Silfverberg 1981
turkuensis Jussila, 1979
 Jussila 1979a, 1986, Silfverberg 1981

Sg. *Cyclaulatractodes* Jussila, 1979
alutaceus Thomson, 1884
 Hellén 1970b, 1971, Jussila 1979, 1984,
 Silfverberg 1981
oreophilus Foerster, 1876
 Hellén 1937, 1940, Jussila 1965a, 1979, 1984
punctator Roman, 1909
 Jussila 1979, Silfverberg 1981

Cremnodina

Cremnodes Foerster, 1850
 = *Cremnias* Roman, 1939
atricapillus (Gravenhorst, 1815)
 Nordström 1948, Hellén 1966b, Vikberg 1983,
 Horstmann 1993, Silfverberg 1996

APTESINI

=HEMIGASTRINI

Demopheles Foerster, 1869
corruptor (Taschenberg, 1865)
 = *caliginosus* auct.
 von Essen 1910, Hellén 1940, Jussila 1965a,
 1984

Javra Cameron, 1903
 = *Monocryptus* Hellén, 1956
opaca (Thomson, 1873)
 Hellén [1940], 1957
 = *gracilicornis* (Kriechbaumer, 1891)
 [Hellén 1939]

tricincta (Gravenhorst, 1829)
 Hellén 1939, 1940

Parmortha Townes in Townes & Gupta, 1962
parvula (Gravenhorst, 1829)
 Hellén 1937, 1940
 = *erythropus* (Gravenhorst, 1829)
 Krogerus 1934, [1938], 1960, Hellén 1940
pleuralis (Thomson, 1873)
 Jussila 1965a
Cratocryptus Thomson, 1873
furcator (Gravenhorst, 1829)

Nylander 1859, Hellén 1923, 1940, 1942, 1947

fuscipes (Roman, 1914)

Hellén 1957, 1961

Cubocephalus Ratzeburg, 1848

= *Chaeretymma* Foerster, 1869

= *Stenocryptus* Thomson, 1873

= *Microcryptus* Thomson, 1873

anatorius (Gravenhorst, 1829)

Woldstedt 1874, von Essen 1910, Krogerus [1938], 1960, Hellén 1940, Jussila 1965a, 1984

associator (Thunberg, 1822)

ssp. *associator* (Thunberg, 1822)

Krogerus 1932, Hellén 1940, Silfverberg 1986
= *leucopsis* auct.

von Essen 1910

ssp. *lapponicus* (Roman, 1909)

[Hellén 1939, 1940], Jussila 1984

brevicornis (Taschenberg, 1865)

Woldstedt 1874

= *oviventris* (Gravenhorst, 1829), praeocc.

von Essen 1910

distinctor (Thunberg, 1822)

Meyer 1933, Hellén 1940

= *fortipes* (Gravenhorst, 1829)

von Essen 1910

erythrinus (Gravenhorst, 1829)

von Essen 1910, Hellén 1940, 1957, 1961, Jussila 1984

femoralis (Thomson, 1873)

Nordström 1938, Hellén 1940, 1941c

minutor (Zetterstedt, 1838)

Zetterstedt 1838, Sawoniewicz 1993

nigriventris (Thomson, 1874)

von Essen 1910, Hellén 1940, Jussila 1984, Silfverberg 1986

punctulatus (Kriechbaumer, 1871)

[Hellén 1939], nyky-Suomelle uusi laji

renovator (Thunberg, 1822)

Nordström 1938, Hellén 1940, 1941c, Frey 1940

= *annulitarsis* (Thomson, 1873)

septentrionalis Roman, 1909

von Essen 1910, [Krogerus 1938, 1960], Hellén 1940

sternocerus (Thomson, 1873)

Hellén 1937, 1940, Jussila 1965a, 1984

= *stenocerus* auct.

Nuorteva & Jussila 1967

Echthrus Gravenhorst, 1829

reluctator (Linnaeus, 1758)

Gravenhorst 1829, Woldstedt 1874, Forsius 1925, Hellén 1937, 1940

Oresbius Marshall, 1867

arridens (Gravenhorst, 1829)

Hellén 1937, 1940

brevialatus (Schmiedeknecht, 1915)

von Essen 1910, Roman 1939, Hellén 1940, Jussila 1984

galactinus (Gravenhorst, 1829)

Hellén 1941a, 1941c

lapponicus (Thomson, 1873)

[Hellén 1940, Krogerus 1960], Jussila 1984

? = *subalpinus* (Roman, 1909)]

[von Essen 1910, Hellén 1937]

leucopsis (Gravenhorst, 1829)

Jussila 1962, 1968b, Sawoniewicz 1988

nigricornis (Thomson, 1883)

von Essen 1910, Hellén 1957

nivalis (Zetterstedt, 1838)

[Meyer 1933, Krogerus 1938, Hellén 1940, 1941c], Nuorteva & Jussila 1967, Jussila & Nuorteva 1968, Jussila 1984

puncticollis (Thomson, 1883)

[Krogerus 1938, 1960, Hellén 1940, 1941c], Jussila 1996 1999

septentrionalis (Thomson, 1883)

[Krogerus 1938, 1960, Hellén 1940, 1941c, 1957, 1961], Jussila 1965a, 1984, Nuorteva & Jussila 1969

terrestris (Roman, 1909)

[Hellén 1939, 1940], Jussila 1976, 1984

Polytribax Foerster, 1869

arrogans (Gravenhorst, 1829)

- Woldstedt 1874, von Essen 1910, Krogerus 1934, [1938], 1960, Hellén 1940
flavopunctatus (Bridgman, 1889)
 von Essen 1910, Hellén 1940
gravenhorsti (Thomson, 1883)
 Hellén 1941a, 1941c, Jussila 1976
perspicillator (Gravenhorst, 1807)
 Hellén 1941a, 1941c
rufipes (Gravenhorst, 1829)
 Hellén 1941a, 1941c, Frey 1943
- Aconias* Cameron, 1904
tarsatus (Bridgman, 1881)
 Nordström 1944, Hellén 1947
- Plectocryptus* Thomson, 1874
digitatus (Gmelin in Linnaeus, 1790)
 Suomelle uusi laji
- Giraudia* Foerster, 1869
 = *Pseudocryptus* Kriechbaumer, 1893
grisescens (Gravenhorst, 1829)
 Nylander 1859, Hellén 1947, Viitasaari 1976
gyratoria (Thunberg, 1822)
 Hellén 1940, 1941a, 1953, Hedwig 1956, Jussila 1962
 = *congruens* (Gravenhorst, 1829)
 Gravenhorst 1829, Woldstedt 1874, von Essen 1910
scansor (Thomson, 1890)
 Nylander 1859, Hellén 1923, 1940
- Schenkia* Foerster, 1869
crassicornis (Kriechbaumer, 1891)
 Hellén 1957, 1961
graminicola (Gravenhorst, 1829)
 Woldstedt 1874, von Essen 1910, Krogerus 1838, 1960, Hellén 1940
humeralis Sawoniewicz, 1993
 Sawoniewicz 1993, Silfverberg 1996
longicauda (Thomson, 1883)
 Krogerus 1934, Hellén 1940, Jussila 1984
opacula (Thomson, 1883)
 von Essen 1910, Krogerus 1934, 1960, Hellén 1940, Jussila 1965a, 1984
rubricollis (Thomson, 1883)
 Hellén 1937, 1940
spinolae (Gravenhorst, 1829)
 = *spinolai* auct.
 Hellén 1941a, 1946, 1952a
 = *aries* (Thomson, 1883)
 Krogerus 1938
- Megaplectes* Foerster, 1869
monticola (Gravenhorst, 1829)
 Gravenhorst 1829, Woldstedt 1874, Holmgren 1886, von Essen 1910, Hellén 1940
- Pleolophus* Townes in Townes & Gupta, 1962
basizonius (Gravenhorst, 1829)
 Gravenhorst 1829, von Essen 1910, Forsius 1911, 1912, Krogerus 1934, [1938], 1960, Hellén 1940
brachypterus (Gravenhorst, 1815)
 von Essen 1910, Jussila 1984
 = *assimilis* (Foerster, 1850)
 Woldstedt 1874
larvatus (Gravenhorst, 1829)
 Sawoniewicz 1988
 = *alutaceus* (Thomson, 1868)
 [von Essen 1910], Hellén 1957, 1961
 = *discedens* (Schmiedeknecht, 1905)
 [Krogerus 1938, 1960, Hellén 1940]
micropterus (Gravenhorst, 1815)
 von Essen 1910, Hellén 1939, 1940, Jussila 1965a, 1976
sperator (Müller, 1776)
 von Essen 1910, Hellén 1940, Jussila 1962
- Rhytura* Townes in Townes & Gupta, 1962
europaeator Sawoniewicz, 1993
 Sawoniewicz 1993, Silfverberg 1996
- Aptesis* Foerster, 1850
albulatoria (Gravenhorst, 1829)
 [Hellén 1937, 1940], nyky-Suomelle uusi laji
alpineti (Roman, 1913)
 [Hellén 1957], Jussila 1965a, 1984

- assimilis* (Gravenhorst, 1829)
Woldstedt 1874, Hellén 1923, 1940
= *distans* (Thomson, 1896)
von Essen 1910
cretata (Gravenhorst, 1829)
Hellén 1957, 1961
femoralis (Thomson, 1883)
von Essen 1910, Hellén 1940
flagitator (Rossi, 1794)
Nordström 1952, Hellén 1956, 1967
improba (Gravenhorst, 1829)
Hellén 1941a, 1941c, Jussila 1965a, 1984, Frilli 1974, Silfverberg 1986
jejunator (Gravenhorst, 1807)
= *abdominator* (Gravenhorst, 1829)
von Essen 1910, Hellén 1939, 1940, [Krogerus 1960]
nigritula (Thomson, 1885)
Suomelle uusi laji
nigrocincta (Gravenhorst, 1815)
ssp. *nigrocincta* (Gravenhorst, 1815)
Gravenhorst 1829, Woldstedt 1874, von Essen 1910, Hellén 1923, 1940, 1953b, Krogerus [1927, 1932], 1934, 1938, 1960, Jussila 1965a, 1976, Silfverberg 1996
ssp. *stroblii* (Roman, 1909)
Krogerus 1938, Jussila 1984
sericans (Gravenhorst, 1829)
[Krogerus 1838, Hellén 1940, 1941c], nyky-Suomelle uusi laji
subguttata (Gravenhorst, 1829)
[Hellén 1937, 1940], nyky-Suomelle uusi laji
terminata (Gravenhorst, 1829)
[von Essen 1910, Hellén 1940], nyky-Suomelle uusi laji
- CRYPTINI
=MESOSTENINI
- Agrothereutina
- Apsilops* Foerster, 1869
= *Trichocryptus* Thomson, 1873
[*aquaticus* (Thomson, 1874)]
[Krogerus 1960]
cinctorius (Fabricius, 1775)
Gravenhorst 1829, von Essen 1910, Krogerus 1934, 1960, Hellén 1940
tenebrosus Hellén, 1957
Hellén 1957, 1961, Horstmann 1990b
- Thrybius* Townes in Townes, Momoi & Townes, 1965
praedator (Rossi, 1792)
= *drewseni* (Thomson, 1873)
Hellén 1957, 1961
tricolor (Gravenhorst, 1829)
[von Essen 1910, Hellén 1940], Jussila 1969
- Agrothereutes* Foerster, 1850
= *Spilocryptus* Thomson, 1873
abbreviatus (Fabricius, 1794)
= *abbreviator* (Fabricius, 1798)
von Essen 1910, Hellén 1940, Jussila 1969, 1984
= *pygoleucus* (Gravenhorst, 1829)
Forsius 1912, Fulmek 1968
adustus (Gravenhorst, 1829)
[von Essen 1910, Hellén 1940], Jussila 1969
aterrimus (Gravenhorst, 1829)
Hellén 1941a, 1941c
bombycis (Boudier, 1836)
?= *tibialis* (Thomson, 1873)
von Essen 1910, Hellén 1941a, 1941c
fumipennis (Gravenhorst, 1829)
Woldstedt 1874, Hellén 1937, 1940, 1971, Jussila 1984
= *zygaenarum* (Thomson, 1873)
von Essen 1910, Forsius 1925
hospes (Tschek, 1870)
= *solitarius* (Tschek, 1870)
Krogerus 1934, 1960, Hellén 1940, Grönblom 1964, Jussila 1965a, 1968a, 1969
mandator (Linnaeus, 1758)
Viitasaari 1979, 1982, Vikberg & Viitasaari 1991
= *cimbicis* (Tschek, 1870)
von Essen 1910, Forsius 1925

- mansuetor* (Tschek, 1870)
von Essen 1910, Hellén 1940
- saturniae* (Boie, 1855)
Hellén 1941b, 1941c
- Gambrus* Foerster, 1869
=*Hygrocryptus* Thomson, 1873
- carnifex* (Gravenhorst, 1829)
Krogerus 1934, 1960, Hellén 1940
- conjungens* (Tschek, 1870)
Jussila 1969
- dentatus* (Taschenberg, 1865)
Meyer 1933 [?]
- incubitor* (Linnaeus, 1758)
Krogerus 1934, 1960, Hellén 1940, Jussila 1965a, 1969
- =*ornatus* (Gravenhorst, 1829)
Gravenhorst 1829, von Essen 1910, Hellén 1957
- =*inferus* Thomson, 1896
Hellén 1937, 1940, Jussila 1984, Silfverberg 1986
- =*ornatulus* (Thomson, 1873)
Hellén 1937, 1940, 1961
- palustris* (Thomson, 1873)
Krogerus 1934, 1960
- Hoplocryptus* Thomson, 1873
- bellosus* (Curtis, 1837)
=*signatorius* (Fabricius, 1793) preocc.
Hellén 1937, 1940, 1957, 1961
- bipunctatus* (Tschek, 1872)
Hellén 1951, 1956
- confector* (Gravenhorst, 1829)
Gravenhorst 1829, von Essen 1910, Hellén 1940, Jussila 1962, Silfverberg 1986
- =*dubius* (Taschenberg, 1865)
Hellén 1937, 1940, 1946, 1952a
- coxator* (Tschek, 1870)
von Essen 1910, Hellén 1937, 1940
- fugitivus* (Gravenhorst, 1829)
von Essen 1910, Hellén 1940, 1957, 1961, Jussila 1969, Silfverberg 1981
- =*binotatulus* (Thomson, 1873)
Hellén 1937, 1940
- =*heliophilus* auct.
von Essen 1910, Hellén 1940
- rufoniger* (Desvignes, 1896)
=*mesoxanthus* (Thomson, 1873)
von Essen 1910
- occisor* (Gravenhorst, 1829)
von Essen 1910, Hellén 1957, 1961, Jussila 1965a, 1976, 1984
- quadriguttatus* (Gravenhorst, 1829)
Hellén 1941a, 1941c
- =*quadripunctatus* auct.
Nordman 1940
- Aritranis* Foerster, 1869
=*Pycnocryptus* Thomson, 1873
- director* (Thunberg, 1822)
Jussila 1969
- =*peregrinator* auct.
von Essen 1910
- explorator* (Tschek, 1870)
Suomelle uusi laji
- nigripes* (Gravenhorst, 1829)
Silfverberg 1986
- =*insectator* (Tschek, 1870)
Hellén 1957, 1961, Jussila 1969
- Hidryta* Foerster, 1869
=*Brachycryptus* Thomson, 1873
- frater* (Cresson, 1864)
Jussila 1965a, 1984
- =*erythrocerus* (Thomson, 1873)
Krogerus 1934
- sordida* (Tschek, 1870)
Hellén 1940, 1957, 1961
- sordidula* (Thomson, 1873)
Hellén 1944a, 1957
- Idiolispa* Foerster, 1869
- analisis* (Gravenhorst, 1807)
von Essen 1910, Krogerus 1932, 1960, Hellén 1940, 1957, 1961
- =*tenuicornis* auct.
Hellén 1937, 1940

- =*anator* auct.
Jussila 1969
- grossa* (Gravenhorst, 1829)
von Essen 1910, Hellén 1940, Jussila 1965a, 1984
- obfuscator* (Villers, 1789)
Suomelle uusi laji
- =*tenuicornis* (Thomson, 1896)
- subalpina* (Schmiedeknecht, 1904)
von Essen 1910, Hellén 1940, Schwarz 1988
- =*heydeni* (Habermehl, 1918)
Hellén 1937, 1940
- Trychosis* Foerster, 1869
- atripes* (Gravenhorst, 1829)
Hellén 1946
- glabriculus* (Thomson, 1873)
Hellén 1937, 1940, Jussila 1969
- gradarius* (Tschek, 1870)
Suomelle uusi laji
- =*nitidulus* (Thomson, 1896)
- ingrata* (Tschek, 1870)
Hellén 1939, 1940
- legator* (Thunberg, 1822)
Krogerus [1927], 1932, 1934, 1960, Hellén 1931, 1939, 1940, 1941c, 1957, 1961, Jussila 1965a, 1969, 1984, Jussila & Nuorteva 1968, Silfverberg 1986
- =*plebeja* (Tschek, 1870)
von Essen 1910
- =*rusticus* (Tschek, 1870)
Hellén 1946, 1952a
- =*nitidulus* auct.
Hellén 1937, 1940
- =*annulicornis* auct.
Hellén 1946, 1952a
- mesocastanus* (Tschek, 1870)
Nordström 1948, Hellén 1952a, Jussila 1984
- neglectus* (Tschek, 1870)
von Essen 1910, Hellén 1940
- pauper* (Tschek, 1870)
van Rossem 1966
- =*lapponicus* (Thomson, 1894)
[Krogerus 1927, 1932], Hellén [1931, 1940], 1946
- picta* (Thomson, 1873)
von Essen 1910, Hellén 1940
- Cryptina
=Hedycryptina
=Ischnina
- Enclisis* Townes, 1970
- macilenta* (Gravenhorst, 1829)
Nordström 1938, Frey 1940, Hellén 1940, 1941c
- =*remex* (Tschek, 1870)
Hellén 1937, 1940
- ornaticeps* (Thomson, 1885)
Suomelle uusi laji
- vindex* (Tschek, 1870)
Hellén 1937, 1940, Jussila 1965a, 1984
- =*nubifera* (Thomson, 1896)
Hellén 1937, 1940
- =*striolata* (Thomson, 1896)]
[Hellén 1941a, 1941c]
- Ischnus* Gravenhorst, 1829
- =*Habrocryptus* Thomson, 1873
- alternator* (Gravenhorst, 1829)
von Essen 1910, Hellén 1940, 1957, Jussila 1965a, 1969, 1984
- collaris* (Tschek, 1872)
- =*punctiger* (Thomson, 1896)
Hellén 1941a, 1941c, 1957, Jussila 1965a, 1984
- migrator* (Fabricius, 1775)
Gravenhorst 1829, Woldstedt 1874, von Essen 1910, Hellén 1940, Grönblom 1964
- =*inquisitorius* (Müller, 1776)
Jussila 1969
- =*porrectorius* (Fabricius, 1787)
Hellén 1940, 1946, 1957, Jussila 1962
- =*assertorius* (Fabricius, 1793)
Woldstedt 1874, von Essen 1910
- =*brachyurus* (Gravenhorst, 1829)
Gravenhorst 1829, Reuter 1895, von Essen 1910, Krogerus [1938], 1960

=*melanarius* Hellén, 1957
Hellén 1957, 1961

Caenocryptus Thomson, 1873
polytomi (Tschek, 1872)
Schwarz 1990, Silfverberg 1996

=*melanarius* (Hellén, 1956)
Horstmann 1990b

rufiventris (Gravenhorst, 1829)
Hellén 1941a, 1941c

Nippocryptus Uchida, 1936
quadriannulatus (Gravenhorst, 1829)
Kangas 1940, Hellén 1941c

Buathra Cameron, 1903
laborator (Thunberg, 1822)
Krogerus 1932, Meyer 1933, Hellén 1940
tarsoleuca (Schrank, 1781)
Gravenhorst 1829, von Essen 1910, Roman
1910, Krogerus 1932

Cryptus Fabricius, 1804
=*Itamoplex* Foerster, 1869
arenicola Thomson, 1873
Hellén 1942, 1947
armator Fabricius, 1804
Jussila 1984
=*albatorius* auct.
Hellén 1937, 1940, 1957, 1961, Nuorteva &
Jussila 1967, 1969, Jussila & Nuorteva 1968,
Nuorteva 1971
=*armatorius* auct.
Hellén 1946, 1952a
dianae Gravenhorst, 1829
Woldstedt 1874, [von Essen 1910], Hellén
1940, 1941a, Silfverberg 1986
=*borealis* Thomson, 1873
incultator (Linnaeus, 1758)
=*sponsor* (Fabricius, 1793)
Woldstedt 1874, von Essen 1910, Hellén 1946,
1952a
minator Gravenhorst, 1829
von Essen 1910, Hellén 1940

moschator (Fabricius, 1787)
Gravenhorst, 1829, Hellén 1941a, 1941c
obscuripes Zetterstedt, 1838
Krogerus 1934, [1938, 1960], Hellén 1940,
Jussila 1965a, 1968a, 1984, van Rossem 1989
=*borealis* auct.
von Essen 1910
obscurus (Gmelin in Linnaeus, 1790)
Gravenhorst, 1829, Woldstedt 1874
subquadratus Thomson, 1873
Hellén 1941a, 1941c
titubator (Thunberg, 1822)
Hellén 1940, Silfverberg 1986
=*infumatus* Thomson, 1873
Holmgren 1886, von Essen 1910, Meyer 1933
=*obscurus* auct.
Woldstedt 1874
viduatorius Fabricius, 1804
Woldstedt 1874, von Essen 1910, Krogerus
[1927], 1932, Hellén 1940, 1957, 1961
=*germari* auct.
Hellén 1937, 1940

Xylophrurus Foerster, 1869
angustatus (Dalman, 1823)
=*angustus* auct.
Nordström 1938, Frey 1940, Hellén 1940,
1941c, 1957
lancifer (Gravenhorst, 1829)
Gravenhorst 1829
=*dispar* (Thunberg, 1822), homonym
von Essen 1910, Hellén 1937, 1940, 1957,
Jussila 1962
=*dentifer* (Thomson, 1896)
von Essen 1910, Hellén 1940, 1957

Meringopus Foerster, 1869
=*Goniocryptus* Thomson, 1873
cyanator (Gravenhorst, 1829)
Woldstedt 1874
nigerrimus (Boyer de Fonscolombe, 1850)
Silfverberg 1986
ssp. *murorum* (Tschek, 1872)
von Essen 1910, Hellén 1940, van Rossem

1969

titillator (Linnaeus, 1758)
 Woldstedt 1874, Hellén 1940
 = *recreator* (Fabricius, 1804)
 von Essen 1910
 = *latitarsis* (Thomson, 1873)
 Holmgren 1886

Mesostenina

Mesostenus Gravenhorst, 1829
albinotatus Gravenhorst, 1829
 Hellén 1957, 1961
crassifemur Thomson, 1888
 Hellén 1937, 1940
transfuga Gravenhorst, 1829
 Krogerus 1932, Hellén 1940

Goryphina

Listrognathus Tschek, 1870
 = *Mesostenidea* Viereck, 1914
lcompressicornis (Gravenhorst, 1829)
 Gravenhorst 1829, von Essen 1910, Hellén
 1939, 1940, Grönblom 1964, Horstmann 1990
ligator (Gravenhorst, 1829)
 von Essen 1910
mactator (Thunberg, 1822)
 Hellén 1940, Jussila 1969
 = *pygostylus* (Gravenhorst, 1829)
 von Essen 1910

Ateleutina

Ateleute Foerster, 1869
linearis Foerster, 1871
 [Hellén 1959, 1961], Jussila 1984, Silfverberg
 1986
 = *lissonotoides* (Thomson, 1885)
 Hellén 1937, 1940, [1967]

Osprynchotina
 = *Nematopodiina*

Stenarella Szépligeti, 1916
gladiator (Scopoli, 1763)
 Sääkjärvi 1996

Nematopodius Gravenhorst, 1829
debilis (Ratzeburg, 1852)
 Horstmann 1990a
 = *formosus* auct.
 Hellén 1937, 1940, Jussila & Käpylä 1975

Acroricnus Ratzeburg, 1852
stylator (Thunberg, 1822)
 Hellén 1940, Krogerus 1960
 = *macrobatus* (Gravenhorst, 1829)
 Woldstedt 1874, von Essen 1910

Sphecophagina

[*Schreineria* Schreiner, 1905
annulata (Brischke, 1865)]
 [Hellén 1941a, 1941c]

Sphecophaga Westwood, 1840
vesparum (Curtis, 1828)
 Hellén 1932, 1936, 1940, [1957]

English summary

This third part of our check list contains the subfamily Cryptinae (Ichneumonidae) with 491 species from present-day Finland. In ascertaining the existence of species in Finland, we have also consulted the collections of the Department of Applied Zoology (DAZH) and the Zoological Museum (MZH), University of Helsinki and those of Jussila (RJ) and Vikberg (VV).

Following 31 species are reported as new to Finland: *Pleurogyrus cyclogaster* (Thomson, 1884), *Aclastus eugracilis* Horstmann, 1980, *Aclastus flavipes* Horstmann, 1980, *Polyaulon stiavnicensis* (Capek, 1956), *Dichrogaster genalis* (Habermehl, 1925), *Gelis alopecosae*

Horstmann, 1986, *Gelis bicolor* (Villers, 1789), *Gelis discendens* (Foerster, 1850), *Gelis longulus* (Zetterstedt, 1838) = *speculator* (Foerster, 1851), *Gelis thomsoni* (Schmiedeknecht, 1933), *Endasys bicolor* (Lundbeck, 1896), *Endasys eurycerus* (Thomson, 1896), *Endasys testaceipes* (Brischke, 1891), *Charitopes brunneus* (Morley, 1907), *Orthizema eleganticornis* (Schmiedeknecht, 1933), *Orthizema subannulata* (Bridgman, 1883), *Theroscopus trochanteratus* (Thomson, 1884), *Phygadeuon alpinus* (Thomson, 1884), *Phygadeuon brevitaris* Thomson, 1884, *Phygadeuon crassicornis* (Gravenhorst, 1829), *Phygadeuon punctiventris* Thomson, 1884, *Phygadeuon stilpninus* Thomson, 1888, *Mesoleptus filicornis* (Thomson, 1884), *Mesoleptus marginatus* (Thomson, 1884), *Atractodes (Atractodes) townesi* Jussila, 1983 = *holmgreni* Jussila, 1979, homonym, *Oresbius brevialatus* (Schmiedeknecht, 1915), *Plectrocryptus digitatus* (Gmelin in Linnaeus, 1790), *Aptesis nigritula* (Thomson, 1885), *Pycnocryptus explorator* (Tschek, 1870), *Trychosia gradarius* (Tschek, 1870) = *nitidula* (Thomson, 1896), and *Enclisis ornaticeps* (Thomson, 1885).

Idiolispa obfuscator (Villers, 1789) is remitted to the list. Hellén (1937) reported it earlier as *I. tenuicornis* (Thomson, 1896), but excluded it later (Hellén 1957). This name is a junior synonym of *obfuscator* (Schwarz 1988).

Eight species earlier reported only from the areas nowadays part of Russia, are reported as new to the present-day Finland: *Mastrus fumipennis* (Thomson, 1884), *Subhemiteles mixtus* (Bridgman, 1883), *Cubocephalus punctulatus* (Kriechbaumer, 1871), *Aptesis albulatoria* (Gravenhorst, 1829), *Aptesis sericans* (Gravenhorst, 1829), *Aptesis subguttata* (Gravenhorst, 1829), *Aptesis terminata* (Gravenhorst, 1829) and *Ethelurgus sodalis* (Taschenberg, 1896).

According to Townes (1983) *Charitopes areolaris* (Thomson, 1884) and *Charitopes brunneus* (Morley, 1907) are synonymes. However, we consider them as two different species.

Polyaulon rufipes Foerster, 1871 is dropped from the list. The report from Finland (Jussila 1984) was based on misidentification.

The description of *Arctodeuon* Hellén, 1967 was based on misidentified type species *Gelis glacialis* Holmgren sensu Hellén = *Gelis alopecosae* Horstmann, 1986.

According to Carlson (1979) the names *Thaumatogelis* and *Cryptogelis* are invalid.

Square brackets are used to denote species and references which were collected and reported only from areas which were ceded to the USSR after the war and are thus not part of the territory of present-day Finland. Such species are *Gelis edentatus* (Foerster, 1850), *G. helleni* Kolarov, 1993 = *breviceps* (Hellén, 1967), *G. vulnerans* (Foerster, 1850), *Charitopes macrocerus* Hellén, 1967, *Leptocryptoides clavipes* (Thomson, 1888), *Phygadeuon lateareolatus* Hellén, 1967, *P. striiventris* Hellén, 1967, *Atractodes alpestris* Roman, 1918, *A. podagricus* (Roman, 1909), *Apsilops aquaticus* (Thomson, 1874) and *Schreineria annulata* (Brischke, 1864).

Kirjallisuus

- Carlberg, U. 1980: Larval biology of *Eriogaster lanestrus* (Lepidoptera, Lasiocampidae) in SW Finland. - *Notulae Entomol.* 60: 75-72.
- Carlson, R. W. 1979: Family Ichneumonidae. - *Catalog of Hymenoptera in America North of Mexico* 1: 315-740.
- von Essen, C. L. 1910: Bidrag till kännedomen om Finlands Cryptinae. - *Medd. Soc. Fauna Flora Fenn.* 36: 115-126.
- Fitton, M. G. 1978: The Ichneumonidae (Hymenoptera) described by J. F. Ruthe. - *Z. Arbeitsgem. Österr. Entomol.* 3: 75-80.
- Fitton, M. G. & Gauld, I. D. 1976: The family-group names of the Ichneumonidae (excluding Ichneumoninae) (Hymenoptera). - *Syst. Entomol.* 1: 247-258.
- Fitton, M. G. & Gauld, I. D. 1978: Further notes on family-group names of Ichneumonidae (Hymenoptera). - *Syst. Entomol.* 3: 245-247.

- Forsius, R. 1911: Zur Kenntnis einiger aus Blattwespen erzogener Schlupfwespen. - Medd. Soc. Fauna Flora Fenn. 37: 98-104.
- Forsius, R. 1912: Zur Kenntnis einiger aus Blattwespen erzogener Schlupfwespen. II. - Medd. Soc. Fauna Flora Fenn. 38: 60-65.
- Forsius, R. 1924: Über eine Massenzucht von *Hyponomeuta padi* L. - Notulae Entomol. 4: 44-46.
- Forsius, R. 1925: Über einige durch Zucht erhaltene Schlupfwespen aus Finnland. - Medd. Soc. Fauna Flora Fenn. 49: 62-70.
- Frey, R. 1917: Entomologiska anteckningar från norra Savolaks. - Medd. Soc. Fauna Flora Fennica 43: 84-97.
- Frey, R. 1940: De inhemska entomologiska samlingarnas tillväxt under verksamhetsåret 1938-1939. - Mem. Soc. Fauna Flora Fenn. 15: 270-273.
- Frey, R. 1943: De inhemska entomologiska samlingarnas tillväxt under verksamhetsåret 1941-1942. - Mem. Soc. Fauna Flora fenn. 18: 265-269.
- Frey, R. 1946: Redogörelse för tillväxten av Helsingfors Universitetets Entomologiska museums samlingar under verksamhetsåret 1944-1945. - Mem. Soc. Fauna Flora fenn. 21: 262-265.
- Frilli, F. 1974: Studi sugli imenotteri Ichneumonidi. V. I "Phygadeuon" della collezione Gravenhorst. - Mem. Soc. Entomol. Ital. 53: 97-216.
- Fulmek, L. 1968: Parasitinsekten der Insektengallen Europas. - Beitr. Entomol. 18: 719-952.
- Gravenhorst, J. L. C. 1829: Ichneumonologia Europaea I, II, III: 827 + 989 + 1097 pp. Vratislaviae.
- Grönblom, T. 1964: Einige aus Schmetterlingszuchten hervorgegangene Schlupfwespen (Hym., Ichneumonoidea). - Ann. Entomol. Fenn. 30: 104-111.
- Hedwig, K. 1956: Ein Beitrag zur Fauna der Ichneumoniden und Brakoniden Finnlands. - Entomol. Mitt. Hamburg no. 8: 235-237.
- Hellén, W. 1915: Beiträge zur Kenntnis der Ichneumoniden Finlands. Subfamilie Pimplinae. - Acta Soc. Fauna Flora Fenn. 40, 6: 1-89.
- Hellén, W. 1923: Veränderungen in der Kenntnis der Insektenfauna Finnlands bis zum Jahr 1921. - Notulae Entomol. 3: 29-32, 60-64.
- Hellén, W. 1926: Verzeichnis der in den Jahren 1921-1925 für die Fauna Finlands neu hinzugekommenen Insektenarten. - Notulae Entomol. 6: 90-96.
- Hellén, W. 1931: Verzeichnis der in den Jahren 1926-1930 für die Fauna Finnlands neu hinzugekommenen Insektenarten. - Notulae Entomol. 11: 51-66.
- Hellén, W. 1936: Verzeichnis der in den Jahren 1931-1935 für die Fauna Finnlands neu hinzugekommenen Insektenarten. - Notulae Entomol. 16: 43-63.
- Hellén, W. 1937: Für die Fauna Finnlands neuer Ichneumoniden (Hym.) II. Cryptinae, Pimplinae. - Notulae Entomol. 17: 5-13.
- Hellén, W. 1939: Zur Ichneumonidenfauna Finnlands (Hym.). - Notulae Entomol. 19: 52-63.
- Hellén, W. 1940: Enumeratio Insectorum Fenniae II Hymenoptera 2. Terebrantia. - Helsinki, 32 pp.
- Hellén, W. 1941a: Zur Ichneumonidenfauna Finnlands (Hym.). II. - Notulae Entomol. 20: 42-53.
- Hellén, W. 1941b: Några parasitsteklar och deras värdjur. - Notulae Entomol. 20: 77.
- Hellén, W. 1941c: Verzeichnis der in den Jahren 1936-1940 für die Fauna Finnlands neu hinzugekommenen Insektenarten. - Notulae Entomol. 21: 44-48, 77-98.
- Hellén, W. 1942: Zur Ichneumonidenfauna Finnlands (Hym.). III. - Notulae Entomol. 22: 76-87.
- Hellén, W. 1944a: Zur Ichneumonidenfauna Finnlands (Hym.). IV. - Notulae Entomol. 24: 1-9.
- Hellén, W. 1944b: *Thaumatotypus paradoxus* Zett. - Notulae Entomol. 24: 43.
- Hellén, W. 1946: Zur Ichneumonidenfauna Finnlands (Hym.). V. - Notulae Entomol. 26: 1-12.
- Hellén, W. 1947: Verzeichnis der in den Jahren 1941-1945 für die Fauna Finnlands neu hinzugekommenen Insektenarten. - Notulae Entomol. 26: 122-142.
- Hellén, W. 1950: Die Ichneumonidentypen F. W. Woldstedts. - Notulae Entomol. 30: 26-31.
- Hellén, W. 1951: Zur Ichneumonidenfauna Finnlands (Hym.) VII. - Notulae Entomol. 31: 92-106.
- Hellén, W. 1952a: Verzeichnis der in den Jahren 1946-1950 für die Fauna Finnlands neu hinzugekommenen Insektenarten. - Notulae

- Entomol. 35: 59-80.
- Hellén, W. 1952b: Två för landet nya parasitsteklar, *Atractodes robustus* Rn. och *Casinarina moesta* Grav. - *Notulae Entomol.* 32: 170.
- Hellén, W. 1953: Hymenoptererefang am Licht. - *Notulae Entomol.* 33: 103-109.
- Hellén, W. 1956: Verzeichnis der in den Jahren 1951-1955 für die Fauna Finnlands neu hinzugekommenen Insektenarten. - *Notulae Entomol.* 36: 33-50.
- Hellén, W. 1957: Zur Ichneumonidenfauna Finnlands (Hym.). IX. - *Notulae Entomol.* 36: 125-141.
- Hellén, W. 1959: Tvenne för landet nya parasitsteklar. - *Notulae Entomol.* 39: 68.
- Hellén, W. 1961: Verzeichnis der in den Jahren 1956-1960 für die Fauna Finnlands neu hinzugekommenen Insektenarten. - *Notulae Entomol.* 41: 105-124.
- Hellén, W. 1966a: Verzeichnis der in den Jahren 1961-1965 für die Fauna Finnlands neu hinzugekommenen Insektenarten. - *Notulae Entomol.* 46: 65-86.
- Hellén, W. 1966b: En för faunan ny parasitstekel, *Cremnias atricapillus* Grav. - *Notulae Entomol.* 46: 140.
- Hellén, W. 1967: Die Ostfennoskandischen Arten der Kollektivgattungen *Phygadeuon* Gravenhorst und *Hemiteles* Gravenhorst (Hymenoptera, Ichneumonidae). - *Notulae Entomol.* 47: 81-116.
- Hellén, W. 1970a: Die *Gelis*-Arten Ostfennoskandiens (Hymenoptera, Ichneumonidae). - *Notulae Entomol.* 50: 81-94.
- Hellén, W. 1970b: *Xestophyes alutaceus* Thoms. - *Notulae Entomol.* 50: 136.
- Hellén, W. 1971: Verzeichnis der in den Jahren 1966-1970 für die Fauna Finnlands neu hinzugekommenen Insektenarten. - *Notulae Entomol.* 51: 73-91.
- Holmgren, A. E. 1886: Några anteckningar om parasitstekelfamiljen *Cryptidae*. - *Entomol. Tidskr.* 7: 17-29.
- Horstmann, K. 1973: Typenrevision der von Strobl in der Gattung *Hemiteles* Gravenhorst s. l. beschriebenen Arten und Formen (Hymenoptera, Ichneumonidae). - *Z. Arbeitsgem. Österr. Entomol.* 25: 52-56.
- Horstmann, K. 1974: Typenrevision der von E. Zilahi-Kiss beschriebenen Hemitelinen mit Bemerkungen zu den Gattungen *Hemiteles* Grav. (s. str.), *Gnotus* Foerst. und *Xiphulcus* Townes (Hymenoptera, Ichneumonidae). - *Ann. Hist.-Nat. Mus. Natn. Hung.* 66: 339-346.
- Horstmann, K. 1976: Wenig bekannte oder neuer europäische Hemitelinen-Gattungen (Hymenoptera, Ichneumonidae, Cryptinae). - *Nachrichtenbl. Bayer. Entomol.* 25: 22-31.
- Horstmann, K. 1978: Revision der Gattungen der *Mastrina* Townes (Hymenoptera, Ichneumonidae, Hemitelinae). - *Zeitschr. Arbeitsgem. Österr. Entomol.* 30: 65-70.
- Horstmann, K. 1979a: Typenrevision der von Gravenhorst beschriebenen oder gedeuteten *Hemiteles*-Arten (Hymenoptera, Ichneumonidae). - *Polskie Pismo Entomol.* 49: 151-166.
- Horstmann, K. 1979b: A revision of the types of the *Hemiteles* spp. described by Thomson (Hymenoptera: Ichneumonidae). - *Entomol. Scand.* 10: 297-302.
- Horstmann, K. 1980a: Typenrevision der von Boyer de Fonscolombe beschriebenen Ichneumoniden-Arten (Hymenoptera). - *Mitt. Münch. Entomol. Ges.* 70: 129-137.
- Horstmann, K. 1980b: Revision der europäischen Arten der Gattung *Aclastus* Foerster (Hymenoptera, Ichneumonidae). - *Polskie Pismo Entomol.* 50: 133-158.
- Horstmann, K. 1982: Typenrevision der von Schmiedeknecht beschriebenen *Hemiteles*-Arten (Hymenoptera, Ichneumonidae). - *Mitt. Münch. Entomol. Ges.* 72: 147-158.
- Horstmann, K. 1982: Revision der von Panzer beschriebenen Ichneumoniden-Arten (Hymenoptera). - *Spixiana* 5: 231-246.
- Horstmann, K. 1984: Additions and corrections to M. G. Fitton's #A catalogue and reclassification of the Ichneumonidae (Hymenoptera) described by C. G. Thomson". - *Entomol. Scand.* 15: 203-207.
- Horstmann, K. 1986a: Vier neue *Phygadeuon*-Arten. - *Nachrichtenbl. Bayer. Entomol.* 35: 33-39.
- Horstmann, K. 1986b: Die westpaläarktischen Arten der Gattung *Gelis* Thunberg, 1827, mit macropteren oder brachypteren Weibchen (Hymenoptera, Ichneumonidae). - *Entomofauna Z. Entomol.* 7: 389-424.
- Horstmann, K. 1988: Revision einiger westpaläarktischer *Phygadeuontini* (Hymenoptera, Ichneumonidae). - *Nachrichtenbl. Bayer.*

- Entomol. 37: 59-64.
- Horstmann, K. 1990a: Die westpaläarktischen Arten einiger Gattungen der Cryptini (Hymenoptera, Ichneumonidae). - Mitt. Münch. Entomol. Ges. 79: 65-89.
- Horstmann, K. 1990b: Typenrevision der von Hellén beschriebenen Cryptinae (Hymenoptera, Ichneumonidae). - Entomol. Fennica 1: 181-187.
- Horstmann, K. 1992: Revision einiger Gattungen und Arten der Phygadeuontini (Hymenoptera, Ichneumonidae). - Mitt. Münch. Entomol. Ges. 81: 229-254.
- Horstmann, K. 1993: Revision der brachypteren Weibchen der westpaläarktischen Cryptinae (Hymenoptera, Ichneumonidae). - Entomofauna 14: 85-148.
- Horstmann, K. 1995: Die europäischen Arten von Arotrephes Townes, 1970 und Pleurogyrus Townes, 1970 (Hymenoptera, Ichneumonidae, Cryptinae). - Entomofauna 16 (12): 261-276.
- Jonaitis, V. 1981: A guide to the insects of the European part of the USSR. Hymenoptera, Ichneumonidae. Subfam. Gelinae (Cryptinae). [In Russian]. - Opređ. Faune SSSR No. 129: 175-274.
- Jussila, R. 1962: Lounais-Hämeen ikneumonideja (Hymenoptera, Ichneumonidae). [Ref: Schlupfwespen (Hymenoptera, Ichneumonidae) von Südwest-Häme.] - Lounais-Hämeen Luonto 13: 56-61.
- Jussila, R. 1965a: The Ichneumonidae of the Kevojoki area in Inari Lapland (Finland). - Rep. Kevo Subarct. Res. Stat. 2: 1-186.
- Jussila, R. 1965b: Lisätietoja Lounais-Hämeen ikneumonideista (Hymenoptera, Ichneumonidae). I. - Luonais-Hämeen Luonto 19: 46-51.
- Jussila, R. 1966: Astomaspis infirmus Grav. ja A. pallidicarpus Thoms. (Hym., Ichneumonidae) tavattu Suomesta. Astomaspis infirmus Grav. und A. pallidicarpus Thoms. neu für Finnland. - Ann. Entomol. Fenn. 32: 108, 110.
- Jussila, R. 1968a: Distribution of Ichneumonidae (Hymenoptera) at different altitude belts in Finnish Lapland. - Ann. Univ. Turku A, II, 40: 80-85.
- Jussila, R. 1968b: Ichneumonological (Hym.) reports from Finland II. - Ann. Entomol. Fenn. 34: 149-155.
- Jussila, R. 1969: Lisätietoja Lounais-Hämeen ikneumonideista (Hymenoptera, Ichneumonidae). IV. - Lounais-Hämeen Luonto 30: 5-8.
- Jussila, R. 1973: Ichneumonidae from Hardangervidda. - Zool. Mus., Univ. Bergen, Fauna Hardangervidda 2: 1-50.
- Jussila, R. 1975: Suomen Hyönteistieteellisen Seuran kesäretkiä. Kesäretki Keski-Suomeen 29.VI.-2.VII.1973 - Ann. Entomol. Fenn. 41: 45-46.
- Jussila, R. 1976: The invertebrate fauna of the Kilpisjärvi area, Finnish Lapland, 19. Hymenoptera Ichneumonidae. - Acta Soc. Fauna Flora fenn. 82, 3: 1-30.
- Jussila, R. 1979: A revision of the genus Atractodes (Hymenoptera, Ichneumonidae) of the western Palaearctic Region. - Acta Entomol. Fenn. 34: 1-44.
- Jussila, R. 1984: Ichneumonidae (Hymenoptera) of Inari Lapland. - Kevo Notes 7: 83-99.
- Jussila, R. 1986: Ichneumonological (Hymenoptera) reports from Finland IV. - Notulae Entomol. 66: 125-130.
- Jussila, R. 1987: Revision of the genus Stilpnus (Hymenoptera, Ichneumonidae) of the western Palaearctic Region. - Ann. Entomol. Fennici 53: 1-16.
- Jussila, R. 1989: Ichneumonological (Hymenoptera) reports from Finland. V. - Notulae Entomol. 69: 75-80.
- Jussila, R. 1994: Additions to the revision of the genus Atractodes (Hymenoptera, Ichneumonidae) of the western Palaearctic Region. II. - Entomol. Fennica 5: 129-134.
- Jussila, R. 1996: Six Cryptinae species (Hymenoptera, Ichneumonidae) new to Finland. - Tiedonanto Suomen Hyönteistieteellisen seuran kokouksessa 20.9.1996.
- Jussila, R. 1997: Lajistoselvitys ja kaksi Suomelle uutta ikneumonidilajia. - Tiedonanto Suomen Hyönteistieteellisen seuran kokouksessa 19.9.1997.
- Jussila, R. 1999: Ichneumonidae (Hymenoptera) new to Finland. V. - Entomol. Fennica 9: 175-178
- Jussila, R. & Käpylä, M, 1975: Observations on Townesia tenuiventris (Hlmgr.) (Hym., Ichneumonidae) and its hosts Chelostoma maxillosum (L.) (Hym., Megachilidae) and Trypoxylon figulus (L.) (Hym., Sphecidae). - Ann. Entomol. Fenn. 41: 81-86.
- Jussila, R. & Nuorteva, P. 1968: The ichneumonid fauna in relation to an outbreak of Oporinia

- autumnata (Bkh.) (Lep., Geometridae) on subarctic birches. - *Ann. Zool. Fenn.* 5: 273-275.
- Kanervo, V. 1963: Kålmalens (*Plutella maculipennis* Curt.) parasitsteklar och deras betydelse (Hym. et Lep.). - *Entomol. Medd.* 32: 49-52.
- Kangas, E. 1940: Havaintoja *Diprion* sertiflerin gradatiosta ja mortaliteetistä. Über die Gradation und Mortalität von *Diprion* sertifler Geoffr. - *Ann. Entomol. Fenn.* 6: 162-163, 165-166.
- Kangas, E. & Leskinen, K. 1943: *Pegohylemyia anthracina* Czerny (Dipt., Muscidae) als Zapfenschädling an der Fichte. - *Ann. Entomol. Fenn.* 9: 195-212.
- Komonen, A. 1997: Kirjoverkkoperhosen (*Euphydryas maturna*) ja punakeltaverkkoperhosen (*Euphydryas aurinia*) loiskiltojen rakenne Suomessa. The parasitoid complexes attacking Finnish populations of two threatened butterfly species, *Euphydryas maturna* and *E. aurinia*. - *Baptia* 22 (3): 105-109.
- Koponen, M. 1988: Kaksi maalle uutta muurukaista (*Ichneumonidae*, *Phygadeuontinae*). - *Notulae Entomol.* 68: 154-155.
- Krogerus, R. 1927: Parasitsteklar från Karelska näsets dynområden. - *Mem. Soc. Fauna Flora Fenn.* 2: 44-48.
- Krogerus, R. 1932: Über die Ökologie und Verbreitung der Arthropoden der Triebsandgebiete an den Küsten Finnlands. - *Acta Zool. Fenn.* 12: 1-308.
- Krogerus, R. 1934: Schlupfwespen von den Mooren SW-Finnlands. - *Mem. Soc. Fauna Flora Fenn.* 10: 336-341.
- Krogerus, R. 1938: Parasitsteklar från torvmarkerna i Kuusamo-området. - *Notulae Entomol.* 18: 105-108.
- Krogerus, R. 1942: Två för landet nya parasitsteklar. - *Notulae Entomol.* 21: 146.
- Krogerus, R. 1960: Ökologische Studien über nordische Moorarthropoden. Artenbestand, ökologische Faktoren, Korrelation der Arten. - *Soc. Sci. Fenn., Comm. Biol.* 21, 3: 1-238.
- Lei, G. 1997: Metapopulation dynamics of host-parasitoid interactions. - *Helsinki*, 108 pp.
- Lei, G. C., Vikberg, V., Nieminen, M. & Kuussaari, M. 1997: The parasitoid complex attacking Finnish populations of the Glanville fritillary *Melitaea cinxia* (Lep.: Nymphalidae), an endangered butterfly. - *J. Nat. Hist.* 31 (4): 635-648.
- Meyer, N. F. 1933: Tables systématiques des Hyménoptères (fam. *Ichneumonidae*) de l'URSS et des pays limitrophes. 2. (In Russian.) - *Opred. Faune SSSR* 15: 1-325.
- Nordman, A. 1940: Tvenne kläckta parasitsteklar. - *Notulae Entomol.* 20: 20-21.
- Nordström, Å. 1938: Några för vårt lands fauna nya parasitsteklar, funna i N. Pärnä. - *Notulae Entomol.* 18: 115.
- Nordström, Å. 1940: Fyra i Finland tidigare icke observerade parasitsteklar. - *Notulae Entomol.* 20: 24.
- Nordström, Å. 1943: Fyra för vårt lands fauna nya parasitsteklar. - *Notulae Entomol.* 22: 167-168.
- Nordström, Å. 1944: Två för landets fauna nya arter: *Microcryptus tarsatus* Bridgm. och *Stylocryptus Aertsii* Hab. - *Notulae Entomol.* 24: 90.
- Nordström, Å. 1948: Några för Finlands fauna nya parasitsteklar. - *Notulae Entomol.* 28: 59.
- Nordström, Å. 1952: Två för landet nya parasitsteklar. - *Notulae Entomol.* 32: 176.
- Nuorteva, P. 1957: Suomen eläinkuvasto. Matelijat, sammakkoeläimet, kalat, selkärangattomat. - *Porvoo*, 688 s.
- Nuorteva, P. 1971: Decline of the parasite population of the geometrid moth *Oporinia autumnata* (Bkh.) during the second year after a calamity on birches. - *Ann. Entomol. Fenn.* 37: 96.
- Nuorteva, P. & Jussila, R. 1967: Seasonal and zonal distribution of *Ichneumonidae* (Hym.) on a subarctic fell during a calamity of the geometrid moth *Oporinia autumnata* (Bkh.) on birches. - *Ann. Entomol. Fenn.* 33: 155-163.
- Nuorteva, P. & Jussila, R. 1968: The *ichneumonid* fauna in relation to an outbreak of *Oporinia autumnata* (Bkh.) (Lep., *Geometridae*) on subarctic birches. - *Ann. Zool. Fenn.* 5: 272-275.
- Nuorteva, P. & Jussila, R. 1969: Incidence of *Ichneumonids* on a subarctic fell after a calamity of the geometrid moth *Oporinia autumnata* (Bkh.) on birches. - *Ann. Entomol. Fenn.* 35: 153-160.
- Nylander, W. 1859: Strödda anteckningar 1. - *Bidrag Kännädöm Finlands Nat. Folk* 3: 245-248.
- Opinion 1757. 1994: *Cryptus* Fabricius, 1804 and *Cryptinae* Kirby, 1837 (Insecta, Hymenoptera): conserved. - *Bull. Zool. Nomencl.* 51: 74-75.
- Pfankuch, K. 1923: Aus der *Ichneumonologie* (Hym.) (9. Fortsetzung.) Klarstellung Graven-

- horstscher Typen. - D. Entomol. Z. 1923: 73-89.
- Pulkkinen, M. 1989: The distribution and ecology of the *Strobilomyia* flies (Diptera, Anthomyiidae) infesting larch seed and cones in Finland. - Ann. Entomol. Fenn. 55: 41-47.
- Pyörnilä, M. 1976: Parasitism in *Aglais urticae* (L.) (Lep., Nymphalidae). III. Parasitism of larval stages by ichneumonids. - Ann. Entomol. Fenn. 42: 156-161.
- Reuter, E. 1900: Über die Weissähigkeit der Wiesengräser in Finland. - Acta Soc. Fauna Flora Fenn. 19, 1: 1-135.
- Roman, A. 1910: Notizen zur Schlupfwespenammlung des schwedischen Reichsmuseums. - Entomol. Tidskr. 31: 109-196.
- Roman, 1939: Nordische Ichneumoniden - und einige andere. - Entomol. Tidskr. 60: 176-205.
- Sawoniewicz, J. 1980: Revision of European species of the genus *Bathythrix* Foerster (Hymenoptera, Ichneumonidae). - Ann. Zool. 35: 319-365.
- Sawoniewicz, J. 1985: Revision of European species of the subtribe *Endaseina* (Hymenoptera, Ichneumonidae), I. - Ann. Zool. 39: 131-145.
- Sawoniewicz, J. 1986: Revision of some type-specimens of European Ichneumonidae (Hymenoptera), 2. - Ann. Zool. 40: 371-379.
- Sawoniewicz, J. 1988: Revision of some type-specimens of European Ichneumonidae (Hymenoptera), 3. - Ann. Zool. 41: 481-490.
- Sawoniewicz, J. 1990: Revision of European species of the subtribe *Endaseina* (Hymenoptera, Ichneumonidae), II. Genus *Amphibulus* Kriechbaumer, 1893. - Ann. Zool. 43: 287-290.
- Sawoniewicz, J. 1993: Untersuchungen zur Systematik der europäischen *Aptesini*-Arten (Hymenoptera, Ichneumonidae). - Entomofauna Z. Entomol. 14: 13-32.
- Sawoniewicz, J. & Luhman, J. C. 1992: Revision of European species of the subtribe *Endaseina*, III Genus: *Endasys* Foerster, 1868 (Hymenoptera, Ichneumonidae). - Entomofauna Z. Entomol. 13: 1-94.
- Schwarz, M. 1988: Die Europäischen Arten der Gattung *Idiolispa* Foerster (Ichneumonidae, Hymenoptera). - Linzer Biol. Beitr. 20: 37-66.
- Schwarz, M. 1990: Revision der westpaläarktischen Arten der Schlupfwespengattungen *Caenocryptus* Thomson 1873 und *Nippocryptus* Uchida 1936 (Ichneumonidae, Hymenoptera). - Linzer Biol. Beitr. 22: 359-380.
- Schwarz, M. 1995: Revision der westpaläarktischen Arten der Gattungen *Gelis* Thunberg mit apteren Weibchen und *Thaumatogelis* Schmiedeknecht (Hymenoptera, Ichneumonidae). Teil 1. - Linzer Biol. Beitr. 27: 5-105.
- Silfverberg, H. 1981: Additions to the Finnish insect fauna during the years 1976-1980. - Notulae Entomol. 61: 45-61.
- Silfverberg, H. 1986: Additions to the Finnish insect fauna during the years 1981-1985. - Notulae Entomol. 66: 131-152.
- Silfverberg, H. 1996: Changes 1991-1995 in the list of Finnish insects. - Entomol. Fennica 7: 39-49.
- Siltala, A. J. & Nielsen, J. C. 1906: Zur Kenntnis der Parasiten der Trichopteren. - Z. Wiss. Insektenbiol. 2 (12): 382-386.
- Sääksjärvi, I. E. 1996: One Cryptinae genus (Hymenoptera, Ichneumonidae) new to Finland. - Tiedonanto Suomen Hyönteistieteellisen seuran kokouksessa 20.9.
- Tahvonen, E. 1933: Tietoja kaaliperhosen kehityksestä ja loisista. - Luonnon Ystävä 37: 211-213.
- Townes, H. 1970 (1969): The genera of Ichneumonidae. Part 2. - Mem. Amer. Entomol. Inst. 12: 1-537.
- Townes, H. 1983: Revision of twenty genera of *Gelini* (Ichneumonidae). - Mem. Am. Entomol. Inst. No. 35: 1-281.
- van Rossem, G. 1966: A study of the genus *Trychosis* Foerster in Europe (Hymenoptera, Ichneumonidae, Cryptinae). - Zool. Verh. 79: 1-40.
- van Rossem, G. 1969: A study of the genus *Meringopus* Foerster in Europe and of some related species from Asia (Hymenoptera, Ichneumonidae, Cryptinae). - Tijdschr. Entomol. 112: 165-190.
- van Rossem, G. 1989: The genus *Cryptus* Fabricius, 1804 of the Canary Islands (Hymenoptera, Ichneumonidae). - Tijdschr. Entomol. 132: 251-258.
- Viitasaari, M. 1976: Notes on some Ichneumonidae (Hymenoptera) in Eastern Fennoscandia. - Ann. Entomol. Fenn. 42: 87-91.
- Vikberg, V. 1983: *Ichneumonidi-löytöjä Etelä-Suomesta* (Hymenoptera, Ichneumonidae). - Notulae Entomol. 63: 49-51.
- Vikberg, V. & Viitasaari, M. 1991: *Trichiosoma*

nanae sp. n., a monophag on *Betula nana* from Finland (Hymenoptera, Cimbicidae). - Entomol. Fennica 2: 67-77.

Woldstedt, F. W. 1874: Materialier till en Ichneumonologia Fennica. -Bidr. Känn. Finlands Nat. Folk 21: 61-92.

Zetterstedt, J. W. 1838: Insecta Lapponica descripta: Sectio secunda. Hymenoptera. - Lipsiae, 326-476.