

SAHLBERGIA

VUOSIKERTA 21 (2015), SUPPLEMENT 1

Kovakuoriaisten maakuntaluettelo 2015





Kovakuoriaisten maakuntaluettelo 2015 [Provincial List of Finnish Coleoptera 2015]. — *Sahlbergia* 21 Supplement 1: 1–164.

Kirjoittajat [authors]

Pertti Rassi (pertti.rassi@pp.inet.fi) Seppo Karjalainen (seppo.karjalainen@metsa.fi),
Tom Clayhills (tom.clayhills@parnet.fi), Eero Helve (eero.helve@kolumbus.fi),
Esko Hyvärinen (Esko.O.Hyvarinen@ymparisto.fi), Erkki Laurinharju (laurinharju@gmail.com),
Sampsa Malmberg (sampsa.malmberg@hotmail.com), Ilpo Mannerkoski (ilpo.mannerkoski@ymparisto.fi),
Petri Martikainen (petri.martikainen@uef.fi), Jaakko Mattila (jaakko.x.mattila@helsinki.fi),
Jyrki Muona (jyrki.muona@helsinki.fi), Mikko Pentinsaari (mikko.pentinsaari@oulu.fi),
Ilpo Rutanen (ilpo.rutanen@pp.inet.fi), Juha Salokannel (juha.salokannel@gmail.com),
Juha Siitonen (juha.siitonen@luke.fi), Hans Silfverberg (hans.silfverberg@helsinki.fi).

SAHLBERGIA (ISSN 2342-7582)

Julkaisija: Luonnontieteellinen keskusmuseo LUOMUS

Päätoimittaja: Jere Kahanpää

Taittaja: Heidi Viljanen

Email: sahlbergia-lehti@helsinki.fi



Kansikuva:

Ottaja: Jyrki Muona

Päivämäärä 17.6.2009

Paikka: Suomi, Uusimaa, Vantaa [Finland, Uusimaa, Vantaa]

Aihe: Halavasepikkäkoiraat (*Hylochares cruentatus*) taistelemassa parhaasta asemasta naaraan kuoriutumisaukon ympärillä suuren halavan rungolla (*Salix pentandra*). [Males of *Hylochares cruentatus* fighting for best position around the exit hole of an emerging female on the trunk of an old Jolster (*Salix pentandra*).



Kovakuoriaisten maakuntaluettelo 2015

Pertti Rassi, Seppo Karjalainen, Tom Clayhills, Eero Helve, Esko Hyvärinen, Erkki Laurinharju, Sampsa Malmberg, Ilpo Mannerkoski, Petri Martikainen, Jaakko Mattila, Jyrki Muona, Mikko Pentinsaari, Ilpo Rutanen, Juha Salokannel, Juha Siitonen & Hans Silfverberg

Rassi, P., Karjalainen, S., Clayhills, T., Helve, E., Hyvärinen, E., Laurinharju, E., Malmberg, S., Mannerkoski, I., Martikainen, P., Mattila, J., Muona, J., Pentinsaari, M., Rutanen, I., Salokannel, J., Siitonen, J. & Silfverberg, H. 2015: Kovakuoriaisten maakuntaluettelo 2015 [Provincial List of Finnish Coleoptera 2015]. — Sahlbergia 21 Supplement 1: 1–164..

Johdanto

Suomen kovakuoriaisten maakuntaluettelo ei ole päivitetty uusimman Pohjoismaisen luettelon ilmestymisen jälkeen (Lindroth, 1960). Lajistossamme on tapahtunut paljon muutoksia niin nimistön kuin esiintymienkin suhteen. Tämän vuoksi kovakuoriaistyöryhmässä katsottiin tarpeelliseksi kokonaan uuden luettelon teko. Sen kokonaisuus on ollut haasteellista. Tavoitteena on ollut saada aikaan luotettava ja uusinta tietämystä vastaava maakuntalistaus. Suuri määrä vanhojen kokoelmien näytteitä on tarkistettu ja kaikkien hyvin harvinaisten lajien löydöt on pyritty todentamaan. Kovakuoriaistyöryhmä on viimeksi kuluneen vuosikymmenen aikana keskittynyt arvioimaan kovakuoriaisten uhanalaisuutta ja osana tätä laatinut uuden frekvenssipisteluokittelun. Työryhmä on samalla koonnut digitaalisen havaintotietokannan ja julkaissut lajiston levinneisyyskartaston Internetissä (The Finnish Expert Group on Coleoptera, 2010). Merkittävien havaintojen tallentamiseksi on luotu kovakuoriaistyöryhmän yhteydessä toimiva tarkastustyöryhmä. Nämä projektit ovat tukeneet toisiaan ja tuottaneet paljon uutta tietoa Suomen lajiston levinneisyydestä ja nykytilasta.

Tässä maakuntaluettelossa esitetään perinteisten maakuntahavaintojen lisäksi myös lajien voimassa olevat uhanalaisuusluokat sekä uudet frekvenssipistearvot. Maakuntahavainnot on esitetty erikseen kahdelta ajanjaksolta, rajapyykkinä on käytetty vuoden 1960 alkua. Vaikka kummankin ajanjakson havaintotiedot kaipaavat edelleen täydennyksiä, antaa käytetty jaottelu hyvän mahdollisuuden tarkastella lajien levinneisyydessä tapahtuneita muutoksia, jotka ovat monessa tapauksessa erittäin selviä ja mielenkiintoisia.

Toivomme, että tämä maakuntaluettelo kuluu käyttäjien käsissä ja innostaa harrastajia tekemään uusia maakuntalöytöjä. Jatkossa maakuntaluettelo pidetään yllä kova-

kuoriaistyöryhmän havaintotietokannan yhteydessä, joten uudet maakuntahavainnot tulee ilmoittaa joko suoraan kovakuoriaistyöryhmälle tai tallentaa Internetissä julkiseen hyönteistietokantaan. Olisi tärkeää, että uusiin maakuntalöytöihin liittyvät yksilöt tallennettaisiin joko omaan tai julkiseen kokoelmaan, jotta niiden määritys voidaan tarpeen vaatiessa tarkastaa myöhemmin.

Lämmin kiitos kaikille, jotka ovat antaneet havaintojaan käyttöömme tai muuten auttaneet tämän luettelon valmistelussa. Kiitämme myös ympäristöministeriötä taloudellisesta tuesta.

Käytetty nimistö

Nimistö ja systematiikka noudattavat 2000-luvulla ilmestynyttä kahdeksanosaista palearktisten kovakuoriaisten luettelo, jonka Suomen oloihin on soveltanut Silfverberg (2010; 2013; 2014a; 2014b). Lajiluettelossa on huomioitu kaikki kovakuoriaisten tarkastustyöryhmän 6.5.2015 mennessä käsittelemät tapaukset (mm. Clayhills, 2014; Pentinsaari, 2014; Salokannel, 2015). Sukuryhmän Miarini osalta tarkastustyöryhmä päätyi seuraamaan palearktisen luettelon taksonomiaa (Caldara, 2013).

Uhanalaisuusluokat

Esitetyt uhanalaisuusluokat ovat vuoden 2010 IUCN kriteerein arvioidun luokituksen mukaiset (Hyvärinen ym., 2010). Luettelossa esitetään myös punaisen listan ulkopuolelle jääneille lajeille uhanalaisuusarvioinnin yhteydessä annetut luokat (LC, NE, NA), joita ei ole aiemmin julkaistu. Uhanalaisuusarvioinnin jälkeen Suomesta löytyneille lajeille on annettu luokaksi NA, mikäli niiden on arvioitu levinneen maahamme vuoden 2000 jälkeen. Uhan-

alaisuusluokka jätettiin antamatta sellaisille Suomesta	10	201–400
äskettäin löytyneille lajeille, joiden tiedetään tai arvellaan	6	401–800
esiintyneen täällä vanhastaan. Niiden luokat tullaan mää-	4	801–1600
rittelemään seuraavan uhanalaisuusarvioinnin yhteydessä.	2	1601–3200
	1	3201–

Uhanalaisuusluokkien lyhenteet:

RE	hävinneet
CR	äärimmäisen uhanalaiset
EN	erittäin uhanalaiset
VU	vaarantuneet
NT	silmälläpidettävät
DD	puutteellisesti tunnetut
LC	elinvoimaiset
NE	arvioimatta jätetyt
NA	arviointiin soveltumattomat

Frekvenssipisteet

Frekvenssipisteissä on käytetty samaa arviointitapaa kuin edellisessä frekvenssipisteluettelossa (Rassi, 1993). Tarkastelujakso on 1.1.1980–1.1.2010. Tarkastelujakson jälkeen tehdyt havainnot on kuitenkin otettu huomioon harvinaisimpien ja äskettäin levinneiden tai runsastuneiden lajien pisteitä annettaessa. Arviointityössä tärkein tietolähde on ollut kovakuoriaistyöryhmän kokoama havaintotietokanta, jossa on tällä hetkellä noin 700.000 kovakuoriaishavaintoa. Uhanalaisten lajien kohdalla on käytetty myös ympäristöhallinnon HERTTA Eliölajit -tietokannan tietoja. Kunkin lajin arviointia tehtäessä on otettu huomioon myös kaikki muut työryhmän tiedossa olleet havainnot.

Frekvenssipisteet pyrkivät kuvaamaan lajien yleisyyttä Suomessa ja ne perustuvat kunkin lajin tunnettujen tai arvioidujen esiintymispaikkojen lukumääriin. Käytännössä tarkastelu tehtiin kaavamaisesti ”kymppiruutujen” eli 10 km x 10 km yhtenäiskoordinaattiruutujen perusteella, joita on Suomen maa-alueilla lähes 3900. Kaikki yhden kymppiruudun sisällä sijainneet havaintopisteet katsottiin yhdeksi esiintymispaikaksi ja toisaalta kaikki kymppiruudut laskettiin erillisiksi esiintymispaikoiksi. Frekvenssipisteet määräytyivät esiintymispaikkojen eli kymppiruutujen lukumäärän perusteella seuraavasti:

Frekvenssipisteet	Kymppiruutujen lukumäärät
100	0–3
80	4–6
60	7–12
40	13–25
30	26–50
20	51–100
15	101–200

Alle 30 frekvenssipisteen lajien pisteet annettiin arvioimalla lajin todellinen levinneisyysalue kartalta tietokannan havaintopisteisiin perustuen. Pisteitä annettaessa pyrittiin ottamaan huomioon myös lajin elinympäristövaatimukset, eli kuinka monesta ruudusta lajin levinneisyysalueella löytyy lajille sopivaa elinympäristöä. Esimerkiksi tavallista talousmetsää löytyy lähes jokaisesta kymppiruudusta kun taas avoimia rantahietikkoja vain rajallisesta määrästä ruutuja. Saadakseen frekvenssipistearvon 1 lajin täytyy olla levinnyt lähes koko Suomeen.

Frekvenssipisteet 40–100 annettiin laskemalla tarkastelujaksolla kertyneiden todellisten esiintymispaikkojen (kymppiruutujen) lukumäärät. Kaavamaisesti laskettua pistearvoa laskettiin harkinnan mukaan sellaisten lajien kohdalla, joille oli kertynyt tarkastelujakson aikana silmiinpistävä vähän havaintopisteitä suhteessa tunnettuun levinneisyyteen alhaisesta keräilyaktiivisuudesta johtuen. Frekvenssipistearvoa 30 annettaessa käytettiin molempia edellä kuvattuja menetelmiä.

Hävinneeksi ”tähtilajiksi” on katsottu ainoastaan lajit, joita ei ole löydetty Suomesta vuoden 1979 jälkeen. Tämä on merkitty frekvenssipistearvolla 100*. Tilapäisluonteiset tuontilajit (importit) on merkitty frekvenssipistesarakkeeseen i-kirjaimella ilman frekvenssipistearvoa. Ihmisen mukana kulkeutuneille, pysyviä lisääntyviä kantoja muodostaneille lajeille on annettu frekvenssipisteet normaaliin tapaan.


Maakuntahavainnot

Maakuntahavainnot on jaoteltu kahteen ajanjaksoon: vuoden 1959 loppuun mennessä tehtyihin ja vuoden 1960 alusta tehtyihin havaintoihin. Käytettyjä suomenkielisiä maakuntalyhenteitä vastaavat maakunnat ja niiden latinisoidut lyhenteet käyvät ilmi kuvasta 1. Pohjoisista maakunnista on käytetty kirjallisuudessa myös seuraavia lyhenteitä: OP = ObS, PeP = ObN, KiL = LkW ja SoL = LkE. Vuoden 1960 maakuntaluettelossa KiL ja SoL muodostivat yhdessä maakunnan KemL = Lkem.

Tärkeimmät havaintolähteet ovat olleet museo- ja yksityiskokoelmat sekä kovakuoriaistyöryhmän havaintotietokanta. Tietoja on saatu myös suoraan monilta hyön-

teisharrastajilta sekä julkisesta Hyönteistietokannasta (Luomus 2015). Museokokoelmista vain Luonnontieteellisen keskusmuseon kokoelmat on käyty suhteellisen kattavasti läpi, eikä sielläkään ole tarkastettu kaikkia määriä. Muiden museoiden kokoelmat on käyty läpi vain osittain. Museokokoelmista on siis löydettävissä vielä täydennyksiä luetteloon. Kaikista havainnoista on kirjattu ylös tietolähde (yleensä kokoelma josta tieto on peräisin). Valtaosa maakuntahavainnoista perustuu kokoelmayksilöihin, mutta mukana on jonkin verran myös havaintotietoja, joihin liittyviä yksilöitä ei ole enää olemassa (mm. erilaiset tutkimusaineistot ja suoraan harrastajilta saadut tiedot). Mukaan on kelpuutettu myös muutamien kirjojen (Lindroth, 1985 ja 1986; Holmen, 1987; Nilsson & Holmen, 1995) luotettaviksi arvioitujen maakuntataulukkojen tietoja vaikka niitä koskevia yksilöitä ei ole enää löydetty tietoja koottaessa.

Kustakin maakunnasta tehdyt havainnot on merkitty kyseisen maakunnan sarakkeeseen maakuntalyhenteellä. Myös vakiintuneet tuontilajit (ns. importit) ovat saaneet maakuntamerkin normaaliin tapaan. Vakiintumattomat tuontilajit, joille ei myöskään ole annettu frekvenssipisteitä, on merkitty maakuntasarakkeisiin i-merkinnällä. Jos laji on katsottu jossakin maakunnassa importiksi, vaikka se olisi vakiintunut laji jossain muissa maakunnissa, on maakuntasarakkeessa käytetty merkintää ”i” (esim. laji *Phymatodes testaceus* maakunnassa EH).



Kuva 1. Suomen luonnontieteelliset maakunnat.
Fig. 1. The biogeographical provinces of Finland

Provincial list of Finnish Coleoptera 2015

Introduction

The Finnish records of the latest distributional list of Fenoscandian Coleoptera have not been updated for Finland since its publication (Lindroth, 1960). Numerous changes, both in distribution and taxonomy have taken place during the past 55 years. In order to accommodate for these, the Finnish Expert Group for Beetles decided to create an entirely new provincial catalogue. This project turned out to be slow and demanding. Our aim was to produce as reliable a list as possible.

The Expert Group's main effort during the past decade has been directed towards estimating how threatened the Finnish beetles are. In order to achieve this, the Expert Group has produced a frequency classification, created a database

of beetle observations and published distribution maps of all Finnish beetles (The Finnish Expert Group on Coleoptera, 2010).

In addition to the provincial records, the current Red List categories and the new frequency estimates are given for all the species. The provincial records made before and after January 1st 1960 are given separately. This division provides a possibility to observe changes in distributions.

We hope that this catalogue will inspire entomologists to record beetles from less well-studied provinces. All new provincial records should either be reported to the Finnish Expert Group for Beetles, or be listed in a public database. Whenever possible, the specimen on which the record is based should be preserved in a private or public collection.

We would like to thank all those who have made their records available or otherwise helped us during the preparation of this catalogue. We also thank the Ministry of the Environment for financial support.

Nomenclature used

The taxonomy and systematics follow the latest Palearctic beetle catalogue, with modifications made by Silfverberg (2010; 2013; 2014a; 2014b). All records and taxonomic changes assessed by the Control Group of the Finnish Expert Group for Beetles were included (e.g. Clayhills 2014, Pentinsaari 2014, Salokannel 2015). The cut-off date was May 6th, 2015. The taxonomy of the tribe Miarini follows Caldara (2013).

The red list categories

The presented IUCN red list categories are in accordance with the 2010 Red List of Finnish Species (Hyvärinen et al., 2010). In addition we provide the categories for the non-threatened species as well (LC, NE, NA). These have not been published previously. Species reported from Finland after the latest assessment of threatened species were classified as NA, if they are supposed to have entered Finland after 2000. Recently reported species were left unclassified, if they were known or believed to be native but previously overlooked. Such species will be classified in the next assessment of threatened species.

Abbreviations for red list categories:

RE	Regionally Extinct
CR	Critically Endangered
EN	Endangered
VU	Vulnerable
NT	Near Threatened
DD	Data Deficient
LC	Least Concern
NE	Not Evaluated
NA	Not Applicable

Frequency scores

The frequency estimation method was the same as in the previous frequency score list of Finnish beetles (Rassi, 1993). The study period was 1.1.1980–1.1.2010. Later observations were considered for the rarest species, and for those that have recently entered Finland, or become commoner. The most important source was the database col-

lected by the Finnish Expert Group for Beetles, including some 700.000 observations. For threatened species the HERTTA database, maintained by the Finnish Environment Institute, was also available.

The frequency scores aim to present how common the species are in Finland. They are based on the known or estimated amount of localities where each species occurs. In principle the estimates are based on the around 3900 10 x 10 km standard coordinate squares, which cover the land area of Finland. All observations within one and the same square are considered as one occurrence. The frequency scores are based on the number of such occurrences, i.e. 10 x 10 km squares as follows:

Frequency score	Number of squares
100	0–3
80	4–6
60	7–12
40	13–25
30	26–50
20	51–100
15	101–200
10	201–400
6	401–800
4	801–1600
2	1601–3200
1	3201–

For common species (less than 30 frequency score) the score was based on the assumed actual distribution on a map, as indicated by the database records. When giving the scores, the habitat demands of the species were considered as well. There is, for instance, ordinary managed forest in almost every Finnish square, while open sandy beaches can be found in only a very limited number of squares. For a species to receive the frequency score 1 it must occur over almost all of Finland.

The frequency scores from 40 up were assigned based on the actual number of occurrences (squares) during the study period. If there was reason to believe that the low number of finds could be due to low collecting effort, the frequency score could be adjusted down.

Both these methods were considered for species given the frequency score 30. Species not found in Finland after 1979 were classified as having disappeared. For them the frequency classification 100* was used. Occasional imports did not receive any frequency scores. Instead they were marked in the column with the letter “i”. If species originally imported have established breeding populations,

they received the usual frequency scores for the corresponding provinces.

Province records

Province data was divided into two periods: before the year 1960, and from 1.1.1960 onwards. All observations have been assembled anew. The biogeographical provinces and the abbreviations used are shown in Fig. 1. In addition, the following abbreviations have been used in entomological literature: OP = ObS, PeP = ObN, KiL = LkW and SoL = LkE. In the 1960 provincial list provinces KiL and SoL were not separated and formed together province KemL = Lkem.

Most data came from public and private collections and from the records database, upheld by the Expert Group for Beetles. Some information also came from amateur entomologists and from the public through the Finnish Insect Database (Luomus 2015). As for museum collections, only the Finnish Museum of Natural History was consulted extensively. Other museum collections were studied only partly. The source for every observation was recorded (generally the collection where the specimen is situated). As a rule every provincial record is based on a collection specimen, but some data refer to specimens no longer available (e.g. various research materials, and information given by amateur collectors). We did include information from literature (Lindroth, 1985 and 1986; Holmen, 1987; Nilsson & Holmen 1995), when considered reliable, even when the specimens in question could no longer be found.

Records from each province were entered into the appropriate column using the province abbreviation. Established originally imported species were treated as native ones. The frequency of occasional imports was not estimated and their presence is indicated with the letter “i”. If a species was considered as established in Finland, but an import in some province, it is so marked for that province (e.g. *Phymatodes testaceus* in the province EH).

Kirjallisuus/References

- Caldara, R. 2013. Subfamily Curculioninae. Teoksessa: Löbl, I. & Smetana, A. (toim.). Catalogue of Palaearctic Coleoptera. Volume 8. Curculionoidea II. Brill, Leiden. 700 s.
- Clayhills, T. 2014. Coleoptera species new to Finland (2) (Coleoptera). Koleopterologische Rundschau 84: 353–357.
- Holmen, M. 1987. The aquatic Adephaga (Coleoptera) of Fennoscandia and Denmark. I. Gyrinidae, Haliplidae, Hygrobiidae and Noteridae. Fauna Entomologica Scandinavica 20. Brill, Leiden. 168 s.
- Hyvärinen, E., Mannerkoski, I., Clayhills, T., Helve, E., Karjalainen, S., Laurinharju, E., Martikainen, P., Mattila, J., Muona, J., Pentinsaari, M., Rassi, P., Rutanen, I., Salokannel, J., Siitonen, J. & Silfverberg, H. 2010. Kovakuoriaiset. Teoksessa: Rassi, P., Hyvärinen, E., Juslén, A. & Mannerkoski, I. (toim.). Suomen lajien uhanalaisuus – Punainen kirja 2010. Ympäristöministeriö & Suomen ympäristökeskus, Helsinki. s. 545–582.
- Lindroth, C.H. (ed.) 1960. Catalogus Coleopterorum Fennoscandiae et Daniae. Entomologiska Sällskapet i Lund, 1–476.
- Lindroth, C.H. 1985. The Carabidae (Coleoptera) of Fennoscandia and Denmark. 1. Fauna Entomologica Scandinavica 15(1). Brill, Leiden. 225 s.
- Lindroth, C.H. 1986. The Carabidae (Coleoptera) of Fennoscandia and Denmark. 2. Fauna Entomologica Scandinavica 15(2). Brill, Leiden. 497 s.
- Luomus 2015. Hyönteistietokanta. <http://hyonteiset.luomus.fi/insects/main/EntDatabase.html>
- Nilsson, A.N. & Holmen, M. 1995. The aquatic Adephaga (Coleoptera) of Fennoscandia and Denmark. II. Dytiscidae. Fauna Entomologica Scandinavica 32. Brill, Leiden. 192 s.
- Pentinsaari, M. 2014. Kuusi Suomelle uutta kovakuoriaislajia. Sahlbergia 20: 19–21.
- Rassi, P. (toim.) 1993. Suomen kovakuoriaisten (Coleoptera) frekvenssipisteet 1.1.1960–1.1.1990. Maailman Luonnon Säätiön WWF Suomen Rahaston Raportteja 6. Helsinki.
- Salokannel, J. 2015. Kaksi Suomelle uutta kovakuoriaislajia Parikkalasta. Diamina 2015: 2–3.
- Silfverberg, H. 2010. Enumeratio renovata Coleopterorum Fennoscandiae, Daniae et Baltiae. Sahlbergia 16: 1–144.
- Silfverberg, H. 2013. What ever happened to *Apion* (Coleoptera, Curculionoidea). Sahlbergia 19: 44–49.
- Silfverberg, H. 2014a. Renaming weevils (Coleoptera, Curculionoidea). Sahlbergia 20: 35–38.
- Silfverberg, H. 2014b. Changes and additions to Enumeratio renovata Coleopterorum Fennoscandiae, Daniae et Baltiae. Sahlbergia 20: 39–53.
- The Finnish Expert Group on Coleoptera 2010. Suomen kovakuoriaisatlas / Atlas över Finlands skalbaggar / Atlas of the Beetles of Finland. <http://koivu.luomus.fi/elaintiede/kovakuoriaiset/cAtlas1.htm>.

versicolor (Schaller, 1783)	LC	10	<1960	A	V	U	EK	St	EH	ES	LK	EP	PH	PS	PK	KP	Kn	OP	PeP	Ks	KiL	EnL	InL	
			≥1960	A	V	U	EK	St	EH	ES				PH	PS	PK	KP	Kn	OP	PeP		KiL		
quinquelineatus (Zett., 1828)	LC	10	<1960			U			EH	ES	LK			PH	PS	PK		Kn	OP	PeP	Ks	KiL	EnL	InL
			≥1960					St	EH	ES	LK	EP	PH	PS	PK	KP	Kn	OP	PeP		Ks	KiL		EnL
polonicus (Aubé, 1842)	NA	100	<1960																					
			≥1960				EK																	
impressopunctatus (Schaller, 1783)	LC	6	<1960	A	V	U	EK	St	EH	ES	LK	EP	PH	PS	PK	KP	Kn	OP	PeP	Ks	KiL	EnL	InL	
			≥1960	A	V	U	EK	St	EH		LK	EP	PH		PK	KP		OP	PeP		KiL	SoL		
parallelogrammus (Ahrens, 1812)	NT	80	<1960																					
			≥1960		V	U			EH															
novemlineatus (Stephens, 1829)	LC	15	<1960			U			EH	ES	LK				PK		Kn	OP	PeP	Ks	KiL	SoL	EnL	InL
			≥1960		V				EH	ES		EP	PH		PK	KP	Kn	OP	PeP		Ks	KiL	SoL	
marklini (Gyllenhal, 1813)	LC	30	<1960	A		U	EK		EH												KiL	EnL		
			≥1960	V	U				EH											PeP		KiL	SoL	EnL
nigrolineatus (Steven, 1808)	NA	100*	<1960																					
			≥1960				EK																	
Hydroporus																								
nigrita (Fabricius, 1792)	LC	2	<1960	A	V	U		St	EH	ES	LK	EP	PH	PS	PK	KP	Kn	OP	PeP	Ks	KiL	EnL	InL	
			≥1960	A	V	U	EK	St	EH	ES		EP	PH	PS	PK	KP	Kn	OP	PeP	Ks	KiL	SoL	EnL	InL
brevis F.Sahlberg, 1834	LC	40	<1960		V	U		St	EH	ES			PH	PS	PK	KP		OP	PeP	Ks	KiL	EnL	InL	
			≥1960		U			EH							Kn	OP	PeP		Ks	KiL	SoL	EnL	InL	
acutangulus Thomson, 1856	LC	30	<1960		V								PS			Kn	OP	PeP		KiL	SoL	EnL	InL	
			≥1960		U			EH		EP		PK	KP		OP	PeP		Ks	KiL		EnL	InL		
discretus Fairmaire, 1859	LC	40	<1960	A	V	U		St	EH	ES	LK													
			≥1960	A	V	U		St	EH										OP					
pubescens (Gyllenhal, 1808)	NT	30	<1960	A	V	U	EK	St		ES		EP	PH	PS	PK	KP								
			≥1960	A	V	U			EH					PK										
fuscipennis Schaum, 1868	LC	20	<1960	A	V	U	EK	St	EH	ES	LK		PH	PS	PK	KP		OP	PeP	Ks	KiL	EnL	InL	
			≥1960	A		U	EK	St	EH		LK	EP	PH	PS		KP	Kn	OP		Ks	KiL		EnL	InL
planus (Fabricius, 1782)	LC	10	<1960	A	V	U	EK	St	EH	ES	LK	EP			PK	KP								
			≥1960	A	V	U	EK	St	EH	ES		EP	PH	PS		KP	Kn	OP	PeP					
obscurus Sturm, 1835	LC	2	<1960	A	V	U	EK	St	EH	ES	LK	EP	PH	PS	PK	KP	Kn	OP	PeP	Ks	KiL	EnL	InL	
			≥1960	A	V	U	EK	St	EH	ES		EP	PH	PS	PK	KP	Kn	OP	PeP		Ks	KiL	SoL	EnL
elongatulus Sturm, 1835	NA	100*	<1960																					
			≥1960			U																		
semenowi Jakowlew, 1897	DD	40	<1960		V					ES			PH		PK		Kn						EnL	InL
			≥1960					St											OP					InL
geniculatus Thomson, 1854	LC	10	<1960										EP	PH	PS	PK	KP	Kn	OP	PeP	Ks	KiL	EnL	InL
			≥1960						EH					PK	KP	Kn	OP	PeP		Ks	KiL	SoL	EnL	InL
nigellus Mannerheim, 1853	LC	30	<1960	A	V	U																		
			≥1960	A	V	U	EK	St																
submuticus Thomson, 1874	VU	60	<1960											PS	PK		Kn	OP	PeP	Ks	KiL	EnL	InL	
			≥1960														Kn				KiL	SoL		InL
notabilis LeConte, 1850	LC	20	<1960		V						LK		PH	PS	PK	KP	Kn	OP	PeP	Ks	KiL	EnL	InL	
			≥1960																OP		Ks		SoL	EnL
erythrocephalus (Linnaeus, 1758)	LC	1	<1960	A	V	U	EK	St	EH	ES	LK	EP	PH	PS	PK	KP	Kn	OP	PeP	Ks	KiL	EnL	InL	
			≥1960	A	V	U	EK	St	EH	ES	LK	EP	PH	PS	PK	KP	Kn	OP	PeP	Ks	KiL	SoL	EnL	InL
rufifrons (Müller, 1776)	LC	10	<1960	A	V	U	EK	St	EH	ES		EP	PH	PS	PK	KP	Kn	OP	PeP	Ks	KiL	EnL	InL	
			≥1960	A	V	U		St	EH		LK	EP	PH	PS	PK	KP	Kn	OP	PeP		KiL	SoL	EnL	InL
scalesianus Stephens, 1828	LC	20	<1960	A		U			EH					PS		Kn								
			≥1960	A	V	U	EK		EH	ES		EP	PS	PK				OP			KiL			
angustatus Sturm, 1835	LC	6	<1960	A	V	U	EK	St	EH	ES	LK	EP	PH	PS	PK	KP	Kn	OP	PeP					
			≥1960	A	V	U	EK	St	EH	ES		EP	PH	PS	PK	KP	Kn	OP	PeP					
lapponum (Gyllenhal, 1808)	LC	30	<1960																		KiL	SoL	EnL	InL
			≥1960																			KiL	SoL	EnL
puberulus LeConte, 1850	LC	30	<1960										PH	PS		KP				Ks			InL	
			≥1960					St	EH						PK		Kn	OP			KiL			

glabriusculus Aubé, 1838	NT	30	<1960	A	V	U	EK	St	EH	ES	LK	EP	PH			KP		OP	PeP	Ks	KiL	SoL	EnL	InL
			≥1960	A	V	U	EK	St	EH	ES							PK	KP					KiL	
umbrosus (Gyllenhal, 1808)	LC	1	<1960	A	V	U	EK	St	EH	ES	LK	EP	PH	PS	PK	KP	Kn	OP	PeP	Ks	KiL		EnL	InL
			≥1960	A	V	U	EK	St	EH	ES	LK	EP	PH	PS	PK	KP	Kn	OP	PeP	Ks	KiL	SoL	EnL	InL
morio Aubé, 1838	LC	2	<1960	A	V	U	EK	St	EH	ES		EP	PH	PS	PK	KP	Kn	OP	PeP	Ks	KiL	SoL	EnL	InL
			≥1960	A	V	U	EK	St	EH	ES		EP	PH	PS	PK	KP	Kn	OP	PeP	Ks	KiL	SoL	EnL	InL
tristis (Paykull, 1798)	LC	1	<1960	A	V	U	EK	St	EH	ES	LK	EP	PH	PS	PK	KP	Kn	OP	PeP	Ks	KiL	SoL	EnL	InL
			≥1960	A	V	U	EK	St	EH	ES	LK	EP	PH	PS	PK	KP	Kn	OP	PeP	Ks	KiL	SoL	EnL	InL
gyllenhalii Schiødte, 1841	NT	80	<1960	A	V	U	EK																	
			≥1960	A	V	U																		
notatus Sturm, 1835	NT	100	<1960	A																	KiL	SoL		InL
			≥1960	A																	Ks			
incognitus Sharp, 1869	LC	4	<1960	A	V	U			EH			EP	PH	PS	PK	KP		OP	PeP	Ks				
			≥1960	A	V	U	EK	St	EH	ES		EP	PH	PS	PK	KP	Kn	OP	PeP	Ks	KiL	SoL		InL
striola (Gyllenhal, 1826)	LC	2	<1960	A	V	U	EK	St	EH	ES	LK	EP	PH	PS	PK	KP	Kn	OP	PeP	Ks	KiL	SoL	EnL	InL
			≥1960	A	V	U	EK	St	EH	ES	LK	EP	PH	PS	PK	KP	Kn	OP	PeP	Ks	KiL	SoL	EnL	InL
palustris (Linnaeus, 1761)	LC	1	<1960	A	V	U	EK	St	EH	ES		EP	PH	PS	PK	KP	Kn	OP	PeP	Ks	KiL	SoL	EnL	InL
			≥1960	A	V	U	EK	St	EH	ES	LK	EP	PH	PS	PK	KP	Kn	OP	PeP	Ks	KiL	SoL	EnL	InL
neglectus Schaum, 1845	LC	15	<1960		V	U			EH	ES	LK	EP	PH	PS	PK	KP	Kn	OP	PeP		KiL			InL
			≥1960	A	V	U	EK		EH	ES			PH	PS	PK	KP	Kn	OP			KiL		EnL	InL
melanarius Sturm, 1835	LC	2	<1960	A	V	U	EK	St	EH	ES		EP	PH	PS	PK	KP	Kn	OP	PeP		KiL	SoL	EnL	InL
			≥1960	A	V	U	EK	St	EH	ES		EP	PH	PS	PK	KP	Kn		PeP	Ks	KiL	SoL	EnL	InL
longicornis Sharp, 1871	LC	20	<1960		V	U	EK	St	EH	ES			PH	PS	PK	KP		OP	PeP	Ks	KiL			InL
			≥1960	A	U			EH					PS	PK		Kn		PeP	Ks	KiL		EnL	InL	
memnonius Nicolai, 1822	LC	15	<1960	A	V	U			EH	ES	LK		PH	PS	PK				PeP		KiL		EnL	InL
			≥1960	A	V	U	EK	St	EH	ES			PH		PK		Kn		PeP	Ks	KiL		EnL	InL
sahlbergi (Nilsson, 2001)	LC	40	<1960											PS		Kn		PeP		KiL	SoL		InL	
			≥1960																		KiL		EnL	InL
Porhydrus																								
lineatus (Fabricius, 1775)	LC	6	<1960	A	V	U	EK	St	EH	ES	LK	EP	PH	PS	PK	KP	Kn	OP						
			≥1960	A	V	U	EK	St	EH	ES		EP	PH	PS	PK		Kn							
Graptodytes																								
granularis (Linnaeus, 1767)	LC	20	<1960	A	V	U	EK	St	EH	ES	LK	EP	PH	PS	PK		Kn	OP	PeP	Ks	KiL			
			≥1960	A	V	U		St	EH		LK		PH		PK	KP			PeP			SoL		
bilineatus (Sturm, 1835)	VU	100*	<1960	A																				
			≥1960	A																				
pictus (Fabricius, 1787)	LC	30	<1960				EK		EH	ES	LK	EP	PH	PS	PK	KP		OP	PeP		KiL			
			≥1960	A		U	EK		EH	ES			PH	PS	PK		Kn							
Oreodytes																								
alpinus (Paykull, 1798)	LC	20	<1960														Kn	OP	PeP	Ks	KiL	SoL	EnL	InL
			≥1960													PK		Kn	OP	PeP	Ks			EnL
septentrionalis (Gyllenhal, 1826)	LC	30	<1960												PK		Kn	OP	PeP	Ks	KiL		EnL	InL
			≥1960																OP		Ks	KiL	SoL	
sanmarkii (Sahlberg, 1826)	LC	30	<1960												PK		Kn	OP	PeP		KiL	SoL	EnL	InL
			≥1960																	OP	PeP	Ks	KiL	SoL
Suphrodytes																								
dorsalis (Fabricius, 1787)	LC	6	<1960	A	V	U	EK	St	EH	ES	LK	EP		PS	PK	KP	Kn	OP	PeP		KiL	SoL		InL
			≥1960	A	V	U	EK	St	EH	ES			PH	PS	PK		Kn	OP		Ks			EnL	InL
figuratus (Gyllenhal, 1826)		60	<1960																		KiL		EnL	InL
			≥1960																					
Deronectes																								
latus (Stephens, 1829)	VU	80	<1960														Kn	OP		Ks				
			≥1960																	Ks				
Scarodytes																								
halensis (Fabricius, 1787)	LC	15	<1960	A	V	U		St		ES	LK													InL
			≥1960	A	V	U	EK	St	EH	ES	LK	EP	PH	PS	PK	KP	Kn							

Nebrioporus

assimilis (Paykull, 1798)	LC	30	<1960			U		St	EH	ES							PK	KP	Kn	OP	PeP	Ks	KiL	SoL	EnL	InL	
			≥1960														EP			KP		PeP	Ks	KiL	SoL	EnL	InL
depressus (Fabricius, 1775)	LC	6	<1960	A	V	U		St	EH	ES	LK	EP	PH	PS	PK	KP	Kn	OP	PeP	Ks	KiL	SoL	EnL	InL			
			≥1960	A	V	U	EK	St	EH	ES							EP	PH	PS	PK	KP	Kn	OP	PeP	Ks	SoL	EnL

Stictotarsus

griseostriatus (DeGeer, 1774)	LC	15	<1960	A	V	U		St				EP					KP		OP	PeP							
			≥1960	A	V	U	EK	St									KP										
multilineatus (Falkenström, 1922)	LC	20	<1960																Kn				KiL		EnL	InL	
			≥1960																				Ks	KiL	SoL	EnL	InL

Platambus

maculatus (Linnaeus, 1758)	LC	2	<1960	A	V	U		St	EH	ES		EP	PH	PS	PK	KP	Kn	OP			Ks	KiL	SoL	EnL	InL
			≥1960	A	V	U	EK	St	EH	ES		EP	PH	PS	PK		Kn	OP	PeP	Ks	KiL	SoL	EnL	InL	

Agabus

ungicularis (Thomson, 1867)	LC	20	<1960	A	V	U		St	EH			EP		PS	PK		Kn									
			≥1960	A	V		EK	St	EH	ES			PH	PS	PK	KP		OP								
affinis (Paykull, 1798)	LC	1	<1960	A	V	U		St	EH	ES		EP	PH	PS	PK	KP	Kn	OP	PeP	Ks	KiL		EnL	InL		
			≥1960	A	V	U	EK	St	EH	ES	LK	EP	PH	PS	PK	KP	Kn	OP	PeP	Ks	KiL	SoL		InL		
biguttulus (Thomson, 1867)	LC	15	<1960	A	V	U		St	EH	ES	LK	EP	PH	PS	PK	KP	Kn	OP	PeP	Ks			EnL			
			≥1960		V	U	EK	St	EH			EP	PH	PS	PK		Kn		PeP	Ks	KiL			InL		
paludosus (Fabricius, 1801)	NT	60	<1960	A	V	U	EK		EH	ES			PH	PS	PK											
			≥1960	A	V	U	EK	St	EH				PH		PK											
adpressus Aubé, 1837	LC	40	<1960																			KiL	SoL	EnL	InL	
			≥1960																					EnL		
guttatus (Paykull, 1798)	LC	4	<1960	A	V	U		St	EH	ES		EP	PH	PS	PK	KP	Kn		PeP	Ks	KiL	SoL	EnL	InL		
			≥1960	A	V	U	EK	St	EH	ES			PS	PK		Kn	OP	PeP	Ks	KiL		EnL	InL			
melanarius Aubé, 1837	LC	15	<1960		V	U		St	EH	ES		EP	PH	PS	PK		Kn	OP	PeP							
			≥1960		V	U		St	EH				PH	PS	PK		Kn		PeP		KiL			InL		
bipustulatus (Linnaeus, 1767)	LC	2	<1960	A	V	U	EK	St	EH	ES	LK	EP	PH	PS	PK	KP	Kn	OP	PeP		KiL	SoL	EnL	InL		
			≥1960	A	V	U	EK	St	EH	ES	LK	EP	PH	PS	PK	KP	Kn	OP	PeP	Ks	KiL	SoL	EnL	InL		
striolatus (Gyllenhal, 1808)	NT	60	<1960	A	V	U		St	EH			EP			PK											
			≥1960		V	U			EH			EP														
sturmii (Gyllenhal, 1808)	LC	2	<1960	A	V	U	EK	St	EH	ES	LK	EP	PH	PS	PK	KP	Kn	OP	PeP							
			≥1960	A	V	U	EK	St	EH	ES	LK	EP	PH	PS	PK	KP	Kn	OP	PeP	Ks	KiL	SoL				
arcticus (Paykull, 1798)	LC	6	<1960					St	EH			EP	PH	PS	PK		Kn	OP	PeP	Ks	KiL	SoL	EnL	InL		
			≥1960			U						EP	PH		PK	KP	Kn	OP	PeP	Ks	KiL	SoL	EnL	InL		
zetterstedti Thomson, 1856	LC	20	<1960																Kn	OP	PeP		KiL	SoL	EnL	InL
			≥1960																		Ks	KiL		EnL	InL	
elongatus (Gyllenhal, 1826)	LC	20	<1960		V	U			EH			EP	PH	PS	PK		Kn	OP	PeP		KiL	SoL	EnL	InL		
			≥1960					St	EH				PH		PK		Kn	OP		Ks		SoL		InL		
moestus (Curtis, 1835)	VU	100*	<1960																						InL	
			≥1960																						InL	
congener (Thunberg, 1794)	LC	2	<1960	A	V	U	EK	St	EH	ES		EP	PH	PS	PK	KP	Kn	OP	PeP	Ks	KiL					
			≥1960	A	V	U	EK	St	EH	ES	LK	EP	PH	PS	PK	KP	Kn	OP	PeP	Ks	KiL				InL	
lapponicus (Thomson, 1867)	LC	10	<1960											PH				Kn	OP	PeP	Ks	KiL	SoL	EnL	InL	
			≥1960															Kn	OP	PeP	Ks	KiL	SoL	EnL	InL	
thomsoni (J.Sahlberg, 1871)	LC	15	<1960																			KiL	EnL	InL		
			≥1960																		Ks	KiL	SoL	EnL	InL	
pseudoclypealis Scholtz, 1933	VU	100*	<1960																							
			≥1960																					EnL	InL	
discolor (Harris, 1828)	NT	80	<1960																						InL	
			≥1960																			KiL		EnL	InL	
clypealis (Thomson, 1867)	VU	100	<1960							ES							Kn									
			≥1960						EH						PK											
setulosus (J.Sahlberg, 1895)	NT	60	<1960							ES										PeP					InL	
			≥1960																		Ks			EnL	InL	

suturellus (Harris, 1828)	LC	1	<1960	A	V	U	EK	St	EH	ES	LK	EP	PH	PS	PK	KP	Kn	OP	PeP	Ks	KiL		EnL	InL	
			≥1960	A	V	U	EK	St	EH	ES	LK	EP	PH	PS	PK	KP	Kn	OP	PeP	Ks	KiL	SoL	EnL	InL	
bistriatus (Bergsträsser, 1778)	RE	100	<1960		V																				
			≥1960	A																					
exsoletus (Forster, 1771)	LC	1	<1960	A	V	U	EK	St	EH	ES	LK	EP	PH	PS	PK	KP	Kn	OP	PeP	Ks	KiL		EnL	InL	
			≥1960	A	V	U	EK	St	EH	ES	LK	EP	PH	PS	PK	KP	Kn	OP	PeP	Ks	KiL	SoL	EnL	InL	
fennicus Huldén, 1982	VU	100	<1960																						
			≥1960														Kn								InL
Colymbetes																									
fuscus (Linnaeus, 1758)	RE	100*	<1960	A	V	U			EH					PS											
			≥1960																						
paykulli Erichson, 1837	LC	2	<1960	A	V	U	EK	St	EH	ES		EP	PH	PS	PK	KP	Kn	OP	PeP	Ks	KiL	SoL	EnL	InL	
			≥1960	A	V	U	EK	St	EH	ES		EP	PH	PS	PK	KP	Kn	OP	PeP	Ks	KiL	SoL	EnL	InL	
striatus (Linnaeus, 1758)	LC	4	<1960	A	V	U	EK	St	EH	ES	LK	EP	PH	PS	PK	KP	Kn	OP	PeP		KiL			InL	
			≥1960	A	V	U	EK	St	EH	ES	LK	EP	PH	PS	PK	KP		OP	PeP			SoL			
dolabratus (Paykull, 1798)	LC	20	<1960														Kn	OP	PeP		KiL		EnL	InL	
			≥1960																			KiL	SoL	EnL	InL
Hydaticus																									
transversalis (Pontoppidan, 1763)	VU	100	<1960	A																					
			≥1960	A																					
aruspex Clark, 1864	LC	15	<1960		V	U		St	EH		LK			PS											
			≥1960		V	U	EK	St	EH	ES	LK	EP	PH	PS	PK	KP									
seminiger (DeGeer, 1774)	LC	15	<1960	A		U		St	EH	ES															
			≥1960	A	V	U	EK	St	EH		LK		PH												
Graphoderus																									
austriacus (Sturm, 1834)	NA	100a	<1960																						
			≥1960	A																					
bilineatus (DeGeer, 1774)	LC	20	<1960	A	V	U	EK		EH				PS	PK		Kn									
			≥1960	A	V	U	EK	St	EH				PH	PS	PK										
cinereus (Linnaeus, 1758)	LC	40	<1960	A		U																			
			≥1960	A	V	U	EK		EH	ES	LK														
zonatus (Hoppe, 1795)	LC	15	<1960	A	V	U		St	EH	ES	LK	EP	PH	PS	PK	KP	Kn	OP	PeP		KiL		EnL	InL	
			≥1960	A	V	U	EK	St	EH	ES		EP	PH	PS	PK		Kn		PeP		KiL	SoL	EnL	InL	
Acilius																									
sulcatus (Linnaeus, 1758)	LC	6	<1960	A	V	U	EK	St	EH	ES	LK	EP	PH	PS	PK	KP	Kn	OP	PeP		KiL		EnL	InL	
			≥1960	A	V	U	EK	St	EH	ES	LK	EP	PH		PK	KP	Kn		PeP	Ks	KiL	SoL			
canaliculatus (Nicolai, 1822)	LC	2	<1960	A	V	U	EK	St	EH	ES	LK	EP	PH	PS	PK	KP	Kn	OP	PeP					InL	
			≥1960	A	V	U	EK	St	EH	ES		EP	PH	PS	PK	KP	Kn	OP	PeP		KiL			InL	
Dytiscus																									
dimidiatus Bergsträsser, 1778	NA	100	<1960																						
			≥1960		V	U																			
marginalis Linnaeus, 1758	LC	4	<1960	A	V	U	EK	St	EH	ES		EP	PH	PS	PK	KP	Kn	OP	PeP		KiL	SoL			
			≥1960	A	V	U	EK	St	EH	ES	LK	EP	PH	PS	PK	KP	Kn	OP							
latissimus Linnaeus, 1758	LC	10	<1960		V	U	EK		EH	ES			PH	PS	PK	KP	Kn	OP	PeP						
			≥1960		V	U	EK	St	EH	ES	LK		PH	PS	PK		Kn			Ks		SoL			
circumcinctus Ahrens, 1811	LC	2	<1960	A	V	U		St	EH	ES	LK	EP		PS	PK	KP	Kn	OP		Ks	KiL	SoL	EnL	InL	
			≥1960	A	V	U	EK	St	EH	ES		EP	PH	PS	PK	KP		OP	PeP		KiL	SoL	EnL	InL	
lapponicus Gyllenhal, 1808	LC	10	<1960		V	U		St	EH	ES		EP		PS	PK	KP	Kn	OP	PeP	Ks	KiL	SoL	EnL	InL	
			≥1960		V	U	EK	St	EH	ES		EP	PH	PS	PK	KP		OP		Ks	KiL		EnL	InL	
Cybister																									
lateralimarginalis (DeGeer, 1774)	NA	100	<1960																						
			≥1960		V	U	EK																		
Carabidae																									
Pelophila																									
borealis (Paykull, 1790)	LC	20	<1960						EH	ES				PS	PK	KP	Kn	OP	PeP	Ks	KiL	SoL	EnL	InL	
			≥1960														KP		OP	PeP	Ks	KiL	SoL	EnL	InL

Leistus

terminatus (Hellwig, 1793)	LC	6	<1960	A	V	U		St	EH	ES	LK	EP	PH			KP	Kn	OP	PeP						
			≥1960	A	V	U	EK	St	EH	ES	LK	EP	PH	PS	PK	KP	Kn	OP	PeP	Ks	KiL	SoL		InL	
ferrugineus (Linnaeus, 1758)	LC	10	<1960	A	V	U	EK	St	EH	ES	LK	EP	PH	PS	PK					Ks					
			≥1960	A	V	U	EK	St	EH	ES		EP	PH	PS	PK		Kn				KiL				

Nebria

livida (Linnaeus, 1758)	VU	80	<1960			U		St	EH	ES	LK													
			≥1960	A	V	U	EK	St																
rufescens (Strøm, 1768)	LC	10	<1960	A	V				EH	ES			PH	PS	PK		Kn	OP	PeP	Ks	KiL	SoL	EnL	InL
			≥1960			U	EK		EH	ES			PH	PS	PK				PeP	Ks	KiL	SoL	EnL	InL
nivalis (Paykull, 1790)	NT	80	<1960																		KiL		EnL	InL
			≥1960																				EnL	InL
brevicollis (Fabricius, 1792)	LC	40	<1960	A																				
			≥1960	A	V	U	EK																	

Notiophilus

aestuans Dejean, 1826	VU	60	<1960	A	V	U	EK	St	EH					PS										
			≥1960	A	V	U				ES														
aquaticus (Linnaeus, 1758)	LC	2	<1960	A	V	U	EK	St	EH	ES	LK	EP	PH	PS	PK	KP	Kn	OP	PeP	Ks	KiL	SoL	EnL	InL
			≥1960	A	V	U	EK	St	EH	ES	LK	EP	PH	PS	PK	KP	Kn	OP	PeP	Ks	KiL	SoL	EnL	InL
palustris (Duftschmid, 1812)	LC	4	<1960	A	V	U	EK	St	EH	ES		EP	PH	PS	PK	KP	Kn	OP	PeP	Ks		SoL		InL
			≥1960	A	V	U	EK	St	EH	ES	LK	EP	PH	PS	PK	KP	Kn	OP	PeP	Ks	KiL			
germinyi Fauvel, 1863	LC	2	<1960	A	V	U	EK	St	EH	ES		EP	PH	PS	PK	KP	Kn		PeP	Ks	KiL		EnL	InL
			≥1960	A	V	U	EK	St	EH	ES	LK	EP		PS	PK	KP	Kn	OP	PeP	Ks	KiL	SoL	EnL	InL
reitteri Spaeth, 1900	LC	15	<1960				EK		EH				PH		PK	KP	Kn			Ks	KiL	SoL		InL
			≥1960		V	U							PH		PK	KP	Kn		PeP	Ks	KiL	SoL	InL	
biguttatus (Fabricius, 1779)	LC	2	<1960	A	V	U	EK	St	EH	ES		EP	PH	PS	PK	KP	Kn	OP	PeP	Ks	KiL		EnL	
			≥1960	A	V	U	EK	St	EH	ES	LK	EP	PH	PS	PK	KP	Kn	OP	PeP	Ks	KiL	SoL	InL	

Loricera

pilicornis (Fabricius, 1775)	LC	2	<1960	A	V	U	EK	St	EH	ES		EP	PH	PS	PK	KP	Kn	OP	PeP	Ks	KiL	SoL	EnL	InL
			≥1960	A	V	U	EK	St	EH	ES	LK	EP	PH	PS	PK	KP	Kn	OP	PeP	Ks	KiL	SoL	EnL	InL

Cicindela

sylvatica Linnaeus, 1758	LC	2	<1960	A	V	U	EK	St	EH	ES	LK	EP	PH	PS	PK	KP	Kn	OP	PeP	Ks	KiL	SoL	EnL	InL
			≥1960	A	V	U	EK	St	EH	ES	LK	EP	PH	PS	PK	KP	Kn	OP	PeP	Ks	KiL	SoL		
hybrida Linnaeus, 1758	LC	10	<1960			U	EK		EH	ES	LK		PH	PS	PK									
			≥1960		V	U	EK		EH	ES	LK		PH	PS	PK									
maritima Latreille & Dejean, 1822	VU	60	<1960		V	U					LK		PH	PS	PK	KP	Kn	OP	PeP	Ks	KiL	SoL		InL
			≥1960												PK	KP			PeP	Ks		SoL	InL	
campestris Linnaeus, 1758	LC	2	<1960	A	V	U	EK	St	EH	ES		EP	PH	PS	PK	KP	Kn	OP		Ks				
			≥1960	A	V	U	EK	St	EH	ES	LK	EP	PH	PS	PK	KP	Kn	OP	PeP	Ks				

Calosoma

inquisitor (Linnaeus, 1758)	RE	100*	<1960		V	U																		
			≥1960																					
denticolle Gebler, 1833	NA	100a	<1960			U																		
			≥1960																					

Carabus

arcensis Herbst, 1784	LC	60	<1960		V	U			St	EH	ES	LK		PH										
			≥1960		V	U	EK			EH	ES													
granulatus Linnaeus, 1758	LC	10	<1960	A	V	U	EK	St	EH	ES		EP	PH	PS		KP		OP						
			≥1960	A	V	U	EK	St	EH	ES	LK	EP			PK	KP								
clathratus Linnaeus, 1761	LC	6	<1960	A	V	U		St		ES		EP	PH		PK	KP	Kn	OP	PeP	Ks	KiL			
			≥1960	A	V	U	EK				EP				KP	OP					KiL	SoL	EnL	
cancellatus Illiger, 1798 <i>ssp. tuberculatus</i> Dejean, 1826	LC	6	<1960			U	EK		EH	ES	LK		PH	PS	PK		Kn							
			≥1960			U	EK	St	EH	ES	LK	EP	PH	PS	PK	KP	Kn							
nemoralis Müller, 1764	LC	6	<1960	A	V	U	EK	St	EH	ES	LK		PH	PS	PK	KP	Kn							
			≥1960	A	V	U	EK	St	EH	ES	LK	EP	PH	PS	PK	KP								
hortensis Linnaeus, 1758	LC	4	<1960	A	V	U	EK	St	EH	ES	LK	EP	PH	PS		KP	Kn	OP						
			≥1960	A	V	U	EK	St	EH	ES	LK	EP	PH		PK	KP								

glabratus Paykull, 1790	LC	1	<1960	A	V	U	EK	St	EH	ES	LK	EP	PH	PS	PK	KP	Kn	OP	PeP	Ks	KiL	SoL	EnL	InL
			≥1960		V	U	EK	St	EH	ES	LK	EP	PH	PS	PK	KP	Kn	OP	PeP	Ks	KiL	SoL	EnL	InL
problematicus Herbst, 1786	NT	100	<1960																					
			≥1960																					EnL
nitens Linnaeus, 1758	LC	10	<1960	A	V	U	EK	St	EH	ES	LK	EP	PH	PS	PK	KP	Kn	OP	PeP	Ks	KiL	SoL	EnL	InL
			≥1960	A	V	U	EK	St	EH	ES		EP	PH		PK	KP	Kn	OP	PeP	Ks	KiL	SoL		
convexus Fabricius, 1775	VU	60	<1960	A	V	U																		
			≥1960		V	U																		
violaceus Linnaeus, 1758	LC	6	<1960	A	V	U		St	EH	ES					PK		Kn	OP	PeP	Ks	KiL	SoL	EnL	
			≥1960	A	V	U	EK	St	EH				PH	PK		Kn	OP	PeP	Ks	KiL				InL
Cychrus																								
caraboides (Linnaeus, 1758)	LC	4	<1960	A	V	U		St	EH		LK		PH	PS	PK	KP	Kn		PeP	Ks	KiL	SoL		
			≥1960	A	V	U	EK	St	EH	ES	LK	EP	PH	PS	PK	KP	Kn	OP	PeP	Ks	KiL	SoL		
Blethisa																								
multipunctata (Linnaeus, 1758)	LC	10	<1960	A	V	U	EK	St	EH	ES	LK	EP	PH	PS	PK	KP	Kn	OP	PeP	Ks	KiL	SoL	EnL	InL
			≥1960	A	V	U	EK	St	EH	ES				PS	PK			OP	PeP		KiL	SoL	EnL	InL
Diacheila																								
arctica (Gyllenhal, 1810)	LC	60	<1960																		KiL	SoL	EnL	InL
			≥1960																				SoL	EnL
Elaphrus																								
lapponicus Gyllenhal, 1810	LC	40	<1960											PS		Kn		PeP	Ks	KiL	SoL		InL	
			≥1960																OP	PeP	Ks	KiL		EnL
uliginosus Fabricius, 1792	VU	40	<1960	A	V	U	EK	St	EH	ES	LK		PH	PS	PK	KP	Kn	OP	PeP	Ks	KiL			
			≥1960	A		U								PH					OP		Ks	KiL	SoL	EnL
cupreus Duftschmid, 1812	LC	1	<1960	A	V	U	EK	St	EH	ES	LK	EP	PH	PS	PK	KP	Kn	OP	PeP	Ks	KiL	SoL	EnL	InL
			≥1960	A	V	U	EK	St	EH	ES	LK	EP	PH	PS	PK	KP	Kn	OP	PeP	Ks	KiL	SoL	EnL	InL
riparius (Linnaeus, 1758)	LC	1	<1960	A	V	U	EK	St	EH	ES	LK	EP	PH	PS	PK	KP	Kn	OP	PeP	Ks	KiL	SoL	EnL	InL
			≥1960	A	V	U	EK	St	EH	ES		EP	PH	PS	PK	KP	Kn	OP	PeP	Ks	KiL	SoL	EnL	InL
Brachinus																								
crepitans (Linnaeus, 1758)	NA	100a	<1960			U																		
			≥1960																					
Clivina																								
fossor (Linnaeus, 1758)	LC	2	<1960	A	V	U	EK	St	EH	ES	LK	EP	PH	PS	PK	KP	Kn	OP	PeP	Ks	KiL	SoL	EnL	InL
			≥1960	A	V	U	EK	St	EH	ES	LK	EP	PH	PS	PK	KP	Kn	OP	PeP	Ks	KiL	SoL	EnL	InL
Dyschirius																								
thoracicus (Rossi, 1790)	LC	4	<1960	A	V	U	EK	St	EH	ES	LK	EP	PH	PS	PK	KP	Kn	OP	PeP	Ks			EnL	InL
			≥1960	A	V	U	EK	St		ES	LK	EP	PH		PK	KP	Kn	OP	PeP	Ks			EnL	InL
obscurus (Gyllenhal, 1827)	LC	30	<1960		V	U			ES						PK	KP	Kn	OP					InL	
			≥1960			U	EK								PK	KP		OP		Ks				InL
angustatus (Ahrens, 1830)	VU	80	<1960																				InL	
			≥1960																	Ks				InL
nitidus (Dejean, 1825)	RE	100*	<1960			U																		
			≥1960																					
politus (Dejean, 1825)	LC	15	<1960	A	V	U		St	EH	ES	LK			PS	PK	KP		OP		Ks		SoL		
			≥1960	A	V	U	EK	St	EH	ES	LK	EP	PH			KP	Kn	OP		Ks	KiL	SoL	EnL	
impunctipennis Dawson, 1854	VU	100	<1960	A				St								KP	OP							
			≥1960					St																
salinus Schaum, 1843	EN	100	<1960	A	V	U																		
			≥1960	A		U																		
aeneus (Dejean, 1825)	LC	40	<1960	A	V			EH		LK														
			≥1960	A		U	EK			LK					PK									
tristis Stephens, 1827	LC	10	<1960	A	V	U		St	EH	ES	LK	EP	PH	PS	PK			OP		Ks				
			≥1960	A	V	U	EK	St	EH			EP	PH			KP	Kn	OP				SoL		
nigricornis Motschulsky, 1844	LC	6	<1960			U	EK		ES		EP			PK	KP		OP	PeP	Ks	KiL		EnL	InL	
			≥1960			V	U	EK	St	EH	ES	LK	EP	PH	PS		KP	Kn	OP	PeP	Ks	KiL	SoL	EnL
melancholicus Putzeys, 1866	LC	40	<1960																		KiL		EnL	InL
			≥1960																			KiL	SoL	EnL

Paranchus

albipes (Fabricius, 1796)	NT	80	<1960			V	U													
			≥1960			V	U		St											

Platynus

livens (Gyllenhal, 1810)	LC	20	<1960			V	U			EH	ES			PH		PK						
			≥1960	A	V	U	EK	St	EH		LK			PS		PK						
mannerheimii (Dejean, 1828)	LC	10	<1960			V	U		St	EH				PH		PK		Kn	OP	PeP	KiL	
			≥1960			V	U	EK		EH	ES			PH	PS	PK	KP	Kn		PeP	Ks	KiL
assimilis (Paykull, 1790)	LC	10	<1960	A	V	U		St	EH	ES				EP		PK						
			≥1960			V	U	EK	St	EH	ES			EP	PH		PK	KP				

Agonum

micans (Nicolai, 1822)	LC	20	<1960			V	U			EH						KP					Ks	KiL			
			≥1960	A	V	U	EK	St	EH	ES				EP		PK		Kn	OP	PeP					
piceum (Linnaeus, 1758)	LC	2	<1960	A	V	U	EK	St	EH		LK	EP	PH	PS	PK	KP	Kn	OP	PeP	Ks	KiL	SoL	EnL	InL	
			≥1960	A	V	U	EK	St	EH	ES	LK	EP	PH	PS	PK	KP	Kn	OP	PeP	Ks	KiL	SoL		InL	
gracile Sturm, 1824	LC	1	<1960	A	V	U	EK	St	EH	ES	LK	EP	PH	PS	PK	KP	Kn	OP	PeP	Ks	KiL	SoL		InL	
			≥1960	A	V	U	EK	St	EH	ES	LK	EP	PH	PS	PK	KP	Kn	OP	PeP	Ks	KiL	SoL	EnL	InL	
fuliginosum (Panzer, 1809)	LC	1	<1960	A	V	U	EK	St	EH	ES	LK	EP	PH	PS	PK	KP	Kn	OP	PeP	Ks	KiL	SoL	EnL	InL	
			≥1960	A	V	U	EK	St	EH	ES	LK	EP	PH	PS	PK	KP	Kn	OP	PeP	Ks	KiL	SoL	EnL	InL	
thoreyi Dejean, 1828	LC	4	<1960	A	V	U		St	EH	ES	LK	EP	PH		PK	KP		OP			KiL				
			≥1960	A	V	U	EK	St	EH	ES	LK	EP	PH	PS	PK	KP	Kn	OP	PeP					InL	
consimile (Gyllenhal, 1810)	LC	20	<1960																			KiL		EnL	InL
			≥1960							ES												KiL	SoL	EnL	InL
munsteri (Hellén, 1935)	LC	20	<1960			V	U			EH	ES				PK		Kn					SoL			
			≥1960			V	U	EK		EH	ES				PS		KP	Kn		PeP	Ks	KiL		EnL	InL
gracilipes (Duftschmid, 1812)	NA	100a	<1960	A		U																			
			≥1960	A			EK																		
marginatum (Linnaeus, 1758)	LC	30	<1960	A	V	U																			
			≥1960	A	V	U	EK																		
sexpunctatum (Linnaeus, 1758)	LC	4	<1960	A	V	U	EK	St	EH	ES	LK	EP	PH	PS	PK	KP	Kn	OP	PeP	Ks	KiL	SoL		InL	
			≥1960	A	V	U	EK	St	EH	ES		EP	PH	PS	PK	KP	Kn	OP	PeP	Ks	KiL			InL	
ericeti (Panzer, 1809)	LC	4	<1960			V	U	EK	St	EH	ES			EP		PS	PK	KP	Kn		PeP	Ks	KiL	EnL	InL
			≥1960			V	U	EK	St	EH	ES	LK	EP	PH		PK	KP	Kn	OP	PeP	Ks	KiL	SoL	EnL	InL
muelleri (Herbst, 1784)	LC	15	<1960	A	V	U	EK	St	EH	ES			PH	PS	PK	KP	Kn				Ks				
			≥1960	A	V	U	EK	St	EH	ES	LK		PH	PS					OP	PeP					
dolens (Sahlberg, 1827)	LC	15	<1960	A	V	U		St	EH	ES		EP		PS	PK		Kn	OP	PeP	Ks	KiL	SoL	EnL	InL	
			≥1960			V	U		EH			EP	PH		PK	KP	Kn	OP	PeP	Ks	KiL	SoL	EnL	InL	
versutum Sturm, 1824	LC	4	<1960	A	V	U	EK	St	EH	ES	LK		PH	PS	PK	KP	Kn		PeP						
			≥1960	A	V	U	EK	St	EH	ES		EP	PH	PS	PK	KP	Kn		PeP						
hypocrita (Apfelbeck, 1904)	NE	100	<1960																						
			≥1960	A																					
viduum (Panzer, 1796)	LC	2	<1960	A	V	U	EK	St	EH	ES	LK	EP	PH	PS	PK	KP	Kn	OP	PeP	Ks	KiL				
			≥1960	A	V	U	EK	St	EH	ES	LK	EP	PH	PS	PK	KP	Kn	OP	PeP	Ks					
emarginatum (Gyllenhal, 1827)	NT	80	<1960			V	U																		
			≥1960	A		U																			
lugens (Duftschmid, 1812)	VU	100	<1960	A																					
			≥1960	A																					

Amara

plebeja (Gyllenhal, 1810)	LC	4	<1960	A	V	U	EK	St	EH	ES	LK	EP	PH	PS	PK	KP	Kn	OP				SoL		
			≥1960	A	V	U	EK	St	EH	ES	LK	EP	PH	PS	PK	KP	Kn		PeP					
similata (Gyllenhal, 1810)	LC	15	<1960	A	V	U	EK	St	EH	ES	LK	EP	PH	PS	PK	KP	Kn	OP						
			≥1960	A	V	U	EK	St	EH	ES	LK	EP		PS	PK			OP						
ovata (Fabricius, 1792)	LC	6	<1960			V	U		St	EH	ES	LK	EP		PS	PK	KP	Kn	OP			SoL		
			≥1960	A	V	U	EK	St	EH	ES	LK	EP		PS	PK		Kn	OP	PeP	Ks		SoL		
montivaga Sturm, 1825	LC	15	<1960			V	U	EK		EH	ES			PH	PS	PK								
			≥1960			V	U	EK	St	EH	ES	LK	EP		PS	PK			OP					

verbasci (Duftschmid, 1812)	NA	100	<1960																					
			≥1960			EK																		
harpalinus (Audinet-Serv., 1821)	NA	100	<1960																					
			≥1960			U EK																		
csikii Laczó, 1912	NE	100	<1960																					
			≥1960								PK													
causicus (Chaudoir, 1846)	LC	2	<1960	V	U	EK	St	EH	ES				PK	KP	Kn	OP		Ks		SoL				
			≥1960	A V U EK St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL																				
Dicheirotrichus																								
rufithorax (Sahlberg, 1827)	LC	15	<1960	V	U			EH	ES		EP	PH	PS											
			≥1960	V U EK St EH ES LK EP PH PS PK KP OP																				
cognatus (Gyllenhal, 1827)	LC	6	<1960	V	U		St				EP			KP	Kn	OP		Ks	KiL				InL	
			≥1960	U EK St EH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL																				
placidus (Gyllenhal, 1827)	LC	2	<1960	A	V	U	EK	St	EH	ES		EP	PH	PS	PK	KP	Kn	OP			KiL			
			≥1960	A V U EK St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL																				
Acupalpus																								
flavicollis (Sturm, 1825)	LC	20	<1960			U	EK			ES							PK							
			≥1960	A V U EK St EH ES LK EP PH PS PK KP																				
meridianus (Linnaeus, 1761)	LC	30	<1960			U																		
			≥1960	A V U EK EH ES																				
parvulus (Sturm, 1825)	LC	6	<1960	A	V	U	EK	St	EH	ES	LK	EP	PH	PS	PK	KP							KiL	
			≥1960	A V U EK St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn PeP																				
exiguus Dejean, 1829	LC	60	<1960	A	V	U	EK		EH	ES	LK													
			≥1960	A V U EK St ES																				
Anthracus																								
consputus (Duftschmid, 1812)	NT	100	<1960	V	U																			
			≥1960	A U																				
Perigona																								
nigriceps (Dejean, 1831)	LC	15	<1960																					
			≥1960	V U EK St EH ES PH PS PK Kn OP PeP Ks																				
Masoreus																								
wetterhallii (Gyllenhal, 1813)	NA	100	<1960																					
			≥1960	V																				
Odacantha																								
melanura (Linnaeus, 1767)	LC	15	<1960	A		U					LK													
			≥1960	A V U EK EH ES LK PK																				
Lebia																								
cyancephala (Linnaeus, 1758)	RE	100*	<1960	A	V	U		St	EH		LK													
			≥1960																					
chlorocephala (Hoffmann, 1803)	LC	15	<1960	A	V	U	EK	St	EH	ES	LK		PH	PS	PK	KP		OP	PeP					
			≥1960	A V U EK St EH ES LK EP PH PS PK																				
cruxminor (Linnaeus, 1758)	LC	20	<1960	A	V	U	EK	St	EH	ES	LK	EP	PH		PK	KP	Kn	OP				KiL		
			≥1960	A V U EK St EH ES LK EP PK KP OP PeP																				
Demetrias																								
monostigma Samouelle, 1819	NA	100*	<1960			U																		
			≥1960	V																				
imperialis (Germar, 1824)	LC	30	<1960																					
			≥1960	A V U EK EH ES LK																				
Paradromius																								
longiceps (Dejean, 1826)	LC	40	<1960	V																OP				
			≥1960	V U EK																OP				
linearis (Olivier, 1795)	LC	30	<1960	A	V	U																		
			≥1960	A V U					ES															
Dromius																								
agilis (Fabricius, 1787)	LC	2	<1960	A	V	U		St	EH	ES			PH	PS		KP	Kn	OP	PeP		KiL		EnL	InL
			≥1960	A V U EK St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL																				

minutum (Fabricius, 1775)	LC	1	<1960	A	V	U	St	EH	ES	LK	EP	PH	PS	PK	KP	Kn	OP	PeP	KiL	SoL	EnL	InL	
				≥1960	A	V	U	EK	St	EH	ES	LK	EP	PH	PS	PK	KP	Kn	OP	PeP	Ks	KiL	SoL
crenatum (Kugelann, 1794)	LC	20	<1960	A	V	U		EH				PH	PS	PK			OP		KiL				
				≥1960	V	U	EK	St	EH	ES	LK	EP	PH		PK			OP					

Sphaeridium

bipustulatum Fabricius, 1781	LC	10	<1960	A	V	U	EK	St	EH	ES			PH	PS	PK									
				≥1960	A	V	U	EK	St	EH	ES	LK	EP	PH		PK								
marginatum Fabricius, 1787	LC	15	<1960	A	V	U		St	EH	ES		EP												
				≥1960	A	V	U	EK	St	EH	ES		EP			PK								
lunatum Fabricius, 1792	LC	6	<1960	A	V	U	EK	St	EH	ES	LK	EP		PS	PK			OP	PeP					
				≥1960	A	V	U	EK	St	EH	ES	LK	EP		PS	PK			OP	PeP	Ks			
scarabaeoides (Linnaeus, 1758)	LC	4	<1960	A	V	U		St	EH	ES	LK	EP	PH	PS	PK	KP	Kn	OP	PeP	KiL				
				≥1960	A	V	U	EK	St	EH	ES	LK	EP	PH	PS	PK	KP		OP	PeP	Ks			

Sphaeritidae

Sphaerites

glabratus (Fabricius, 1792)	LC	2	<1960	A	V	U	EK	St	EH	ES	LK		PH	PS	PK	KP	Kn	OP	PeP	Ks		SoL		InL
				≥1960	A	V	U	EK	St	EH	ES		EP	PH	PS	PK		Kn	OP	PeP	Ks	KiL	SoL	

Histeridae

Plegaderus

saucius Erichson, 1834	LC	15	<1960	V	U		St	EH	ES		EP	PH	PS	PK				PeP						
				≥1960	V	U			EH	ES			PH		PK	KP	Kn		PeP					
vulneratus (Panzer, 1797)	LC	2	<1960	A	V	U		St	EH	ES	LK		PH	PS	PK	KP	Kn		PeP	Ks	KiL	SoL		InL
				≥1960	V	U	EK	St	EH	ES		EP	PH	PS	PK	KP	Kn		OP	PeP	Ks		SoL	
caesus (Herbst, 1792)	NT	60	<1960	A	V	U																		
				≥1960	A	V	U																	

Acritus

minutus (Herbst, 1792)	VU	80	<1960	V	U		St	EH																
				≥1960		U	EK		ES				PS	PK										
nigricornis (Hoffmann, 1803)	LC	20	<1960	A	V	U		St	EH	ES			PH	PS	PK	KP				KiL				
				≥1960	V	U	EK	St	EH	ES		EP	PH	PS	PK	KP	Kn		OP	PeP	Ks		SoL	

Teretrius

fabricii Mazur, 1972	VU	100	<1960																				
				≥1960					ES														

Saprinus

rugifer (Paykull, 1809)	VU	100	<1960				St																	
				≥1960									PS	PK										
planiusculus Motschulsky, 1849	VU	100*	<1960																					
				≥1960	V	U																		
semistriatus (Scriba, 1790)	LC	20	<1960	A	V	U		St	EH	ES		EP	PH	PS	PK	KP								
				≥1960	A	V	U	EK	St	EH	ES		EP		PK			OP						
immundus (Gyllenhal, 1827)	VU	100*	<1960		U			EH																
				≥1960			EK																	
aeneus (Fabricius, 1775)	NT	30	<1960	A	V	U		St	EH	ES	LK		PH	PS	PK	KP	Kn	OP	PeP	KiL				
				≥1960	A	V	U	EK		ES	LK	EP												

Hypocaccus

rugiceps (Duftschmid, 1805)	VU	80	<1960				St								KP		OP		Ks					
				≥1960											KP		OP		Ks					
rugifrons (Paykull, 1798)	LC	20	<1960	A		U		St		ES		EP		PS		KP								
				≥1960	A	V	U	EK	St		ES					KP		OP	PeP					

Gnathoncus

rotundatus (Kugelann, 1792)	LC	30	<1960	A	V	U		St	EH	ES	LK		PH	PS	PK	KP		OP						
				≥1960	V	U	EK	St	EH	ES			PH			Kn								
nannetensis (Marseul, 1862)	LC	20	<1960	A	V	U			EH	ES			PH		PK	KP			PeP		KiL			
				≥1960	A	V	U	EK	St	EH	ES	LK	EP	PH	PS	PK	KP	Kn	OP	PeP	Ks			
communis (Marseul, 1862)	LC	30	<1960	A	V	U		St	EH				PH	PS										
				≥1960	A	V	U	EK		EH	ES		EP	PS			Kn							

Eblisia

minor (Rossi, 1792)	LC	10	<1960	A	V	U	St	EH	ES			PH	PS	PK			PeP					
			≥1960	A	V	U		St	EH	ES	LK		PH	PS	PK		Kn	OP	PeP	Ks	KiL	SoL

Platysoma

compressum (Herbst, 1783)	NE	100*	<1960																			
			≥1960				EK															
deplanatum (Gyllenhal, 1808)	LC	20	<1960		V	U	St	EH				PH										
			≥1960	A	V	U	EK	St	EH	ES			PH	PS	PK		Kn					
angustatum (Hoffmann, 1803)	LC	6	<1960	A	V	U	St	EH	ES	LK		PH	PS	PK			PeP					
			≥1960		V	U	EK		EH	ES		EP	PH	PS	PK	KP	Kn	OP	PeP			
lineare Erichson, 1834	LC	15	<1960	A	V	U	St	EH	ES			PH	PS	PK			PeP	Ks				
			≥1960	A	V	U	EK	St	EH	ES			PH		PK		Kn	PeP	Ks		SoL	
elongatum (Thunberg, 1787)	RE	100*	<1960		V		St					PH										
			≥1960																		KiL	

Hololepta

plana (Sulzer, 1776)	VU	100	<1960		V	U	St	EH														
			≥1960				EK		ES				PK									

Hydraenidae

Limnebius

truncatellus (Thunberg, 1794)	LC	6	<1960	A	V	U	St	EH	ES		EP	PH	PS	PK								
			≥1960	A	V	U	EK	St	EH	ES		EP	PH	PS	PK							
crinifer Rey, 1885	VU	100*	<1960		U			EH					PS	PK								
			≥1960																			
parvulus (Herbst, 1797)	LC	10	<1960	A	V	U	St	EH	ES	LK		PH	PS	PK								
			≥1960	A	V	U	EK	St	EH	ES			PH	PS	PK							
nitidus (Marsham, 1802)	NA	100*	<1960		U																	
			≥1960																			
aluta Bedel, 1881	LC	30	<1960	A	V	U		EH	ES													
			≥1960	A	V			EH	ES			PH	PS	PK								

Hydraena

palustris Erichson, 1837	LC	30	<1960		V		St	EH														
			≥1960	A	V			EH	ES				PS	PK								
britteni Joy, 1907	LC	2	<1960	A	V	U	EK	St	EH	ES	LK		PH	PS	PK		OP	PeP	Ks	KiL		
			≥1960	A	V	U	EK	St	EH	ES	LK	EP	PH	PS	PK		Kn	OP	PeP	Ks	KiL	InL
riparia Kugelann, 1794	LC	10	<1960	A	V	U	EK	St	EH	ES	LK	EP	PH		KP							
			≥1960		V	U	EK	St	EH	ES	LK	EP	PH	PS	PK		Kn		Ks			
pulchella Germar, 1824	LC	40	<1960		U			EH	ES													
			≥1960		V	U		EH										PeP	Ks			
gracilis Germar, 1824	LC	15	<1960		U			EH					PS	PK				Ks	KiL			
			≥1960		V	U		St	EH				PH	PS		Kn	PeP	Ks		SoL		
excisa Kiesenwetter, 1849	LC	60	<1960																			
			≥1960																Ks			InL

Ochthebius

bicolon Germar, 1824	NE	100*	<1960	A																		
			≥1960	A																		
czwalinai Kuwert, 1887	LC	40	<1960	A	V	U																
			≥1960	A	V	U		EH														
kaninensis Poppius, 1909	NE	100*	<1960																			
			≥1960																Ks			
minimus (Fabricius, 1792)	LC	10	<1960	A	V																	
			≥1960	A	V	U	EK	St		ES				PK	KP		OP					
alpinus (Ieniştea, 1979)	LC	6	<1960		U			EH					PS	PK	KP		OP			KiL		
			≥1960		U			ES					PH	PS	PK				Ks			
hungaricus Endrödy-Younga, 1967	NE	40	<1960		V	U																
			≥1960		U			EH														
marinus (Paykull, 1798)	LC	30	<1960	A	V	U	St	EH			EP			KP		OP	PeP					
			≥1960	A	V	U								KP		OP						

Ptiliidae**Ptenidium**

<i>laevigatum</i> Erichson, 1845	VU	80	<1960	A	V			EH					PK						
			≥1960				EK		ES	LK		PH							
<i>turgidum</i> Thomson, 1855	NA	100	<1960																
			≥1960	A															
<i>intermedium</i> Wankowicz, 1869	NA	100	<1960																
			≥1960	V															
<i>fuscicorne</i> Erichson, 1845	LC	20	<1960	A	V	U					EP		PK						
			≥1960	A	V	U		St	EH										
<i>punctatum</i> (Gyllenhal, 1827)	VU	80	<1960	A	V	U			EH					KP					
			≥1960	A							LK	EP							
<i>formicetorum</i> Kraatz, 1851	LC	2	<1960	A	V	U		St	EH	ES			PH	PS	PK			OP	
			≥1960	A	V	U	EK	St	EH	ES			PH	PS	PK	Kn	OP	PeP	
<i>pusillum</i> (Gyllenhal, 1808)	LC	2	<1960	A	V	U		St	EH	ES	LK	EP	PH		PK	Kn	OP		
			≥1960	A	V	U	EK	St	EH	ES	LK	EP	PH	PS	PK	Kn	OP	PeP	
<i>nitidum</i> (Heer, 1841)	LC	2	<1960	A	V	U		St	EH	ES	LK	EP	PH	PS					
			≥1960	A	V	U	EK	St	EH	ES	LK	EP	PH	PS	PK	Kn	OP	PeP	

Oligella

<i>foveolata</i> (Allibert, 1844)	LC	60	<1960	V	U		St	EH											
			≥1960	V	U			EH		LK									

Micridium

<i>halidaii</i> (Matthews, 1868)	LC	20	<1960	V	U													Ks	
			≥1960	A	V	U			EH	ES	LK		PH	PS	PK			PeP	KiL

Millidium

<i>minutissimum</i> (Ljungh, 1804)	EN	80	<1960	V	U		St	EH			EP	PH			KP				KiL
			≥1960		U		St	EH	ES			PH						PeP	

Ptilium

<i>myrmecophilum</i> (Allibert, 1844)	LC	10	<1960	A	V	U			EH				PS					Ks	KiL
			≥1960	V	U			EH	ES		EP	PH	PS	PK		Kn	OP	PeP	KiL
<i>exaratum</i> (Allibert, 1844)	LC	15	<1960	A	V	U		St	EH	ES	LK		PH	PS		KP			
			≥1960	A	V	U	EK	St	EH	ES	LK		PH	PS	PK		Kn	OP	Ks
<i>modestum</i> Wankowicz, 1869	LC	30	<1960	A	V				EH	ES									
			≥1960	A	V	U			EH	ES			PH						

Euryptilium

<i>saxonicum</i> (Gillmeister, 1845)	LC	2	<1960	V	U			EH	ES				PS				OP	Ks	
			≥1960	A	V	U	EK	St	EH	ES	LK		PH	PS	PK	Kn	OP	PeP	Ks

Ptiliola

<i>kunzei</i> (Heer, 1841)	LC	2	<1960	A	V	U		St	EH	ES	LK		PH	PS		KP		OP	PeP
			≥1960	V	U	EK	St	EH	ES	LK	EP	PH	PS	PK		Kn	OP	PeP	Ks
<i>brevicollis</i> (Matthews, 1860)	LC	40	<1960						EH										
			≥1960	V	U				EH	ES				PK					

Ptiliolium

<i>stockmanni</i> Besuchet, 1971	CR	100*	<1960			U													
			≥1960			U													
<i>caledonicum</i> (Sharp, 1871)	LC	10	<1960	V	U	EK	St					PH							
			≥1960	A	V	U	EK		EH	ES			PH	PS	PK	Kn		PeP	Ks
<i>schwarzi</i> (Flach, 1887)	LC	30	<1960	V					EH										
			≥1960	V	U		St	EH	ES			PH		PK					
<i>wuesthoffi</i> Rosskothén, 1934	LC	100	<1960																
			≥1960	V	U			EH	ES	LK	EP	PH							
<i>spencei</i> (Allibert, 1844)	RE	100*	<1960	V	U														
			≥1960																
<i>fuscum</i> (Erichson, 1845)	LC	20	<1960			U			EH										
			≥1960	A	V	U		St	EH	ES		EP	PH		PK			OP	PeP
<i>sahlbergi</i> (Flach, 1888)	LC	4	<1960	A	V	U		St	EH	ES		EP	PH	PS		KP			Ks
			≥1960	V	U		St	EH		LK	EP	PH		PK		Kn			Ks

Baranowskiella

ehnstromi Sörensson, 1997	LC	60	<1960																			
			≥1960	V	U																	

Ptinella

limbata (Heer, 1841)	LC	6	<1960		V	U	St	EH	ES													
			≥1960	A	V	U	EK	St	EH	ES	LK		PH	PS	PK	Kn	PeP	Ks	KiL			
denticollis (Fairmaire, 1858)	NE	100*	<1960		V	U						EP					OP					
			≥1960																			
johnsoni Rutanen, 1985	LC	20	<1960																			
			≥1960			U	EK	St	EH	ES			PH	PK	Kn	PeP	Ks					
aptera (Guérin-Ménéville, 1839)	LC	20	<1960		V	U	St	EH	ES													
			≥1960	A	V	U	St	EH	ES	LK			PH	PS								
tenella (Erichson, 1845)	LC	20	<1960		V	U	St	EH	ES													
			≥1960	A	V	U	EK	EH	ES	LK			PS	PK	Kn	PeP	Ks	KiL	SoL			
microscopica (Gillmeister, 1845)	LC	40	<1960																			
			≥1960		U			ES					PS	PK			Ks					

Pteryx

suturalis (Heer, 1841)	LC	2	<1960	A	V	U	St	EH	ES			PH	PK	KP	Kn	OP	Ks	KiL			InL	
			≥1960	A	V	U	EK	St	EH	ES	LK	EP	PH	PS	PK	KP	Kn	OP	PeP	Ks	KiL	SoL
splendens Strand, 1960	LC	20	<1960				EH					PH										
			≥1960		V	U	St	EH	ES				PH	PS	PK							

Nephanes

titan (Newman, 1834)	LC	20	<1960		V	U		EH	ES	LK												
			≥1960		V	U	St	EH	ES	EP	PH	PK	KP									

Smicrus

filicornis (Fairm. & Lab., 1855)	LC	10	<1960				EH															
			≥1960		V	U		EH	ES	LK			PH	PS	PK			PeP				

Baeocrara

variola (Mulsant & Rey, 1861)	LC	4	<1960		V	U		EH														
			≥1960	A	V	U	EK	St	EH	ES	LK		PH	PS	PK	KP	Kn	OP	PeP	Ks		
japonica (Matthews, 1884)	LC	10	<1960																			
			≥1960	A	V	U	EK	St	EH	ES	LK		PH		KP			PeP	Ks			

Acrotrichis

grandicollis (Mannerheim, 1844)	LC	1	<1960	A	V	U	EK	St	EH	ES	LK	EP	PH	PS	PK	KP		OP	PeP	Ks	KiL	SoL	InL
			≥1960	A	V	U	EK	St	EH	ES	LK	EP	PH	PS	PK	KP	Kn	OP	PeP	Ks	KiL	SoL	InL
montandonii (Allibert, 1844)	LC	2	<1960	A	V	U		St	EH	ES		EP	PH	PS	PK	KP	Kn	OP	PeP				
			≥1960	A	V	U	EK	St	EH	ES	LK	EP	PH	PS	PK	KP		OP	PeP	Ks			InL
cephalotes (Allibert, 1844)	LC	80	<1960		V	U		EH	ES														
			≥1960		V	U																	
thoracica (Waltl, 1838)	LC	10	<1960	A	V	U		St	EH	ES			PH	PS	PK								
			≥1960		V	U	EK	St	EH	ES	EP	PH	PS	PK	Kn			Ks					
sericans (Heer, 1841)	LC	6	<1960	A	V	U		St	EH	ES	LK	EP	PH	PS	PK	KP		PeP	KiL	SoL	InL		
			≥1960	A	V	U	EK	St	EH	ES	LK	EP	PH	PS	PK	KP	Kn	OP	PeP	Ks	KiL		
dispar (Matthews, 1865)	LC	6	<1960		V	U		EH	ES				PH	PS					Ks				
			≥1960	A	V	U	EK	EH	ES	LK			PH	PS	PK	KP	Kn	OP	PeP	Ks			
nana Strand, 1946	NA	100	<1960																				
			≥1960		U			ES															
brevipennis (Erichson, 1845)	LC	30	<1960	A	V	U		EH	ES					KP	OP								
			≥1960	A	V	U	EK	EH	ES	LK			PH	PS									
pumila (Erichson, 1845)	LC	20	<1960	A	V	U		EH	ES				PS										
			≥1960		V	U		EH	ES	EP							OP	PeP					
silvatica Rosskothen, 1935	LC	1	<1960		V	U		St	EH	ES			PH	PS	PK	KP			Ks			InL	
			≥1960		V	U	EK	St	EH	ES	LK	EP	PH	PS	PK	KP	Kn	OP	PeP	Ks	KiL	SoL	EnL
parva Rosskothen, 1935	LC	2	<1960			U		EH	ES													EnL	InL
			≥1960	A	V	U		St	EH	ES			PH	PS	PK	KP	Kn		PeP	Ks	KiL	SoL	EnL
volans (Motschulsky, 1845)	LC	15	<1960										PS			Kn	OP	PeP	KiL				
			≥1960		V	U		EH	ES				PK	Kn		PeP	Ks	KiL	SoL	InL			

<i>cognata</i> (Matthews, 1877)	LC	1	<1960	U																			
			≥1960	A V U EK St EH ES EP PH PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL																			
<i>insularis</i> (Mäklin, 1852)	LC	2	<1960																				
			≥1960	A V U EK St EH ES EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks																			
<i>norvegica</i> Strand, 1941	LC	30	<1960	V U		ES			PS PK														
			≥1960	V U EK ES LK PH KP OP PeP																			
<i>intermedia</i> (Gillmeister, 1845)	LC	1	<1960	A V U	St EH ES		EP PH PS PK KP Kn	OP PeP															
			≥1960	A V U EK St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL																			
<i>rosskotheni</i> Sundt, 1971	LC	60	<1960																				
			≥1960	A V U																			
<i>atomaria</i> (DeGeer, 1774)	LC	20	<1960	A V U		EH ES		PS PK															
			≥1960	A V U EK St EH EP KP																			
<i>lucidula</i> Rosskothen, 1935	EN	100	<1960																				
			≥1960	EH ES																			
<i>sitkaensis</i> (Motschulsky, 1845)	LC	6	<1960	A V U	St EH ES			PS PK		OP													
			≥1960	A V U EK St EH ES LK EP PH PK KP OP																			
<i>sjobergi</i> Sundt, 1958	NT	80	<1960																				
			≥1960	Kn OP																			
<i>fascicularis</i> (Herbst, 1793)	LC	2	<1960	A V U	St EH ES LK		PH PS PK KP														EnL	InL	
			≥1960	A V U EK St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks																			
<i>rugulosa</i> Rosskothen, 1935	LC	1	<1960	V U	St EH ES		EP PH PS PK	Kn	PeP Ks KiL				EnL	InL									
			≥1960	A V U EK St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL																			
<i>strandii</i> Sundt, 1958	LC	30	<1960																				
			≥1960	A V U EK EH ES EP OP PeP KiL																			
<u>Agyrtidae</u>																							
<u>Pteroloma</u>																							
<i>forsstromii</i> (Gyllenhal, 1810)	LC	6	<1960	U		EH		PH PS	KP Kn	PeP Ks KiL SoL EnL InL													
			≥1960	V U St EH EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL																			
<u>Ecanus</u>																							
<i>glaber</i> (Fabricius, 1787)	DD	100	<1960	V							OP PeP	KiL											
			≥1960	PeP																			
<u>Leioididae</u>																							
<u>Triarthron</u>																							
<i>maerkelii</i> Märkel, 1840	LC	15	<1960	V U		EH ES		PS															
			≥1960	V U St EH ES EP PH PS PK KP Kn OP PeP																			
<u>Sogda</u>																							
<i>suturalis</i> (Zetterstedt, 1828)	LC	30	<1960			ES		EP		KP										EnL	InL		
			≥1960	V U EK EH EP PH PS PK Ks KiL EnL InL																			
<i>ciliaris</i> (Thomson, 1874)	LC	10	<1960	V U		EH ES		EP PH PS	KP Kn	OP PeP													
			≥1960	V U EK St EH ES PK KP Kn OP Ks KiL SoL EnL InL																			
<u>Hydnobius</u>																							
<i>septentrionalis</i> Thomson, 1874	LC	20	<1960								OP PeP	KiL SoL		InL									
			≥1960	Kn OP PeP Ks KiL EnL InL																			
<i>latifrons</i> (Curtis, 1840)	LC	60	<1960				LK					Ks											
			≥1960	V U EK St Ks InL																			
<i>tibialis</i> J.Sahlberg, 1903	NT	100	<1960																				
			≥1960	Ks InL																			
<i>spinipes</i> (Gyllenhal, 1813)	LC	4	<1960	V U	St EH ES LK EP		PS PK KP		OP PeP Ks KiL				InL										
			≥1960	V U EK St EH ES LK EP PH PS PK KP OP PeP Ks KiL SoL EnL InL																			
<i>edentatus</i> (Sahlberg, 1833)	RE	100*	<1960			St																	
			≥1960																				
<u>Leiodes</u>																							
<i>punctulata</i> (Gyllenhal, 1810)	LC	10	<1960	V U		ES																InL	
			≥1960	V U EK St EH PH PS PK KP OP PeP Ks KiL SoL EnL InL																			
<i>inordinata</i> (J.Sahlberg, 1898)	LC	15	<1960						PS														
			≥1960	V U EH ES PH PS Kn OP PeP Ks KiL SoL InL																			

Colon

latum Kraatz, 1850	LC	6	<1960	V	U		EH	ES	EP		PK											
				≥1960	A	V	U	EK	St	EH	ES	LK	EP	PS	PK	Kn	OP	Ks	KiL	SoL		
pseudolatum Palm, 1941	LC	30	<1960		U										Ks	KiL						
				≥1960						LK			PK	Kn	OP	Ks	KiL	SoL				
rufescens Kraatz, 1850	NE	100*	<1960	V			EH															
				≥1960																		
arcticum Munster, 1911	LC	100	<1960													KiL		EnL	InL			
				≥1960													Ks		SoL	EnL	InL	
brundini Palm, 1941	NT	80	<1960																			
				≥1960													Ks					
curvipes Mäklin, 1881	NT	100	<1960																			
				≥1960													Ks					
angulare Erichson, 1837	LC	40	<1960	V	U		EH	ES	LK													
				≥1960	V	U	EK	EH	ES	LK			PK	Kn			Ks	KiL				
dentipes (Sahlberg, 1822)	LC	40	<1960	V	U	St	EH															
				≥1960			EK	EH							OP	Ks					InL	
barnevillei Kraatz, 1858	LC	60	<1960	A	V	U	EH	ES														
				≥1960		U		EH					KP			Ks						
brunneum (Latreille, 1807)	LC	10	<1960	V	U		EH	ES	LK		PS	KP							EnL			
				≥1960	V	U	EK	EH	ES			PH	PK	KP	Kn		Ks					
appendiculatum (Sahlberg, 1822)	LC	6	<1960	A	V	U	St	EH	LK	PH	PS						KiL		EnL	InL		
				≥1960	V	U	EK	St	EH	ES			PS	PK	Kn	OP	PeP	Ks	KiL	SoL	EnL	InL
serripes (Sahlberg, 1822)	LC	10	<1960	A	V	U	St		LK						OP	PeP			EnL			
				≥1960	V	U	EK	St	EH	ES			PH	PS	PK	KP	Kn	OP	PeP	Ks	KiL	SoL
puncticolle Kraatz, 1850	NT	100	<1960													Ks						
				≥1960					ES								Ks		SoL	InL		
viennense Herbst, 1797	LC	30	<1960	A	V	U	St	EH	LK	PH	PS	PK										
				≥1960	A	U	EK	EH			PH	PS	PK				Ks					
bidentatum (Sahlberg, 1822)	LC	10	<1960	V	U	St	EH	ES	LK	EP	PH	PS		Kn	PeP	KiL			InL			
				≥1960	V	U	EK				EP	PH	PK	KP	Kn	OP	PeP	Ks	KiL	SoL	InL	
Ptomaphagus																						
subvillosus (Goeze, 1777)	LC	10	<1960	A	V	U		EH			PH											
				≥1960	A	V	U	EK	EH	ES	LK	PH	PK	KP								
sericatus (Chaudoir, 1845)	LC	20	<1960																			
				≥1960	V	U	EK	EH	ES	LK												
Nemadus																						
colonoides (Kraatz, 1851)	LC	20	<1960	A	V	U		EH			PH											
				≥1960	A	V	U		EH	ES		PH	PS	PK	Kn	OP						
Eocatops																						
pelopsis (Reitter, 1884)	NE	100*	<1960																			
				≥1960														Ks				
Nargus																						
velox (Spence, 1813)	LC	20	<1960				EH	ES		PH	PS	PK										
				≥1960		U	EK	EH	ES	LK	PH	PS	PK									
Choleva																						
lederiana Reitter, 1902	LC	4	<1960	V			EH			PH	PK	KP	Kn			KiL						
				≥1960	V	U	EK	St	EH		EP	PH	PS	PK	KP	Kn	OP	PeP	Ks	KiL		EnL
oblonga Latreille, 1807	LC	30	<1960				ES															
				≥1960		U	EK	EH	ES	LK			PK									
glauca Britten, 1918	LC	6	<1960		U		EH															
				≥1960	V	U	EK	St	EH	ES	LK	EP	PS	PK	KP	Kn	OP	Ks				
angustata (Fabricius, 1781)	LC	80	<1960		U		EH			PH												
				≥1960	V	U		EH	ES													
sturmii Bris. de Barn., 1863	LC	20	<1960		U		EH			PH	PS	PK										
				≥1960	V	U	EK	St	EH	ES		PH	PS	PK	KP	Kn						

fagniezi Jeannel, 1922	LC	80	<1960																					
			≥1960	A V U	St	EH																		
spinipennis Reitter, 1890	LC	60	<1960		U			ES																
			≥1960			EK	EH	ES	LK			PK												
elongata (Paykull, 1798)	VU	100	<1960					ES																
			≥1960					ES																
Dreposcia																								
brevipalpis (Reitter, 1901)	NT	100*	<1960																					
			≥1960																	InL				
Sciodrepoides																								
watsoni (Spence, 1813)	LC	2	<1960	A V U		St	EH	ES	LK	EP	PH	PS	PK	KP	Kn	OP	PeP	Ks	KiL	SoL				
			≥1960	A V U EK St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL																				
fumatus (Spence, 1813)	LC	2	<1960	A V U		St	EH	ES			PH	PK				PeP								
			≥1960	A V U EK St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks																SoL				
alpestris Jeannel, 1934	LC	6	<1960		U																			
			≥1960		U EK St EH ES						EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL													
Catops																								
subfuscus Kellner, 1846	LC	20	<1960		V	U		St	EH	ES		EP		PS		KP			PeP		KiL			
			≥1960		V U			EH ES	LK EP PH PS PK		Kn													
alpinus Gyllenhal, 1827	LC	4	<1960		V			St	EH				PH	PK	KP		OP	PeP	Ks	KiL		EnL	InL	
			≥1960		V U EK			EH ES				PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL		EnL	InL									
luteipes Thomson, 1884	LC	60	<1960																	KiL		EnL		
			≥1960																			SoL	EnL	InL
longulus Kellner, 1846	LC	60	<1960																					
			≥1960		U			EH								Kn								
coracinus Kellner, 1846	LC	2	<1960		V	U			EH	ES			PH	PS		KP	Kn		PeP	Ks	KiL	SoL	EnL	InL
			≥1960		V U EK St EH ES EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL																			
tristis (Panzer, 1794)	LC	2	<1960		V	U			EH	ES					KP	Kn	OP	PeP	Ks	KiL	SoL		InL	
			≥1960		V U EK St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL																			
morio (Fabricius, 1787)	LC	6	<1960	A V U		St	EH	ES		EP	PH	PS	PK	KP	Kn	OP	PeP	Ks	KiL	SoL	EnL	InL		
			≥1960	A V U EK St EH ES EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL																				
nigriclavus Gerhardt, 1900	LC	2	<1960		V	U			ES															
			≥1960		V U		St EH ES LK											PeP						
fuscus (Panzer, 1794)	VU	30	<1960		V	U		St	EH			EP	PH		PK	KP	Kn			Ks				
			≥1960		V			EH ES				EP												
fuliginosus Erichson, 1837	NT	60	<1960	A																				
			≥1960	A																				
borealis Krogerus, 1931	RE	80	<1960		V	U			EH	ES														
			≥1960					EH ES																
nigricans (Spence, 1813)	LC	4	<1960		V	U			EH			EP	PH		KP		PeP							
			≥1960	A V U EK St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL																				
Apocatops																								
nigrita (Erichson, 1837)	LC	2	<1960	A V U EK St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn													Ks	KiL	SoL	EnL	InL			
			≥1960	A V U EK St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL																				
Fissocatops																								
westi (Krogerus, 1931)	LC	60	<1960		V				EH															
			≥1960		V U			EH																
Scydmaenidae																								
Eutheia																								
linearis Mulsant & Rey, 1861	LC	10	<1960	A V U				EH		LK		PH		PK				PeP						
			≥1960	A V U EK St EH ES LK PH PS PK KP Kn OP																		SoL		
scydmaenoides Stephens, 1830	LC	6	<1960		V	U		St	EH	ES	LK	EP	PH	PS			OP							
			≥1960	A V U EK St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP														Ks	KiL					
Veraphis																								
engelmarki Franz, 1971	DD	100	<1960																					
			≥1960																	PeP Ks KiL SoL				

Nevraphes

angulatus (Müller & Kunze, 1822)	LC	10	<1960	A	V	U		St	EH	ES	LK	EP	PH							OP							
			≥1960	A	V	U	EK	St	EH	ES	LK							PS	PK	KP							
perssoni Franz, 1975	DD	100	<1960																								
			≥1960																				Ks				
talparum Lokay, 1920	LC	60	<1960		V	U			EH																		
			≥1960		V	U			EH																		
plicicollis Reitter, 1880	LC	20	<1960		V	U																					
			≥1960		V	U	EK		EH	ES							PS	PK									
coronatus J.Sahlberg, 1881	LC	6	<1960					EH				PH	PS	PK	KP		OP		Ks	KiL					InL		
			≥1960		V	U		St	EH				EP	PH	PS	PK	KP	Kn	OP	PeP	Ks	KiL	SoL	EnL	InL		

Scydmorephes

sparshalli (Denny, 1825)	DD	100	<1960		V																				
			≥1960			U			EH																
helvolus (Schaum, 1844)	NT	100	<1960		V	U																			
			≥1960		V	U				ES					PK										
minutus (Chaudoir, 1845)	LC	10	<1960	A	V	U		EH	ES			PH	PS												
			≥1960	A	V	U	EK	St	EH	ES				PH	PS	PK		Kn	OP	PeP	Ks				

Stenichnus

scutellaris (Müller & Kunze, 1822)	LC	30	<1960	A	V																				
			≥1960	A	V	U	EK	St	EH													Ks			
collaris (Müller & Kunze, 1822)	LC	2	<1960	A	V	U	EK	St	EH	ES	LK	EP	PH	PS	PK	KP		OP							
			≥1960	A	V	U	EK	St	EH	ES	LK	EP	PH	PS	PK	KP	Kn	OP	PeP	Ks					
bicolor (Denny, 1825)	LC	2	<1960	A	V	U		St	EH	ES	LK		PH		PK	KP		OP	PeP	Ks	KiL				InL
			≥1960	A	V	U	EK	St	EH	ES	LK	EP	PH	PS	PK	KP	Kn	OP	PeP	Ks	KiL	SoL	EnL	InL	

Microscydmus

nanus (Schaum, 1844)	LC	6	<1960		V	U		St	EH	ES			PH			KP								
			≥1960	A	V	U	EK	St	EH	ES	LK	EP	PH	PS	PK	KP	Kn							SoL
minimus (Chaudoir, 1845)	LC	6	<1960			U			EH															
			≥1960	A	V	U	EK	St	EH	ES	LK	EP	PH	PS	PK		Kn	OP	PeP	Ks				

Euconnus

claviger (Müller & Kunze, 1822)	LC	30	<1960		V	U																		
			≥1960	A	V	U	EK		EH	ES	LK				PS	PK		Kn	OP	PeP				
pragensis (Machulka, 1923)	NT	60	<1960		V	U		St	EH															
			≥1960		V	U	EK		EH													Ks		
maklinii (Mannerheim, 1844)	LC	30	<1960	A	V	U		St	EH	ES														
			≥1960	A	V	U	EK	St	EH	ES				PH	PS	PK		Kn	OP					
wetterhallii (Gyllenhal, 1813)	NT	80	<1960		V	U		St																
			≥1960			U	EK	St	EH					PH										
rutilipennis (Müller & Kun., 1822)	RE	100*	<1960						EH															
			≥1960																					
hirticollis (Illiger, 1798)	LC	10	<1960	A	V	U		St	EH	ES			PH	PS		KP		OP						
			≥1960	A	V	U	EK	St	EH		LK		PH						OP					
fimetarius (Chaudoir, 1845)	NT	60	<1960	A	V	U																		
			≥1960	A	V	U	EK	St	EH	ES														

Scydmaenus

tarsatus Müller & Kunze, 1822	LC	10	<1960	A	V	U		St	EH	ES	LK	EP	PH	PS	PK									
			≥1960	A	V	U	EK	St	EH	ES	LK		PH	PS	PK		Kn							
rufus Müller & Kunze, 1822	VU	100	<1960	A	V	U				ES					KP		OP							
			≥1960		V	U																		
hellwigii (Herbst, 1792)	LC	15	<1960	A	V	U		St	EH	ES														
			≥1960	A	V	U	EK	St	EH	ES					PS	PK		Kn	OP	PeP	Ks			

Silphidae

Necrodes

littoralis (Linnaeus, 1758)	LC	10	<1960	A	V	U	EK	St	EH	ES	LK	EP	PH	PS	PK	KP	Kn				Ks				
			≥1960		V	U	EK	St	EH	ES	LK	EP	PH	PS	PK	KP	Kn	OP	PeP	Ks	KiL				

Thanatophilus

<i>lapponicus</i> (Herbst, 1793)	LC	20	<1960															PeP	KiL	SoL	EnL	InL	
			≥1960																				SoL
<i>rugosus</i> (Linnaeus, 1758)	LC	4	<1960	A	V	U	EK	St	EH	ES		EP	PH	PS	PK	Kn	OP	PeP	Ks	KiL	SoL	EnL	InL
			≥1960	A	V	U	EK	St	EH	ES	LK	EP	PH	PS	PK		Kn	OP	PeP		KiL	SoL	EnL
<i>sinuatus</i> (Fabricius, 1775)	NT	20	<1960	A	V	U		St	EH	ES			PH	PS	PK				Ks				InL
			≥1960	A	V	U	EK	St	EH	ES					PK								
<i>dispar</i> (Herbst, 1793)	LC	40	<1960	A		U		St			LK	EP			PK	Kn		OP	PeP	Ks	KiL	SoL	InL
			≥1960	V	U										PK	Kn	OP	PeP			SoL		

Oiceoptoma

<i>thoracicum</i> (Linnaeus, 1758)	LC	2	<1960	A	V	U	EK	St	EH	ES	LK	EP	PH	PS	PK	Kn	OP	PeP	Ks		SoL		
			≥1960	A	V	U	EK	St	EH	ES	LK	EP	PH	PS	PK	Kn	OP	PeP	Ks		KiL	SoL	

Aclypea

<i>opaca</i> (Linnaeus, 1758)	NT	20	<1960	A	V	U	EK	St	EH	ES		EP	PH	PS	PK	Kn	OP	PeP	Ks	KiL	SoL		InL	
			≥1960	A	V	U	EK		EH	ES	LK	EP	PH		PK	Kn	OP				KiL	SoL		
<i>undata</i> (Müller, 1776)	RE	100*	<1960		V	U			EH	ES	LK		PH	PS	PK									
			≥1960										PH											

Dendroxena

<i>quadrimaculata</i> (Scopoli, 1772)	RE	100*	<1960		V																			
			≥1960	V																				

Silpha

<i>carinata</i> Herbst, 1783	LC	4	<1960	A	V	U	EK	St	EH	ES		EP	PH	PS	PK	Kn								
			≥1960	A	V	U	EK	St	EH	ES	LK		PH		PK	Kn								
<i>obscura</i> Linnaeus, 1758	EN	100	<1960		V	U			EH	ES	LK		PH	PS	PK			OP	Ks					
			≥1960						EH	ES			PS											
<i>tristis</i> Illiger, 1798	LC	15	<1960	A		U				ES	LK				PK									
			≥1960	A		U	EK		EH	ES	LK		PH		PK									

Phosphuga

<i>atrata</i> (Linnaeus, 1758)	LC	2	<1960	A	V	U	EK	St	EH	ES		EP	PH	PS	PK	Kn	OP	PeP	Ks		SoL		InL
			≥1960	A	V	U	EK	St	EH	ES	LK	EP	PH	PS	PK	Kn	OP	PeP	Ks		KiL	SoL	

Nicrophorus

<i>humator</i> (Gleditsch, 1767)	NA	80	<1960																					
			≥1960	V	U																			
<i>investigator</i> Zetterstedt, 1824	LC	4	<1960	A	V	U	EK	St	EH	ES	LK		PH	PS	PK		Kn	OP	PeP		KiL	SoL	InL	
			≥1960	A	V	U	EK	St	EH	ES	LK	EP	PH	PS	PK	Kn	OP	PeP						
<i>vespilloides</i> Herbst, 1783	LC	1	<1960	A	V	U	EK	St	EH	ES	LK	EP	PH	PS	PK	Kn	OP	PeP	Ks	KiL	SoL	EnL	InL	
			≥1960	A	V	U	EK	St	EH	ES	LK	EP	PH	PS	PK	Kn	OP	PeP	Ks	KiL	SoL	EnL	InL	
<i>vespillo</i> (Linnaeus, 1758)	LC	10	<1960	A	V	U	EK	St	EH	ES	LK	EP	PH	PS	PK	Kn	OP							
			≥1960	A	V	U	EK	St	EH	ES	LK	EP	PH	PS	PK	Kn	OP	PeP						

Staphylinidae

Eusphalerum

<i>minutum</i> (Fabricius, 1792)	LC	1	<1960	A	V	U		St	EH	ES	LK	EP	PH	PS	PK	Kn	OP	PeP	Ks	KiL	SoL	EnL	InL
			≥1960	A	V	U	EK	St	EH	ES	LK	EP	PH	PS	PK	Kn	OP	PeP	Ks	KiL	SoL	EnL	InL
<i>sorbicola</i> (Y.Kangas, 1941)	LC	10	<1960														PeP	Ks				EnL	InL
			≥1960	V	U			EH				PH			PK	Kn	OP		Ks	KiL		EnL	InL
<i>lapponicum</i> (Mannerheim, 1830)	LC	10	<1960		V				EH	ES	LK			PS	PK	Kn		PeP	Ks	KiL	SoL	EnL	InL
			≥1960		U			EH	ES				PS	PK	Kn	OP		Ks	KiL	SoL	EnL	InL	
<i>luteum</i> (Marsham, 1802)	LC	30	<1960	A		U			EH				PS	PK									
			≥1960	V	U	EK		EH	ES	LK		PH	PS	PK									
<i>sorbi</i> (Gyllenhal, 1810)	NE	100*	<1960																				
			≥1960																				

Acrulia

<i>inflata</i> (Gyllenhal, 1813)	LC	2	<1960	A	V	U		St	EH	ES			PH	PS	PK			OP	PeP	Ks	KiL		EnL	
			≥1960	A	V	U	EK	St	EH	ES	LK	EP	PH	PS	PK	Kn	OP	PeP	Ks	KiL	SoL	EnL	InL	

Pycnolypta

<i>lurida</i> (Gyllenhal, 1813)	LC	2	<1960	A	V	U		St	EH	ES		EP	PH	PS	PK	Kn	OP	PeP	Ks	KiL	SoL	EnL	InL
			≥1960	A	V	U	EK	St	EH		LK	EP	PH	PS		Kn	OP	PeP	Ks	KiL	SoL		InL

Acrolocha

<i>minuta</i> (Olivier, 1795)	NA	100	<1960	A	V	U																	
			≥1960																				
<i>pliginskii</i> Bernhauer, 1912	VU	60	<1960	A	V	U													Ks				
			≥1960	A	U			EH															
<i>sulcula</i> (Stephens, 1834)	EN	60	<1960	A	V	U																	
			≥1960	A	V			EH															

Phyllodrepa

<i>melanocephala</i> (Fabricius, 1787)	LC	4	<1960	A	V	U			EH			EP	PH	PS	PK									
			≥1960	A	V	U	EK	St	EH	ES	LK		PH	PS	PK	Kn	OP	PeP	Ks	KiL				
<i>salicis</i> (Gyllenhal, 1810)	NE	100	<1960					EH	ES															
			≥1960																					
<i>nigra</i> (Gravenhorst, 1806)	LC	4	<1960	A	V	U		St	EH	ES	LK	EP	PH	PS	PK		Kn		PeP					
			≥1960	A	V	U	EK	St	EH	ES	LK	EP	PH	PS	PK	Kn	OP	PeP	Ks					
<i>puberula</i> Bernhauer, 1903	NT	80	<1960			U						EP												
			≥1960			U						EP	PH			Kn								
<i>floralis</i> (Paykull, 1789)	LC	30	<1960	A	V	U		St	EH	ES			PH	PS	PK	Kn		PeP			SoL	EnL	InL	
			≥1960	A	V	U	EK	St	EH	ES	LK					Kn								
<i>melis</i> Hansen, 1940	NA	100*	<1960			V																		
			≥1960																					
<i>sahlbergi</i> Luze, 1906	LC	20	<1960																					
			≥1960									EP						OP	PeP	Ks	KiL	SoL	EnL	InL
<i>linearis</i> (Zetterstedt, 1828)	LC	4	<1960		V			EH	ES				PH					PeP	Ks	KiL				
			≥1960	A	V	U		St	EH	ES	LK	EP	PH	PS	PK	Kn	OP	PeP	Ks	KiL	SoL		InL	
<i>clavigera</i> Luze, 1906	LC	20	<1960					EH		LK			PS					PeP	Ks					
			≥1960					St	EH	ES			PH	PS	PK	Kn	OP	PeP	Ks		SoL			
<i>ioptera</i> (Stephens, 1834)	LC	20	<1960	A	V	U		St	EH	ES														
			≥1960	A	V	U		St	EH	ES						Kn								
<i>vilis</i> (Erichson, 1840)	NA	100	<1960																					
			≥1960	A																				

Hapalareae

<i>pygmaea</i> (Paykull, 1800)	VU	100	<1960	A	V	U																	
			≥1960			U																	

Omalium

<i>riparium</i> Thomson, 1857	NT	60	<1960	A	V	U																	
			≥1960	A	V	U																	
<i>rivulare</i> (Paykull, 1789)	LC	1	<1960	A	V	U		St	EH	ES		EP	PH	PS	PK	Kn	OP	PeP	Ks	KiL	SoL	EnL	InL
			≥1960	A	V	U	EK	St	EH	ES	LK	EP	PH	PS	PK	Kn	OP	PeP	Ks	KiL	SoL	EnL	InL
<i>septentrionis</i> Thomson, 1857	LC	1	<1960	A	V	U		St	EH	ES		EP	PH	PS	PK	Kn	OP	PeP	Ks	KiL	SoL	EnL	InL
			≥1960	A	V	U	EK	St	EH	ES		EP	PH	PS	PK	Kn	OP	PeP	Ks	KiL	SoL	EnL	InL
<i>oxyacanthae</i> Gravenhorst, 1806	NA	100	<1960																				
			≥1960			U																	
<i>strigicolle</i> Wankowicz, 1869	LC	2	<1960		V	U		EH					PS	PK	Kn	OP	PeP	Ks	KiL	SoL	EnL	InL	
			≥1960		V	U		EH	ES				PH	PS	PK	Kn	OP	PeP	Ks	KiL	SoL	EnL	InL
<i>laticolle</i> Kraatz, 1858	LC	40	<1960		V	U			ES	LK			PS	PK									
			≥1960		V	U	EK	EH	ES				PH			Kn							
<i>exiguum</i> Gyllenhal, 1810	NT	60	<1960	A	V	U		EH	ES						Kn								
			≥1960	V	EK	St						EP	PH				OP						
<i>littorale</i> Kraatz, 1857	NT	60	<1960			U																	
			≥1960	A	V	U									Kn		OP						
<i>caesum</i> Gravenhorst, 1806	LC	2	<1960	A	V	U	EK	St	EH	ES	LK	EP	PH	PS	PK	Kn							
			≥1960	A	V	U	EK	St	EH	ES	LK	EP	PH	PS	PK	Kn	OP	PeP	Ks	KiL	SoL	EnL	InL
<i>rugatum</i> Mulsant & Rey, 1880	LC	4	<1960		V	U			ES	LK			PS										
			≥1960	A	V	U	EK	St	EH	ES		EP	PH	PS	PK	Kn	OP	PeP	Ks	KiL	SoL		

rotundicolle (Sahlberg, 1830)	LC	4	<1960	V	U			EH	ES			PH	PS	PK	KP	Kn		PeP	Ks	KiL		EnL	InL	
			≥1960	V	U	EK	St	EH		LK	EP		PS	PK	KP	Kn	OP		Ks	KiL	SoL	EnL	InL	
Arpedium																								
quadrum (Gravenhorst, 1806)	LC	2	<1960	A	V	U	EK		EH	ES		EP	PH	PS	PK	KP	Kn	OP	PeP		KiL	SoL	EnL	InL
			≥1960	V	U	EK	St	EH	ES	LK	EP	PH	PS	PK	KP	Kn	OP	PeP	Ks	KiL	SoL	EnL	InL	
Eucnecosum																								
puncticolle (J.Sahlberg, 1880)	NT	100*	<1960																					
			≥1960																				InL	
brachypterum (Gravenhorst, 1802)	LC	1	<1960	V	U		St	EH	ES	LK	EP	PH	PS	PK	KP	Kn	OP	PeP	Ks	KiL	SoL	EnL	InL	
			≥1960	A	V	U	EK	St	EH	ES	LK	EP	PH	PS	PK	KP	Kn	OP	PeP	Ks	KiL	SoL	EnL	InL
tenuis (LeConte, 1863)	LC	15	<1960					EH								Kn			Ks	KiL	SoL	EnL	InL	
			≥1960													Kn			Ks	KiL	SoL	EnL	InL	
brunnescens (J.Sahlberg, 1871)	LC	6	<1960					EH				PH		PK	KP	Kn		PeP	Ks	KiL	SoL	EnL	InL	
			≥1960					EH					PS	PK		Kn		PeP	Ks	KiL	SoL	EnL	InL	
Acidota																								
crenata (Fabricius, 1793)	LC	1	<1960	A	V	U		St	EH	ES	LK	EP	PH	PS	PK	KP	Kn	OP	PeP	Ks	KiL	SoL	EnL	InL
			≥1960	A	V	U	EK	St	EH	ES	LK	EP	PH	PS	PK	KP	Kn	OP	PeP	Ks	KiL	SoL	EnL	InL
cruentata Mannerheim, 1830	LC	10	<1960	V	U																			
			≥1960	V	U	EK		EH	ES	LK			PS	PK	KP	Kn								
quadrata (Zetterstedt, 1838)	LC	6	<1960												KP				Ks	KiL	SoL	EnL	InL	
			≥1960					EH						PK	KP	Kn			Ks	KiL	SoL	EnL	InL	
Lesteva																								
punctata Erichson, 1839	CR	100	<1960																					
			≥1960					EH																
longoelytrata (Goeze, 1777)	LC	15	<1960	A	V	U		EH																
			≥1960	A	V	U	EK	EH	ES			PH	PS											
monticola Kiesenwetter, 1847	NT	100	<1960																		SoL		InL	
			≥1960																		KiL		InL	
pubescens Mannerheim, 1830	NT	80	<1960																					
			≥1960																		KiL		InL	
Geodromicus																								
plagiatus (Fabricius, 1798)	LC	2	<1960	A	V	U		St	EH	ES	LK		PH	PS	PK	KP	Kn	OP	PeP	Ks	KiL	SoL	EnL	InL
			≥1960	A	V	U	EK	St	EH	ES		EP	PH	PS	PK	KP	Kn	OP	PeP	Ks	KiL	SoL	EnL	InL
longipes (Mannerheim, 1830)	LC	20	<1960																			EnL	InL	
			≥1960																		KiL	SoL	EnL	InL
Anthophagus																								
alpinus (Paykull, 1790)	LC	10	<1960																	Ks	KiL	SoL	EnL	InL
			≥1960																		KiL	SoL	EnL	InL
angusticollis (Mannerheim, 1830)	LC	30	<1960		U		St		ES	LK														
			≥1960			EK			ES	LK				PK	Kn									
omalinus Zetterstedt, 1828	LC	1	<1960	V	U		St	EH	ES		EP	PH	PS	PK	KP	Kn	OP	PeP	Ks	KiL	SoL	EnL	InL	
			≥1960	V	U	EK	St	EH	ES	LK	EP	PH	PS	PK	KP	Kn	OP	PeP	Ks	KiL	SoL	EnL	InL	
caraboides (Linnaeus, 1758)	LC	1	<1960	A	V	U	EK	St	EH	ES	LK	EP	PH	PS	PK	KP	Kn	OP	PeP	Ks	KiL	SoL	InL	
			≥1960	A	V	U	EK	St	EH	ES	LK	EP	PH	PS	PK	KP	Kn	OP	PeP	Ks	KiL	SoL	EnL	InL
Coryphium																								
angusticolle Stephens, 1834	LC	4	<1960	V	U			EH	ES			PH			KP	Kn				KiL		EnL	InL	
			≥1960	A	V	U		St	EH	ES			PH	PS	PK	KP	Kn	OP	PeP	Ks	KiL	SoL	EnL	InL
Coryphiomorphus																								
hyperboreus (Mäklin, 1880)	NT	100	<1960																			EnL	InL	
			≥1960																			EnL		
Eudectus																								
giraudi Redtenbacher, 1857	LC	15	<1960													Kn		PeP	Ks	KiL		EnL	InL	
			≥1960					EH				PS	PK		Kn	OP	PeP	Ks	KiL	SoL		InL		
Boreaphilus																								
henningianus Sahlberg, 1832	LC	4	<1960	V	U			EH				PH			KP		OP	PeP	Ks	KiL	SoL	EnL	InL	
			≥1960	V	U	EK	St	EH			EP	PH			Kn	OP	PeP	Ks	KiL	SoL	EnL	InL		

<i>sinuata</i> (Aubé, 1833)	LC	60	<1960	A	U																			
<i>haematica</i> ssp. <i>sinuata</i> (Aubé, 1833)			≥ 1960	A	V	U			ES															
<i>helferi</i> (Schmidt-Goebel, 1836)	RE	100*	<1960	A																				
			≥ 1960																					
Fagniezia																								
<i>impressa</i> (Panzer, 1805)	LC	60	<1960	A	V	U																		
			≥ 1960	A	V	U			ES															
Pselaphaulax																								
<i>dresdensis</i> (Herbst, 1792)	LC	30	<1960		V	U	St	EH	ES	LK	EP	PH	PS	PK		Kn	OP	PeP	Ks	KiL				
			≥ 1960	A		U	EK	St	EH	ES	LK			PK			OP		Ks	KiL				
Pselaphus																								
<i>heisei</i> Herbst, 1792	LC	4	<1960	A	V	U	St	EH	ES	LK		PH		PK	KP	Kn	OP	PeP	Ks	KiL				
			≥ 1960	A	V	U	EK	St	EH	ES		EP	PH	PS	PK	KP	Kn	OP	PeP	Ks	KiL	SoL		
Tyrus																								
<i>mucronatus</i> (Panzer, 1803)	LC	6	<1960	A	V	U	St	EH	ES			PH	PS	PK	KP									
			≥ 1960	A	V	U	EK	St	EH	ES	LK	EP	PH	PS	PK		Kn	OP	PeP	Ks	KiL			
Claviger																								
<i>testaceus</i> Preyssl, 1790	VU	60	<1960		V	U		EH																
			≥ 1960	A	V	U																		
Phloeocharis																								
<i>subtilissima</i> Mannerheim, 1830	LC	6	<1960	A	V	U	St	EH	ES					PK										
			≥ 1960	A	V	U	EK	St	EH	ES		EP	PH	PS	PK		Kn		PeP					
Olisthaerus																								
<i>megacephalus</i> (Zetterstedt, 1828)	LC	15	<1960												Kn	OP	PeP	Ks	KiL		EnL	InL		
			≥ 1960													OP	PeP	Ks	KiL	SoL	EnL	InL		
<i>substriatus</i> (Paykull, 1790)	LC	10	<1960			St	EH				EP	PH	PS	PK	KP	Kn	OP	PeP	Ks	KiL	SoL	InL		
			≥ 1960			St	EH	ES			PH	PS	PK		Kn	OP	PeP	Ks	KiL	SoL	EnL	InL		
Mycetoporus																								
<i>debilis</i> Mäklin, 1847	LC	60	<1960		V	U		EH	ES															
			≥ 1960		V	U	EK		ES	LK		PS												
<i>tenuis</i> Mulsant & Rey, 1853	LC	15	<1960	A			EH	ES			PS					OP	PeP	Ks	KiL					
			≥ 1960		V	U		EH			PS	PK				OP	PeP	Ks	KiL	SoL	EnL	InL		
<i>altaicus</i> Luze, 1901	LC	15	<1960		V	U		EH					KP		OP									
			≥ 1960	A	V	U	EK	St	EH	ES	EP	PS	PK	KP		OP	PeP		KiL					
<i>monticola</i> Fowler, 1888	LC	15	<1960			U		EH	ES				PK		Kn	OP	PeP	Ks	KiL		EnL	InL		
			≥ 1960			U		EH					PK		Kn	OP	PeP	Ks	KiL	SoL	EnL	InL		
<i>erichsonanus</i> Fagel, 1965	LC	80	<1960																					
			≥ 1960																		EnL	InL		
<i>lepidus</i> (Gravenhorst, 1806)	LC	1	<1960	A	V	U	EK	St	EH	ES	LK	EP	PH	PS	PK	KP	Kn	OP	PeP	Ks	KiL	SoL	EnL	InL
			≥ 1960	A	V	U	EK	St	EH	ES	LK	EP	PH	PS	PK	KP	Kn	OP	PeP	Ks	KiL	SoL	EnL	InL
<i>longulus</i> Mannerheim, 1830	LC	10	<1960	A	V	U	EK	St	EH	ES	LK			PS		KP								
			≥ 1960	A	V	U	EK	St	EH	ES	LK	EP	PH		PK			OP						
<i>bimaculatus</i> Lacordaire, 1835	LC	40	<1960		V	U	St	EH	ES								OP							
			≥ 1960	A	V	U		EH	ES	LK														
<i>despectus</i> Strand, 1969	NT	80	<1960		V	U		EH		LK														
			≥ 1960			U	St																	
<i>glaber</i> (Sperk, 1835)	LC	60	<1960																					
			≥ 1960		V	U	EK		EH	ES	LK													
<i>inaris</i> Luze, 1901	LC	30	<1960			U		EH					PS				PeP							
			≥ 1960			U											OP	PeP	Ks	KiL		EnL	InL	
<i>montanus</i> Luze, 1901	LC	30	<1960		V									KP		OP	PeP		KiL		EnL			
			≥ 1960			U										Kn	OP	PeP	Ks	KiL	SoL	EnL	InL	
<i>forticornis</i> Fauvel, 1875	LC	40	<1960	A	V	U		EH	ES							Kn								
			≥ 1960	A	V	U	EK	St	EH	ES	LK		PH		PK		Kn		PeP					
<i>clavicornis</i> (Stephens, 1832)	LC	10	<1960		V	U		EH	ES										Ks		SoL			
			≥ 1960	A	V	U	EK	St	EH	ES	LK		PH	PS	PK	KP	Kn	OP	PeP	Ks	KiL	SoL	EnL	InL

<i>reichei</i> Pandellé, 1869		100	<1960	U																			
			≥1960	U		EH			PS														
<i>pachyraphis</i> Pandellé, 1869	LC	40	<1960	V		EH	ES		PS	PK			PeP		KiL						InL		
			≥1960	V	U	EH		EP							Ks	KiL	SoL						
<i>niger</i> Fairmaire & Laboulb., 1856	LC	10	<1960	V	U	St	EH	ES		PH	PS	PK	Kn		PeP	Ks	KiL						
			≥1960	V	U	St	EH		EP	PH	PS	PK	Kn	OP	PeP	Ks	KiL	SoL					
<i>boreellus</i> J.Sahlberg, 1876	LC	20	<1960				EH										KiL	SoL	EnL	InL			
			≥1960												PeP	Ks	KiL	SoL	EnL	InL			
<i>maerkeli</i> Kraatz, 1857	LC	10	<1960				ES									Ks	KiL		EnL				
			≥1960	V	U	St	EH	ES		PH	PS	PK	Kn	OP	PeP	Ks	KiL	SoL		InL			
<i>rufescens</i> (Stephens, 1832)	LC	30	<1960	V	U																		
			≥1960	A	V	U	EK	St	EH	ES		PH	PS				Ks						
<i>eppsheimianus</i> Fagel, 1968	LC	60	<1960										Kn										
			≥1960	V	U	St	EH		PH	PS		Kn	OP		Ks								
<i>brucki</i> (Pandellé, 1869)	NT	80	<1960	U		EH		EP					Kn										
			≥1960	V	U	EH																	
<i>punctus</i> (Gravenhorst, 1806)	LC	4	<1960	A	V	U	EK	St	EH	ES		PH	PS	PK		OP	PeP						
			≥1960	A	V	U	EK	St	EH	ES	LK	EP	PH	PS	PK		Kn	OP	PeP	Ks	KiL	SoL	EnL
Ischnosoma																							
<i>bergrothi</i> (Hellén, 1925)	LC	10	<1960	U		St	EH	ES		PH	PS	PK		OP									
			≥1960	V	U	EK	St	EH	ES	LK	EP	PH	PS	PK	Kn	OP		Ks	KiL	SoL			
<i>longicorne</i> (Mäklin, 1847)	LC	2	<1960	A	V	U	EK	St	EH	ES	LK	EP	PH	PS	PK	Kn	OP	PeP	Ks	KiL	SoL	EnL	InL
			≥1960	A	V	U	EK	St	EH	ES	LK	EP	PH	PS	PK	Kn	OP	PeP	Ks	KiL	SoL	EnL	InL
<i>splendidum</i> (Gravenhorst, 1806)	LC	1	<1960	A	V	U	EK	St	EH	ES	LK	EP	PH	PS	PK	Kn	OP	PeP	Ks	KiL	SoL	EnL	InL
			≥1960	A	V	U	EK	St	EH	ES	LK	EP	PH	PS	PK	Kn	OP	PeP	Ks	KiL	SoL	EnL	InL
Bryoporus																							
<i>cernuus</i> (Gravenhorst, 1806)	LC	4	<1960	A	V	U	St	EH	ES		EP	PH	PS	PK	Kn	OP	PeP	Ks	KiL				
			≥1960	A	V	U	EK	St	EH	ES	LK		PH	PS	PK	Kn	OP	PeP	Ks	KiL	SoL	EnL	InL
Bryophacis																							
<i>maklini</i> (J. Sahlberg, 1871)	LC	15	<1960															Ks	KiL	SoL	EnL	InL	
			≥1960				EH											Ks	KiL	SoL	EnL	InL	
<i>rufus</i> (Erichson, 1839)	LC	15	<1960											Kn					KiL	SoL		InL	
			≥1960										PS		Kn		PeP	Ks	KiL		EnL	InL	
<i>crassicornis</i> (Mäklin, 1847)	LC	40	<1960	A																			
			≥1960	V	U	St	EH					PS	PK		Kn		PeP	Ks	KiL				
Carphacis																							
<i>striatus</i> (Olivier, 1795)	NT	40	<1960	V				ES															
			≥1960	U	EK	EH	ES	LK		PS								Ks					
Lordithon																							
<i>thoracicus</i> (Fabricius, 1777)	LC	1	<1960	A	V	U	EK	St	EH	ES	LK	EP	PH	PS	PK	Kn	OP	PeP	Ks	KiL		EnL	InL
			≥1960	A	V	U	EK	St	EH	ES	LK	EP	PH	PS	PK	Kn	OP	PeP	Ks	KiL	SoL	EnL	InL
<i>bimaculatus</i> (Schrank 1798)	LC	6	<1960																				
<i>exoletus</i> auct. nec (Erichson, 1839)			≥1960	A	V	U	EK	St	EH	ES		EP	PH	PS	PK	Kn	OP						
<i>trinotatus</i> (Erichson, 1839)	NT	100	<1960																				
			≥1960	V	U																		
<i>trimaculatus</i> (Fabricius, 1793)	LC	10	<1960	V	U	St	EH			EP	PH	PS	PK					Ks				InL	
			≥1960			EK	EH	ES	LK	EP	PH	PS	PK	Kn	OP	PeP	Ks	KiL	SoL		InL		
<i>lunulatus</i> (Linnaeus, 1761)	LC	2	<1960	A	V	U	EK	St	EH	ES	LK		PH	PS	PK	Kn	OP	PeP	Ks	KiL			
			≥1960	A	V	U	EK	St	EH	ES	LK	EP	PH	PS	PK	Kn	OP	PeP	Ks	KiL	SoL		InL
<i>pulchellus</i> (Mannerheim, 1830)	LC	60	<1960	V	U		EH	ES		PH	PS											InL	
			≥1960				EH	ES	LK		PH	PS	PK	Kn	OP		Ks						
<i>speciosus</i> (Erichson, 1839)	LC	6	<1960	V	U		EH			PH		PK			OP	PeP	Ks	KiL		EnL	InL		
			≥1960	V	U	EK	St	EH	ES	LK	EP	PH	PS	PK	Kn	OP	PeP	Ks	KiL	SoL	EnL	InL	
Bolitobius																							
<i>cingulatus</i> Mannerheim, 1830	LC	4	<1960	A	V	U	St	EH	ES		EP	PH	PS	PK	Kn	OP	PeP	Ks		SoL		InL	
			≥1960	A	V	U	EK	St	EH	ES	LK	EP	PH	PS	PK	Kn	OP	PeP	Ks	KiL	SoL		InL

castaneus (Stephens, 1832)	LC	20	<1960	V	U													KP	Kn	PeP				
			≥1960	A	V	U		St	EH	ES	LK	EP			PS	PK	Kn	OP	PeP	Ks	KiL	SoL		
Parabolitobius																								
formosus (Gravenhorst, 1806)	LC	15	<1960	V	U	EK	EH	ES			PH	PS												
			≥1960		U	EK	St	EH	ES	LK	EP			PS	PK	Kn	OP							
Sepedophilus																								
littoreus (Linnaeus, 1758)	LC	2	<1960	A	V	U	St	EH	ES	LK	EP	PH	PS	PK	KP	Kn	OP				KiL			
			≥1960	A	V	U	EK	St	EH	ES	LK	EP	PH	PS	PK	KP	Kn	OP	PeP	Ks	KiL	SoL		
testaceus (Fabricius, 1793)	LC	2	<1960	A	V	U	St	EH	ES			PH	PS	PK	KP	Kn	OP	PeP						
			≥1960	A	V	U	EK	St	EH	ES	LK	EP	PH	PS	PK	KP	Kn	OP	PeP	Ks				
marshami (Stephens, 1832)	LC	4	<1960	A	V	U	St	EH	ES	EP	PH	PS	PK	KP	Kn									
			≥1960	A	V	U	EK	St	EH	ES	LK	EP	PH	PS	PK	KP	Kn	OP	PeP	Ks				
constans (Fowler, 1888)	LC	15	<1960	A	V	U	St	EH				PS			Kn									
			≥1960		V	U	EK	St	EH	ES	EP	PH	PS	PK		Kn			Ks					
immaculatus (Stephens, 1832)	LC	15	<1960	A	V	U	St	EH	ES			PH	PS	PK	KP	Kn	OP							
			≥1960	A	V	U	EK	St	EH	ES	LK	EP		PS	PK	Kn	OP	PeP						
bipunctatus (Gravenhorst, 1802)	LC	15	<1960	A	V	U		EH	ES			PH	PS	PK										
			≥1960	A	V	U	EK	St	EH	ES	LK	EP	PH	PS	PK				PeP					
pedicularius (Gravenhorst, 1802)	LC	4	<1960	A	V	U	St	EH	ES	LK	EP	PH	PS	PK										
			≥1960	A	V	U	EK	St	EH	ES	LK	EP		PS	PK	KP	Kn	OP		Ks	KiL			
Tachyporus																								
nitidulus (Fabricius, 1781)	LC	4	<1960	A	V	U	St	EH	ES				PS	PK	KP							KiL		
			≥1960	A	V	U	EK	St	EH	ES	LK	EP	PH	PS	PK	KP	Kn		PeP	Ks	KiL			
obscurellus Zetterstedt, 1838	LC	4	<1960		V	U		EH	LK			PH	PS		KP		OP	PeP	Ks	KiL	SoL	EnL	InL	
			≥1960		V	U	EK	St	EH	ES	EP		PS	PK		Kn	OP	PeP	Ks	KiL	SoL	EnL		
obtusus (Linnaeus, 1767)	LC	2	<1960	A	V	U	St	EH	ES	LK	EP	PH	PS	PK	KP	Kn	OP		Ks					InL
			≥1960	A	V	U	EK	St	EH	ES	LK	EP	PH	PS	PK	KP	Kn	OP	PeP	Ks				
abdominalis (Fabricius, 1781)	LC	2	<1960	A	V	U	St	EH	ES	LK	EP	PH	PS	PK	KP	Kn	OP	PeP	Ks	KiL	SoL	EnL	InL	
			≥1960		V	U		EH	LK	EP	PH	PS	PK	KP	Kn	OP	PeP		Ks	KiL	SoL	EnL	InL	
solutus Erichson, 1840	LC	40	<1960	A	V	U		EH	ES	LK			PS											
			≥1960	A	V	U	EK		ES	LK		PS												
pallidus Sharp, 1871	LC	4	<1960	A	V	U	St	EH	ES	LK	EP	PH	PS	PK	KP	Kn	OP	PeP		KiL	SoL			
			≥1960	A	V	U	EK	St	EH	ES	EP	PH	PS	PK	KP	Kn	OP	PeP	Ks					EnL
hypnorum (Fabricius, 1775)	LC	2	<1960	A	V	U	EK	St	EH	ES	EP	PH	PS	PK	KP	Kn								
			≥1960	A	V	U	EK	St	EH	ES	LK	EP	PH	PS	PK	KP	Kn			Ks				
chrysomelinus (Linnaeus, 1758)	LC	2	<1960	A	V	U		EH	ES			PH	PS	PK	KP	Kn	OP		Ks	KiL			EnL	
			≥1960	A	V	U	EK	St	EH	ES	LK	EP	PH	PS	PK	KP	Kn	OP	PeP	Ks	KiL	SoL		
dispar (Paykull, 1789)	LC	4	<1960	A	V	U		EH	ES				PS	PK	KP	Kn		PeP						
			≥1960	A	V	U	EK	St	EH	ES	LK	EP	PH	PS	PK	KP	Kn	OP	PeP	Ks	KiL			
tersus Erichson, 1839	LC	60	<1960	A	V	U																		
			≥1960		V	U									KP									
atriceps Stephens, 1832	LC	60	<1960	A	V	U		EH	ES	LK			PS	PK	KP	Kn	OP	PeP	Ks	KiL		EnL	InL	
			≥1960		V	U		EH	ES			PH			PK	Kn								
quadriscopulatus Pandellé, 1869	LC	40	<1960	A	V	U		EH	ES												KiL	SoL		
			≥1960		V	U	EK		ES	LK													SoL	
transversalis Gravenhorst, 1806	LC	6	<1960	A	V	U	St	EH	ES	LK	EP	PH	PS	PK	KP	Kn		PeP	Ks	KiL	SoL			InL
			≥1960	A	V	U	EK	St	EH	ES	LK	EP	PH	PS	PK	KP	Kn	OP	PeP	Ks	KiL			
pulchellus Mannerheim, 1843	LC	2	<1960	A	V	U	EK	St	EH	ES	EP		PS	PK	KP	Kn	OP	PeP	Ks	KiL	SoL			
			≥1960	A	V	U	EK	St	EH	ES	LK	EP	PH	PS	PK	KP	Kn	OP	PeP	Ks	KiL	SoL		
pusillus Gravenhorst, 1806	LC	10	<1960	A	V	U	EK	St	EH	ES	EP	PH	PS	PK	KP	Kn	OP		Ks	KiL		EnL	InL	
			≥1960	A	V	U	EK	St	EH	LK	EP	PH		PK	KP	Kn	OP	PeP		Ks	KiL	SoL		
scitulus Erichson, 1839	LC	15	<1960											PK										
			≥1960	A	V	U	EK	St	EH	ES	LK			PS	PK	KP	Kn		PeP	Ks	KiL	SoL		
corpulentus J.Sahlberg, 1876	LC	20	<1960		V	U		ES																
			≥1960	A	V	U	EK	St	EH				PH	PS	PK				PeP					

rubrior Tottenham, 1939	NE	100	<1960	A																		
			≥1960	V																		
Ischnopoda																						
leucopus (Marsham, 1802)	LC	4	<1960	A	V	U		St	EH	ES	LK		PH	PS	PK							
			≥1960	A	V	U	EK	St	EH	ES	LK	EP	PH	PS	PK	KP	Kn	OP	PeP	Ks	KiL	SoL
umbratica (Erichson, 1837)	NE	100	<1960																			
			≥1960			EK																
Tachyusa																						
constricta Erichson, 1837	LC	40	<1960		V	U			EH	ES												
			≥1960	V	U	EK			ES	LK												
coarctata Erichson, 1837	VU	100	<1960																			
			≥1960							LK												
scitula Erichson, 1837	VU	100	<1960													Kn		Ks				
			≥1960					EH									PeP	Ks				
Thinonoma																						
atra (Gravenhorst, 1806)	LC	10	<1960	A	V	U		St	EH	ES	LK	EP	PH	PS	PK	KP	OP	PeP	Ks			
			≥1960	A	V	U	EK	St	EH	ES	LK	EP	PH		PK	KP	OP		Ks			
Brachyusa																						
concolor (Erichson, 1839)	LC	60	<1960																InL			
			≥1960	V	U			EH	ES									Ks	InL			
Trichomicra																						
sahlbergiana (Bernhauer, 1910)	LC	60	<1960	A	V	U			EH	ES												
			≥1960	A	V	U									KP		PeP					
Dochmonota																						
clancula (Erichson, 1837)	LC	20	<1960	A	V	U			EH					PS								
			≥1960	A	V	U		St	EH		LK		PH	PS	PK	KP	Kn	OP				
rudiventris (Eppelsheim, 1886)	LC	60	<1960													Kn		Ks	SoL	InL		
			≥1960		U										Kn		PeP	Ks	KiL			
Dacrila																						
fallax (Kraatz, 1856)	LC	30	<1960	A	V	U																
			≥1960	A	V	U	EK															
Hydrosmecta																						
longula (Heer, 1839)	LC	15	<1960	A	V	U				ES					PK			PeP	Ks	InL		
			≥1960	A	V	U	EK	St	EH	ES		EP	PH		PK	KP	Kn	PeP	Ks	KiL	InL	
delicatula (Sharp, 1869)	DD	100	<1960																			
			≥1960			EK								PK					InL			
tenella (Mannerheim, 1830)	NT	80	<1960		V																	
			≥1960	A		EK							PK				Ks					
subtilissima (Kraatz, 1854)	LC	30	<1960																			
			≥1960	V	U			EH	ES				PK		Kn	OP		Ks	KiL			
Tomoglossa																						
luteicornis (Erichson, 1837)	VU	100	<1960						EH													
			≥1960					EH			PH											
Schistoglossa																						
viduata (Erichson, 1837)	LC	20	<1960	A				St		ES				PS				OP			InL	
			≥1960	A	V	U			EH			EP	PS	PK	KP	Kn	OP	PeP	Ks			
drusilloides (J.Sahlberg, 1876)	NT	80	<1960																	KiL		
			≥1960		U													PeP	Ks			
gemina (Erichson, 1837)	LC	15	<1960	A	V	U		St	EH	ES	LK		PH	PS	PK			PeP				
			≥1960	A	V	U		St	EH	ES	LK	EP			PK	KP	Kn	PeP	Ks			
curtipennis (Sharp, 1869)	LC	4	<1960			U							PH		KP			PeP	Ks			
			≥1960	A	V	U	EK	St	EH	ES		EP	PH	PS	PK	KP	Kn	OP	PeP	Ks	KiL	InL
aubei (Bris. de Barn., 1860)	LC	6	<1960		V	U		St	EH	ES								OP	PeP	Ks	KiL	InL
			≥1960	A	V	U		St	EH		LK		PH		PK	KP	Kn	OP	PeP	Ks	KiL	InL

Aloconota

philonthoides (Wollaston, 1854)	LC	6	<1960																				
			≥1960	A	V	U		EH		EP	PH	PK	Kn	PeP	Ks	KiL							
strandii (Benick, 1939)	NT	100	<1960																				
			≥1960																EnL	InL			
currax (Kraatz, 1856)	NT	100*	<1960																	InL			
			≥1960																	InL			
sulcifrons (Stephens, 1832)	LC	15	<1960		V	U	St	EH	ES		PH	PS				Ks							
			≥1960	A	V	U	EK	St	EH	ES		PH	PS		Kn	OP	PeP	Ks	KiL				
insecta (Thomson, 1856)	LC	4	<1960		V	U	St	EH	ES		PS			OP	PeP								
			≥1960	A	V	U	EK	St	EH	ES	LK	EP	PH	PS	PK	KP	Kn	OP	PeP	Ks	KiL	SoL	InL
subgrandis (Brundin, 1954)	LC	10	<1960																				
			≥1960		V	U	EK		EH	ES		PH	PS	PK	KP	Kn		PeP	Ks	KiL	SoL		
gregaria (Erichson, 1839)	LC	6	<1960	A	V	U		St	EH	ES	LK	EP	PH	PS	PK	Kn				KiL	SoL		
			≥1960	A	V	U	EK	St	EH	ES	LK	EP	PH	PS	PK	KP	Kn	OP		Ks			
languida (Erichson, 1837)	VU	100	<1960			U																	
			≥1960			U		EH															
longicollis (Mulsant & Rey, 1852)	NA	100*	<1960																				
			≥1960		V																		

Liogluta

pagana (Erichson, 1839)	VU	100	<1960	A		U																		
			≥1960	A																				
granigera (Kiesenwetter, 1850)	LC	10	<1960		V	U	St	EH			PS	PK	KP											
			≥1960		V	U	EK		EH			PH	PS	PK		Kn	OP	PeP	Ks	KiL				
micans (Mulsant & Rey, 1852)	LC	1	<1960	A	V	U	EK	St	EH	ES		PS	KP	Kn	OP	PeP	Ks	KiL	SoL	EnL	InL			
			≥1960	A	V	U	EK	St	EH	ES		EP	PH	PS	PK	KP	Kn	OP	PeP	Ks	KiL	SoL	EnL	InL
longiuscula (Gravenhorst, 1802)	NE	100*	<1960			U																		
			≥1960				EK																	
microptera Thomson, 1867	LC	6	<1960	A	V	U	EK	St	EH	ES		EP	PH		KP									
			≥1960	A	V	U	EK	St	EH	ES	LK	EP	PH	PS	PK	KP	Kn	OP	PeP	Ks				
alpestris (Heer, 1839)	LC	15	<1960	A		U		St	EH	ES		PS		KP	Kn	OP				KiL		EnL	InL	
			≥1960	A	V	U	EK		EH	ES				PK	Kn		PeP		KiL	SoL	EnL	InL		

Geostiba

circellaris (Gravenhorst, 1802)	LC	2	<1960	A	V	U	EK	St	EH	ES		EP	PH	PS	PK	KP	Kn	OP	PeP	Ks	KiL	SoL	InL	
			≥1960	A	V	U	EK	St	EH	ES	LK	EP	PH	PS	PK	KP	Kn	OP	PeP	Ks	KiL	SoL	EnL	InL

Callicerus

obscurus Gravenhorst, 1802	LC	60	<1960		V																		
			≥1960		V	U		EH															

Dadobia

immersa (Erichson, 1837)	LC	2	<1960	A	V	U		St	EH	ES		PH		PK	KP		PeP		KiL			InL		
			≥1960	A	V	U	EK	St	EH	ES	LK	EP	PH	PS	PK	KP	Kn	OP	PeP	Ks	KiL	SoL	EnL	InL

Paranopleta

inhabilis (Kraatz, 1856)	LC	40	<1960		V			St						KP									
			≥1960			U		St	EH			PH	PS	PK	KP	Kn	OP				KiL	SoL	

Lundbergia

trybomi (J.Sahlberg, 1880)	NT	80	<1960																				
			≥1960									PH	PS	PK			PeP						InL

Amidobia

talpa (Heer, 1841)	LC	4	<1960		V	U		St	EH	ES		PH	PS				Ks	KiL					
			≥1960	A	V	U	EK	St	EH	ES		EP	PH	PS	PK	KP	Kn	OP	PeP	Ks	KiL	SoL	

Lypoglossa

lateralis (Mannerheim, 1830)	LC	1	<1960	A	V	U	EK		EH	ES		PH	PS		KP	Kn		PeP	Ks	KiL	SoL		InL	
			≥1960	A	V	U	EK	St	EH	ES		EP	PH	PS	PK	KP	Kn	OP	PeP	Ks	KiL	SoL	EnL	InL

Notothecta

flavipes (Gravenhorst, 1806)	LC	2	<1960	A	V	U			EH	ES		PH	PS	PK	KP	Kn		PeP	Ks	KiL				
			≥1960	A	V	U	EK	St	EH	ES	LK	EP	PH	PS	PK	KP	Kn	OP	PeP	Ks	KiL	SoL		InL

fallaciosa (Sharp, 1869)	LC	4	<1960	A	U													OP		Ks	KiL			InL
			≥1960	V	U	EK	St	EH	ES	LK					PS	PK	KP	Kn	OP	PeP	Ks	KiL	SoL	EnL
palleola (Erichson, 1837)	LC	20	<1960																					
			≥1960			EK							PH	PK	Kn	OP	PeP	Ks	KiL				EnL	InL
benickiella Brundin, 1948	LC	30	<1960		U																			
			≥1960	A	V	U		EH																
wireni Brundin, 1948	NT	100	<1960																					
			≥1960																		Ks	KiL		
amicula (Stephens, 1832)	LC	6	<1960	A	V	U	St	EH	ES		EP	PH	PS	PK	KP	Kn						KiL		InL
			≥1960	A	V	U	EK	St	EH	ES	LK	EP	PH		PK	KP	Kn	OP	PeP	Ks	KiL			
pittionii Scheerpeltz, 1950	LC	40	<1960																					
			≥1960	V	U			EH	ES		EP													
spatuloides Benick, 1939	LC	20	<1960																		Ks			
			≥1960							LK				PS		KP	Kn	OP			Ks	KiL		
inquinula (Gravenhorst, 1802)	VU	60	<1960	V	U			EH	ES	LK														
			≥1960		U			EH	ES			PH												
excelsa Bernhauer, 1911	LC	20	<1960	V	U			EH	ES						KP			PeP	Ks	KiL		EnL	InL	
			≥1960	A	V	U		EH				PH	PK						PeP	Ks				
subtilis (Scriba, 1866)	LC	1	<1960	A	V	U	EK	St	EH	ES	LK		PH	PS	PK	KP		OP	PeP	Ks	KiL		EnL	InL
			≥1960	V	U	EK	St	EH	ES	LK	EP	PH	PS	PK	KP	Kn	OP	PeP	Ks	KiL	SoL	EnL	InL	
nesslingi Bernhauer, 1928	LC	4	<1960	V	U			EH					PH			KP		OP		Ks	KiL		InL	
			≥1960	V	U	EK	St	EH	ES	LK	EP	PH	PS	PK		Kn	OP	PeP	Ks	KiL	SoL			
atomaria (Kraatz, 1856)	NT	100*	<1960					EH																
			≥1960		U																			
glabricula Thomson, 1867	LC	80	<1960																					
			≥1960		U			EH																
indubia (Sharp, 1869)	NA	100	<1960																					
			≥1960	V																				
liliputana (Bris. de Barn., 1860)	LC	30	<1960					EH						PK	Kn					Ks			InL	
			≥1960		U	EK		EH	ES	LK		PH	PK				OP			Ks				
boreella Brundin, 1948	LC	2	<1960	V				EH	ES									PeP	Ks				InL	
			≥1960	A	V	U	EK	St	EH	ES		EP	PH	PS	PK	KP	Kn	OP	PeP	Ks	KiL	SoL	EnL	InL
platonoffi Brundin, 1948	LC	40	<1960																	Ks				
			≥1960																	PeP	Ks	KiL		
nitella Brundin, 1948	NA	100	<1960																					
			≥1960		U																			
luteipes (Erichson, 1837)	LC	60	<1960	A	V	U	St		ES															
			≥1960	A	U					LK												Ks		
vilis (Erichson, 1837)	LC	40	<1960	A	V	U																		
			≥1960	A	V	U	EK				LK													
zosteræ (Thomson, 1856)	LC	20	<1960	A	V	U																		
			≥1960	A	V	U	EK	St				EP			KP	Kn	OP							
nigra (Kraatz, 1856)	LC	6	<1960	A	V	U	St	EH	ES	LK	EP	PH	PS	PK		Kn		PeP		KiL				
			≥1960	A	V	U	EK	St	EH	ES	LK	EP			PK	KP		OP			Ks	KiL		
dadopora Thomson, 1867	LC	15	<1960	V	U			EH																
			≥1960	A	V	U	St	EH	ES	LK			PS	PK				OP						
canescens (Sharp, 1869)	LC	15	<1960	A	V	U		EH	ES	LK														
			≥1960	V	U	EK	St	EH	ES	LK	EP	PH		PK	KP									
sordidula (Erichson, 1837)	LC	10	<1960	A	V	U	St	EH	ES	LK		PH	PS	PK	KP			PeP		KiL			InL	
			≥1960	A	V	U	EK	St	EH	ES	LK	EP	PH	PS	PK		Kn							
celata (Erichson, 1837)	LC	2	<1960	A	V	U	St	EH	ES		EP	PH	PS	PK	KP		OP	PeP	Ks	KiL		EnL	InL	
			≥1960	A	V	U	EK	St	EH	ES	LK	EP	PH	PS	PK	KP	Kn	OP	PeP	Ks	KiL	SoL	EnL	InL
myrmecobia (Kraatz, 1856)	LC	2	<1960	A	V	U	EK	St	EH	ES		EP	PH	PS	PK		Kn		PeP	Ks	KiL	SoL		InL
			≥1960	A	V	U	EK	St	EH	ES		EP	PH	PS	PK	KP	Kn	OP	PeP	Ks	KiL	SoL		
laticollis (Stephens, 1832)	LC	4	<1960	A	V	U	St	EH	ES	LK						Kn								
			≥1960	A	V	U	EK	St	EH	ES	LK	EP	PH	PS	PK	KP	Kn	OP	PeP	Ks				

scapularis (Sahlberg, 1831)	LC	15	<1960	A		U			ES								PK							
			≥1960		V U EK St EH ES LK														PH PS PK KP Kn					
sodalis (Erichson, 1837)	LC	2	<1960	A	V	U	EK	St	EH	ES	LK	EP	PH	PS	PK	KP		OP	PeP	Ks		SoL		
			≥1960		A V U EK St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL																			
gagatina (Baudi, 1848)	LC	4	<1960		V	U		St	EH	ES	LK		PH	PS	PK				PeP	Ks				
			≥1960		A V U EK St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL																			
pandionis Scheerpeltz, 1958	LC	60	<1960																					
			≥1960			U				EH										Kn OP PeP Ks		SoL		
pallidicornis (Thomson, 1856)	LC	20	<1960		V	U		St	EH	ES									OP					
			≥1960		A U				EH ES LK					PH PS PK			Kn							
hybrida (Sharp, 1869)	NA	100	<1960																					
			≥1960		V																			
trinotata (Kraatz, 1856)	LC	15	<1960	A	V	U		St	EH	ES	LK	EP	PH	PS	PK	KP	Kn		PeP	Ks	KiL	SoL	InL	
			≥1960		A V U EK St EH ES LK EP PH														OP		Ks			
sparreschneideri Munster, 1923	LC	30	<1960																	Ks	KiL		InL	
			≥1960																		Ks KiL SoL EnL InL			
subglabra (Sharp, 1869)	LC	30	<1960					EH	ES															
			≥1960		V U			EH ES LK				PH PS									Ks			
macrocera (Thomson, 1856)	LC	6	<1960	A	V	U		EH	ES	LK		PH	PS	PK				OP						
			≥1960		A V U EK St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL																			
puncticollis Benick, 1938	LC	60	<1960	A					ES															
			≥1960		A U			EH LK		PH				KP										
cauta (Erichson, 1837)	LC	10	<1960	A	V	U		EH	ES			PH		PK	KP					Ks	KiL			
			≥1960		A V U EK		EH ES LK EP PH PS PK KP Kn													Ks				
ischnocera Thomson, 1870	LC	15	<1960	A	V	U		EH	ES						KP					Ks	KiL		InL	
			≥1960		A V U EK		EH ES		EP PH		PK										Ks			
longicornis (Gravenhorst, 1802)	LC	2	<1960	A	V	U		St	EH	ES	LK	EP	PH	PS	PK	KP	Kn	OP	PeP	Ks	KiL		EnL	InL
			≥1960		A V U EK St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL InL																			
cribripennis J.Sahlberg, 1890	LC	10	<1960		V	U		EH						PK	KP			OP	PeP	Ks			InL	
			≥1960		V U St EH			PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL InL																
subsinuata (Erichson, 1839)	LC	30	<1960	A	V	U		EH	ES	LK	EP	PH	PS	PK		Kn				Ks			InL	
			≥1960		A V U St EH ES EP			KP												Ks			InL	
dwinensis Poppius, 1908	LC	15	<1960	A				EH	ES											Ks	KiL			
			≥1960		V U St EH		PH PK KP Kn			PeP Ks KiL		InL												
cadaverina (Bris. de Barn., 1860)	LC	20	<1960	A	V	U		EH																
			≥1960		V U EK		EH ES LK EP		PS PK	Kn														
nigripes (Thomson, 1856)	LC	6	<1960	A	V	U		St	EH	ES		PH	PS	PK	KP					Ks	KiL	SoL	InL	
			≥1960		A V U EK St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks																			
marcida (Erichson, 1837)	NT	100	<1960						ES															
			≥1960		A V																			
europaea Likovský, 1984	LC	10	<1960	A	V	U		EH	ES						PK									
			≥1960		V U		EH ES LK		PH PS PK KP															
cinnamoptera (Thomson, 1856)	LC	1	<1960	A	V	U		St		ES	EP	PH	PS	PK					PeP	Ks	KiL		EnL	InL
			≥1960		A V U EK St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL																			
aeneipennis (Thomson, 1856)	LC	1	<1960	A	V	U		St	EH	ES		EP	PH	PS	PK	KP	Kn	OP	PeP	Ks	KiL	SoL	EnL	InL
			≥1960		A V U EK St EH ES EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL																			
parapicipennis Brundin, 1954	LC	4	<1960		U																			
			≥1960		V U EK		EH LK EP		PS PK	Kn		PeP Ks KiL		EnL InL										
picipennoides Hanssen, 1932	LC	30	<1960		V	U			ES	EP														
			≥1960		V U EK St EH ES LK		PH PK		OP	Ks KiL														
lapponica J.Sahlberg, 1876	LC	15	<1960																	Ks			InL	
			≥1960						PH PK	Kn		Ks KiL SoL	InL											
altaica Bernhauer, 1901	LC	30	<1960																	Ks			EnL	InL
			≥1960																		Ks KiL	EnL InL		
intermedia (Thomson, 1852)	LC	2	<1960	A	V	U		EH	ES					PK						Ks	KiL		InL	
			≥1960		A V U EK St EH ES EP PH		PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL	InL																

setigera (Sharp, 1869)	LC	10	<1960	A	V	U			EH	ES				PH	PS	PK	KP				PeP	Ks	KiL	SoL	EnL	InL	
			≥1960	A	V	U	EK	St	EH	ES			EP	PH		PK	KP			OP			Ks				
laevana (Mulsant & Rey, 1852)	LC	6	<1960	A	V	U			EH	ES			PH									Ks	KiL	SoL			
			≥1960	A	V	U		St	EH	ES	LK	EP	PH			PK	KP	Kn	OP				Ks	KiL			EnL
atramentaria (Gyllenhal, 1810)	LC	1	<1960	A	V	U	EK	St	EH	ES			EP	PH	PS	PK	KP	Kn	OP	PeP	Ks	KiL	SoL	EnL	InL		
			≥1960	A	V	U	EK	St	EH	ES	LK	EP	PH	PS	PK	KP				OP	PeP	Ks	KiL	SoL	EnL	InL	
hypnorum (Kiesenwetter, 1850)	LC	2	<1960	A	V	U		St	EH	ES	LK	EP	PH				KP	Kn	OP	PeP	Ks	KiL	SoL	EnL			
			≥1960	A	V	U	EK	St	EH	ES	LK		PH	PS	PK	KP	Kn			OP	PeP	Ks	KiL	SoL	EnL	InL	
laevicauda J.Sahlberg, 1876	LC	40	<1960																				KiL		EnL	InL	
			≥1960																		OP			KiL		EnL	InL
brunneipennis (Thomson, 1852)	LC	4	<1960		U				EH	ES			PH	PS							PeP	Ks	KiL	SoL	EnL	InL	
			≥1960		V	U	EK	St	EH	ES	LK	EP	PH	PS	PK	KP	Kn	OP	PeP	Ks	KiL	SoL					InL
castanoptera (Mannerheim, 1830)	LC	80	<1960																								
			≥1960	A	V	U																					
triangulum (Kraatz, 1856)	NT	80	<1960																								
			≥1960		V	U						EP															
xanthopus (Thomson, 1856)	LC	30	<1960		V	U			EH																		
			≥1960	A	V	U			EH	ES						PK	KP										
graminicola (Gravenhorst, 1806)	LC	1	<1960	A	V	U	EK	St	EH	ES	LK	EP	PH	PS	PK	KP			OP	PeP	Ks	KiL	SoL	EnL	InL		
			≥1960	A	V	U	EK	St	EH	ES	LK	EP	PH			PK	KP	Kn	OP	PeP	Ks	KiL	SoL	EnL	InL		
ebenina (Mulsant & Rey, 1873)	LC	30	<1960						EH																		
			≥1960		V	U	EK		EH	ES					PK												EnL
heymesii Hubenthal, 1913	NE	100*	<1960																								
			≥1960																Kn								
incognita (Sharp, 1869)	LC	4	<1960		V	U			EH				PH											KiL			
			≥1960	A	V	U	EK	St	EH	ES	LK	EP	PH	PS	PK	KP	Kn	OP	PeP	Ks	KiL						
ravilla (Erichson, 1839)	VU	100	<1960	A	V	U																					
			≥1960		V	U																					
procera (Kraatz, 1856)	LC	4	<1960	A	V				EH	ES																	
			≥1960		V	U	EK	St	EH	ES		EP	PH	PS	PK	KP	Kn	OP	PeP	Ks	KiL	SoL	EnL	InL			
basicornis (Mulsant & Rey, 1852)	LC	30	<1960	A	V	U			EH	ES																	
			≥1960		V	U	EK		EH				PH				Kn								SoL		
nidicola (Johansen, 1914)	NT	60	<1960		V	U		St	EH							KP								KiL			InL
			≥1960	A	V	U						EP			PK									Ks			
allocera Eppelsheim, 1893	LC	10	<1960						EH	ES							Kn					Ks	KiL		EnL	InL	
			≥1960												PK		Kn	OP	PeP	Ks	KiL	SoL	EnL	InL			
oblita (Erichson, 1839)	NT	100*	<1960	A	V	U																					
			≥1960		V	U																					
autumnalis (Erichson, 1839)	VU	100	<1960		V				EH																		
			≥1960																					Ks			
boletophila (Thomson, 1856)	LC	15	<1960		V	U		St	EH	ES			PH				KP										
			≥1960	A	V	U		St	EH	ES	LK		PH	PS	PK								Ks	KiL			InL
diversa (Sharp, 1869)	LC	6	<1960		V	U			EH														Ks	KiL			InL
			≥1960		V	U		St	EH	ES		EP		PS	PK	KP	Kn	OP	PeP	Ks	KiL	SoL	EnL	InL			
strandiella Brundin, 1954	LC	10	<1960	A		U																					InL
			≥1960	A	V	U	EK		EH	ES						PK	KP	Kn	OP	PeP	Ks	KiL			EnL	InL	
pilicornis (Thomson, 1852)	LC	1	<1960		V	U		St	EH	ES	LK		PH	PS	PK	KP	Kn	OP	PeP	Ks							InL
			≥1960	A	V	U	EK	St	EH	ES	LK	EP	PH	PS	PK	KP	Kn	OP	PeP	Ks	KiL	SoL	EnL	InL			
acutangula Hanssen, 1937	LC	40	<1960			U																					
			≥1960		V	U			EH	ES		EP		PS	PK		Kn			PeP			KiL				
boleticola J.Sahlberg, 1876	LC	4	<1960		V	U			EH			EP	PS														
			≥1960		V	U	EK	St	EH	ES		EP	PH	PS	PK	KP	Kn	OP	PeP	Ks							
fungicola (Thomson, 1852)	LC	60	<1960																								
			≥1960		V	U			EH	ES	LK																
crassicornis (Fabricius, 1793)	LC	2	<1960	A	V	U		St	EH	ES	LK	EP	PH	PS	PK	KP	Kn			PeP			KiL		EnL		
			≥1960	A	V	U	EK	St	EH	ES	LK	EP	PH	PS	PK	KP	Kn	OP	PeP	Ks	KiL						

paracrassicornis Brundin, 1954	LC	2	<1960	A	V	U			EH						PH																
				≥1960	A V U EK St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL																										
pachycera (Eppelsheim, 1893)	NT	80	<1960																												
				≥1960	U Ks KiL																										
contristata (Kraatz, 1856)	NE	100*	<1960																												
				≥1960	U																										
euryptera (Stephens, 1832)	LC	2	<1960	A	V	U	EK	St	EH	ES	LK	EP	PH	PS	PK	KP	Kn		PeP	Ks	KiL	SoL	EnL	InL							
				≥1960	A V U EK St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL																										
divisa (Märkel, 1844)	LC	10	<1960	A	V	U			EH	ES	LK				PS		KP	Kn						KiL							
				≥1960	V U EK St EH ES EP PH PK KP Kn OP PeP Ks SoL InL																										
vaga (Heer, 1839)	LC	1	<1960	A	V	U		St	EH	ES			PH	PS	PK	KP			OP					KiL				InL			
				≥1960	A V U EK St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL																										
harwoodi Williams, 1930	LC	10	<1960	A	V	U			EH	ES		EP	PH	PS	PK		Kn		PeP					KiL				InL			
				≥1960	A V U EK EH ES LK PH PK KP OP Ks KiL SoL InL																										
janssoni (Bernhauer, 1923)	VU	100*	<1960																												
				≥1960	OP																										
nigritula (Gravenhorst, 1802)	LC	4	<1960	A	V	U		St	EH	ES					PK									Ks	KiL						
				≥1960	A V U EK St EH ES EP PH PS PK KP Kn OP Ks																										
picipes (Thomson, 1856)	LC	4	<1960	A	V	U		St	EH	ES					PK	KP			PeP	Ks								InL			
				≥1960	A V U St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL InL																										
taxiceroides Munster, 1935	NT	100	<1960																												
				≥1960	Kn OP PeP																										
occulta (Erichson, 1837)	NT	60	<1960	V	U				EH	ES																					
				≥1960	U EH																										
fungivora (Thomson, 1867)	NE	100*	<1960																												
				≥1960																											
monticola (Thomson, 1852)	LC	15	<1960	A	V				EH						PS																
				≥1960	A V U EK EH ES LK PH PS PK Ks																										
excellens (Kraatz, 1856)	LC	6	<1960	A	V	U			EH	ES			PH	PS	PK									Ks	KiL				InL		
				≥1960	A V U EK St EH ES LK EP PH PK Kn OP PeP Ks KiL SoL InL																										
corvina (Thomson, 1856)	LC	4	<1960	A	V	U			EH	ES						KP			OP					Ks	KiL						
				≥1960	A V U EK St EH ES EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL InL																										
sodermani (Bernhauer, 1931)	NT	100	<1960	V					EH																						
				≥1960	U EH Kn																										
depressicollis (Fauvel, 1872)	LC	10	<1960	V	U		St	EH	ES		EP	PH		PK	KP	Kn		PeP	Ks	KiL					EnL	InL					
				≥1960	V U St EH EP KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL																										
melanaria (Mannerheim, 1830)	LC	10	<1960	A	V	U			EH	ES		EP			PK	KP			PeP	Ks	KiL										
				≥1960	A V U EK St EH ES LK EP PH PK KP Kn Ks																										
Pachyatheta																															
mortuorum (Thomson, 1867)	LC	80	<1960	V																											
				≥1960	V U EH PH																										
cribrata (Kraatz, 1856)	LC	6	<1960	V	U				EH	ES				PS		KP		OP													
				≥1960	A V U EK St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL InL																										
Thinobaena																															
vestita (Gravenhorst, 1806)	LC	30	<1960	A	V	U																									
				≥1960	A V U EK																										
Boreophilia																															
munsteri Bernhauer, 1902	LC	40	<1960																					KiL			EnL	InL			
				≥1960	EnL InL																										
subplana (J.Sahlberg, 1880)	NT	60	<1960																												
				≥1960	EnL InL																										
islandica (Kraatz, 1857)	LC	30	<1960																					KiL			EnL	InL			
				≥1960	Ks KiL SoL EnL InL																										
eremita (Rye, 1866)	LC	4	<1960	V	U				EH	ES				PK	KP			OP	PeP	Ks	KiL				EnL	InL					
				≥1960	V U EK St EH ES EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL InL																										
hyperborea (Brundin, 1940)	NT	100	<1960																												
				≥1960	Ks SoL																										

fusca (Sahlberg, 1831)	LC	30	<1960																	Ks	KiL		EnL	InL		
			≥1960												OP								KiL	SoL	InL	
insecuta (Eppelsheim, 1893)	VU	100	<1960																							
			≥1960																			Ks				
latifemorata (Brundin, 1940)	NT	100	<1960																					InL		
			≥1960																						EnL	
Boreostiba																										
frigida (J.Sahlberg, 1880) <i>sibirica auct. nec Mäklin, 1880</i>	NT	60	<1960																					EnL	InL	
			≥1960																						EnL	InL
piligera (J.Sahlberg, 1876)	LC	80	<1960																							
			≥1960												PK										EnL	InL
thulea (Poppius, 1909)	NT	100*	<1960																							
			≥1960																						InL	
Plataraea																										
dubiosa (Benick, 1934)	LC	10	<1960	A	V	U		EH																		
			≥1960	A	V	U	EK	St	EH	ES	LK	EP		PS	PK	KP										
brunnea (Fabricius, 1798)	LC	60	<1960	A	V	U																				
			≥1960	A	V																					
Alevonota																										
gracilentata (Erichson, 1839)	LC	40	<1960		V	U																				
			≥1960		V	U	EK	St			LK															
Alianta																										
incana (Erichson, 1837)	LC	6	<1960	A	V	U		EH	ES			PS														
			≥1960	A	V	U	EK	St	EH	ES	LK	EP			PK	KP	OP									
Trichiusa																										
immigrata Lohse, 1984	LC	10	<1960																							
			≥1960		V	U	EK	St	EH	ES	LK	EP	PH	PS	PK	KP						Ks			EnL	
Pachnida																										
nigella (Erichson, 1837)	LC	15	<1960	A		U																				
			≥1960	A	V	U	EK	St	EH	ES	LK															
Dinaraea																										
angustula (Gyllenhal, 1810)	LC	10	<1960	A	V	U	EK	St		ES		EP														
			≥1960	A	V	U	EK	St	EH	ES	LK			PS	PK	Kn							KiL			
aequata (Erichson, 1837)	LC	1	<1960	A	V	U		St	EH	ES	LK	EP	PH	PS	PK	KP						PeP	Ks	KiL	EnL	InL
			≥1960		V	U	EK	St	EH	ES	LK	EP	PH	PS	PK	KP	Kn	OP	PeP	Ks			KiL	SoL	EnL	InL
linearis (Gravenhorst, 1802)	LC	4	<1960	A	V	U	EK	St	EH	ES		EP	PH	PS	PK	KP							KiL	SoL	InL	
			≥1960		V	U	EK	St	EH	ES	LK			PH	PS	PK	KP	Kn	OP	PeP	Ks			KiL	SoL	
arcana (Erichson, 1839)	LC	4	<1960			U		St	EH	ES			PH			KP	Kn				PeP	Ks	KiL	SoL	EnL	InL
			≥1960			U		St	EH	ES			EP	PH	PS	PK	KP	Kn	OP	PeP	Ks			KiL	SoL	EnL
Lyprocorrhe																										
anceps (Erichson, 1837)	LC	4	<1960	A	V	U		St	EH	ES	LK		PH			KP								Ks		InL
			≥1960	A	V	U	EK	St	EH	ES	LK	EP	PH	PS	PK	KP	Kn	OP	PeP	Ks					SoL	InL
Nehemitropia																										
lividipennis (Mannerheim, 1830)	LC	10	<1960	A	V	U		St	EH	ES	LK		PH		PK									KiL		
			≥1960	A	V	U	EK	St	EH	ES	LK	EP	PH			PK	KP	Kn	OP							
Acrotona																										
clientula (Erichson, 1839)	RE	100*	<1960	A	V	U		St	EH				PH	PS			Kn				PeP					
			≥1960																							
orphana (Erichson, 1837)	LC	30	<1960		V	U		St	EH	ES		EP				Kn						Ks	KiL		EnL	InL
			≥1960	A	V	U	EK	St	EH	ES													OP	PeP	Ks	SoL
orbata (Erichson, 1837)	LC	15	<1960	A	V	U		St		ES						KP	Kn								EnL	InL
			≥1960	A	V	U	EK	St	EH	ES			EP			PK	KP	Kn	OP	PeP						EnL
fungi (Gravenhorst, 1806)	LC	1	<1960	A	V	U	EK	St	EH	ES	LK	EP	PH	PS	PK	KP	Kn	OP	PeP	Ks			KiL	SoL	EnL	InL
			≥1960	A	V	U	EK	St	EH	ES	LK	EP	PH	PS	PK	KP	Kn	OP	PeP	Ks				KiL	SoL	EnL
amplicollis (Mulsant & Rey, 1873)	LC	6	<1960			U																				
			≥1960	A	V	U	EK	St	EH	ES			EP		PS	PK	KP	Kn			PeP	Ks		KiL		

obsoleta Ganglbauer, 1895	NA	100	<1960																				
			≥1960								PH												
kangasi Rutanen, 1994	DD	100	<1960																				
			≥1960										ES										
nana (Paykull, 1800)	LC	4	<1960	A	V	U	EK	St	EH	ES	LK	EP	PH	PS	PK	Kn	OP	PeP	Ks				
			≥1960	A	V	U	EK	St	EH	ES	LK	EP	PH	PS	PK	Kn	OP	PeP					
pseudonana Strand, 1839	NE	100*	<1960																				
			≥1960																				
gentilis Erichson, 1839	LC	10	<1960		V	U		St															
			≥1960	A	V	U	EK		EH	ES	LK		PH	PS	PK	Kn							
poweri Crotch, 1867	LC	6	<1960		V	U		St	ES														
			≥1960	A	V	U			EH	ES			PH	PS	PK	Kn							
minima Erichson, 1837	LC	15	<1960		V	U			EH	ES													
			≥1960		V	U		St	EH	ES			PH										
munsteri Strand, 1935	EN	100*	<1960																				
			≥1960			U																	
fasciata (Marsham, 1802)	LC	2	<1960	A	V	U		St	EH	ES	LK		PH	PS	PK	Kn							
			≥1960	A	V	U	EK	St	EH	ES	LK	EP	PH	PS	PK	Kn	OP	PeP	Ks				
congrua Erichson, 1837	LC	15	<1960			U			EH						Kn								
			≥1960		V	U	EK	St	EH	ES		EP	PH	PS							KiL		
williamsi Strand, 1935	LC	4	<1960		V	U			EH	ES				PS	PK	Kn							
			≥1960		V	U	EK	St	EH	ES		EP	PH	PS	PK	Kn	OP		Ks				
orientalis Strand, 1938	LC	15	<1960						EH	ES			PH	PK									
			≥1960			U	EK		EH	ES		EP	PH	PS	PK	Kn							
bihamata Thomson, 1867	LC	4	<1960		V	U		St	EH	ES		EP	PH	PS	PK	Kn							
			≥1960	A	V	U	EK	St	EH	ES	LK	EP	PH		PK	Kn	OP	PeP	KiL	SoL			
lucidula Erichson, 1837	LC	60	<1960																				
			≥1960		V	U	EK				LK				PK								
joyi Wendeler, 1924	LC	15	<1960		V	U				ES													
			≥1960	A	V	U	EK	St	EH	ES			PH	PS	PK	Kn	OP	PeP					
joyioides Wüsthoff, 1937	LC	4	<1960		V	U			EH	ES			PH	PK	Kn					KiL			
			≥1960		V	U	EK	St	EH	ES	LK	EP	PH	PS	PK	Kn	OP	PeP					
manca Erichson, 1839	LC	20	<1960		V	U			EH					PK									
			≥1960	A	V	U	EK	St	EH	ES	LK			PS	PK	Kn	OP	PeP					
strictula Erichson, 1839	LC	6	<1960		V	U		St	EH	ES			PH		Kn		OP	Ks					
			≥1960		V	U	EK		EH	ES			PH	PS	PK	Kn			Ks	KiL			
boleti (Linnaeus, 1758)	LC	2	<1960	A	V	U		St	EH	ES			PH	PK	Kn		PeP						
			≥1960	A	V	U	EK	St	EH	ES	LK	EP	PH	PS	PK	Kn	OP	PeP	Ks	SoL			
Agaricochara																							
latissima (Stephens, 1832)	NA	100	<1960																				
			≥1960	A																			
Encephalus																							
complicans Kirby, 1832	LC	6	<1960		V	U				ES			PH	PS		Kn			Ks				
			≥1960		V	U	EK	St	EH	ES	LK	EP	PH	PS	PK	Kn	OP	PeP	Ks	KiL	SoL		InL
Bolitochara																							
obliqua Erichson, 1837	VU	100	<1960																				
			≥1960		V																		
mulsanti Sharp, 1875	LC	4	<1960	A	V	U			EH	ES			PH	PK	Kn		PeP						
			≥1960	A	V	U	EK	St	EH	ES	LK	EP	PH	PS	PK	Kn	OP	PeP	Ks				
pulchra (Gravenhorst, 1806)	LC	2	<1960	A	V	U		St	EH	ES	LK	EP	PH	PS	PK	Kn	OP	PeP	Ks	KiL	SoL		
			≥1960	A	V	U	EK	St	EH	ES	LK	EP	PH	PS	PK	Kn	OP	PeP	Ks	KiL	SoL		InL
tecta Assing, 2014		100	<1960											PS									
			≥1960			U																	
Phymatura																							
brevicollis (Kraatz, 1856)	VU	80	<1960					St	EH									PeP	Ks			InL	
			≥1960																Kn	OP	PeP	Ks	

bernaueri Poppius, 1909	VU	100	<1960																	Ks									
				≥1960																									
arcticus J.Sahlberg, 1890	LC	10	<1960							PH	PK	Kn		Ks	KiL	SoL	EnL	InL											
				≥1960						St	EH	ES	LK	EP	PH	PK	KP	Kn	OP	PeP	Ks	KiL	SoL	EnL	InL				
terebrans Schiødte, 1866	NT	80	<1960	A																									
				≥1960	A																								
poppiusi Bernhauer, 1902	LC	60	<1960												Kn		Ks		SoL		InL								
				≥1960																	PeP	Ks	KiL	SoL	InL				
fennicus Kangas, 1937	NE	100*	<1960																										
				≥1960																									
vilis Mäklin, 1876	VU	80	<1960														Ks				InL								
				≥1960																		PeP		SoL	InL				
longulus Erichson, 1839	VU	100	<1960															PeP			InL								
				≥1960																	Ks		InL						
lativentris Jansson, 1928	VU	100*	<1960													KiL													
				≥1960																									
denticollis Fauvel, 1872	NE	100*	<1960																										
				≥1960																									
opacus (Block, 1799)	LC	10	<1960		U		St		ES			PS		Kn						InL									
				≥1960	A	V	U	EK		EH	ES	LK			PS	PK		OP		Ks									
erraticus Erichson, 1839	VU	100	<1960															Ks											
				≥1960																			Ks		InL				
fergussoni Joy, 1912	LC	20	<1960	A	V	U		St		ES	LK			KP		OP													
				≥1960	A	U		St		ES			PH	PK	KP	Kn	OP	PeP											
talpa (Gyllenhal, 1810)	LC	2	<1960	A	V	U		St	EH	ES	LK	EP	PH	PS	PK	KP	Kn	OP	PeP	Ks	KiL	SoL	EnL	InL					
				≥1960	A	V	U	EK	St	EH	ES		EP	PH	PK	KP	Kn	OP	PeP	Ks	KiL	SoL	EnL	InL					
subterraneus Erichson, 1839	LC	20	<1960																	OP	PeP	Ks	KiL	SoL	InL				
				≥1960																			PK		OP	PeP	Ks	SoL	InL
tibialis Heer, 1839	RE	100*	<1960	A																									
				≥1960																									
Oxytelus																													
sculptus Gravenhorst, 1806	LC	10	<1960	A	V	U		St	EH	ES	LK		PH	PS	PK		Kn		PeP										
				≥1960		V	U	EK	St	EH	ES		EP	PH	PS	PK				OP									
migrator Fauvel, 1904	LC	20	<1960																										
				≥1960	A	V	U		EH	ES			EP	PH	PK														
fulvipes Erichson, 1839	LC	15	<1960	A	V	U		EH	ES			PS	PK					PeP											
				≥1960		V	U		St	EH	ES			PS	PK						KiL								
piceus (Linnaeus, 1767)	RE	100*	<1960	A	V			St		ES			PK																
				≥1960																									
laqueatus (Marsham, 1802)	LC	1	<1960	A	V	U		St	EH	ES	LK	EP	PH	PS	PK	KP		OP	PeP	Ks	KiL	SoL	EnL	InL					
				≥1960	A	V	U	EK	St	EH	ES	LK	EP	PH	PS	PK	KP	Kn	OP	PeP	Ks	KiL	SoL	EnL	InL				
assingi Schülke, 2012	NA	100	<1960																										
				≥1960																									
Anotylus																													
insecatus (Gravenhorst, 1806)	LC	30	<1960		V	U			EH				PS																
				≥1960		V	U	EK	St	EH	ES																		
rugosus (Fabricius, 1775)	LC	2	<1960	A	V	U	EK	St	EH	ES	LK	EP	PH	PS	PK	KP	Kn	OP	PeP	Ks	KiL								
				≥1960	A	V	U	EK	St	EH	ES	LK	EP	PH	PS	PK	KP	Kn	OP	PeP	Ks	KiL	SoL	InL					
sculpturatus (Gravenhorst, 1806)	RE	100*	<1960	A	U																								
				≥1960																									
nitidulus (Gravenhorst, 1802)	LC	4	<1960	A	V	U		St	EH	ES	LK	EP	PH	PS	PK	KP	Kn	OP	PeP	Ks	KiL	SoL	EnL	InL					
				≥1960	A	V	U	EK	St	EH	ES	LK	EP	PH	PK	KP	Kn	OP	PeP	Ks	KiL	SoL	InL						
pumilus (Erichson, 1839)	NE	100*	<1960		V																								
				≥1960																									
hamatus (Fairm. & Laboulb., 1856)	NT	80	<1960	A	V	U		EH	ES	LK																			
				≥1960		U																							

scrutator Erichson, 1840	LC	40	<1960	A	V	U	St	EH	ES						PS	PK										
			≥1960	A	V	U		EH	ES				PH	PK	Kn											
bimaculatus Gyllenhal, 1810	LC	60	<1960			U			ES											PeP	Ks					
			≥1960		V	U	EK		ES	EP			PK								PeP	Ks	KiL			
palposus Zetterstedt, 1828	LC	4	<1960		V	U	St	EH	ES	LK		PH	PS	PK	KP	Kn	OP	PeP	Ks	KiL	SoL	EnL	InL			
			≥1960			U	St	ES	EP	PH	PS	PK	KP	Kn	OP	PeP	Ks	KiL					EnL	InL		
ruralis Erichson, 1840	LC	40	<1960												PS	KP		OP	PeP	Ks					InL	
			≥1960																	PeP	Ks	KiL				InL
strandii L.Benick, 1937	LC	15	<1960																	Ks	KiL	SoL	EnL	InL		
			≥1960																		PeP	Ks	KiL	SoL	EnL	InL
boops Ljungh, 1804	LC	1	<1960	A	V	U	EK	St	EH	ES	LK	EP	PH	PS	PK	KP	Kn	OP	PeP	Ks	KiL	SoL	EnL	InL		
			≥1960	A	V	U	EK	St	EH	ES	LK	EP	PH	PS	PK	KP	Kn	OP	PeP	Ks	KiL	SoL	EnL	InL		
incrassatus Erichson, 1839	LC	10	<1960	A	V	U	St	EH			EP											KiL			InL	
			≥1960	A	V	U	EK	St			EP	PH			KP	OP							KiL			
melanarius Stephens, 1833	LC	1	<1960	A	V	U	St	EH	ES	LK	EP	PH	PS	PK	KP	Kn	OP	PeP	Ks	KiL	SoL	EnL	InL			
			≥1960	A	V	U	EK	St	EH	ES	LK	EP	PH	PS	PK	KP	Kn	OP	PeP	Ks	KiL	SoL		InL		
morio Gravenhorst, 1806	LC	10	<1960	A	V	U	St	EH	ES	LK	EP		PS	PK	KP						Ks	KiL				
			≥1960	A	V	U	EK	St	EH	ES	LK	EP	PH	PS	PK	KP	Kn	OP			Ks					
excubitor Erichson, 1839	LC	60	<1960																							
			≥1960			U		EH	ES	LK			PK									Ks				
ampliventris J.Sahlberg, 1890	LC	30	<1960			U		EH	ES						KP										InL	
			≥1960		V	U		EH	ES			PH														
atratus Erichson, 1839	LC	30	<1960	A		U																				
			≥1960	A	V	U																				
melanopus (Marsham, 1802)	NA	100*	<1960																							
			≥1960			U																				
canaliculatus Gyllenhal, 1827	LC	2	<1960	A	V	U	EK	St	EH	ES	LK	EP	PH	PS	PK	KP	Kn	OP	PeP	Ks	KiL	SoL	EnL	InL		
			≥1960	A	V	U	EK	St	EH	ES		EP	PH	PS	PK	KP	Kn	OP		Ks	KiL	SoL	EnL	InL		
nitens Stephens, 1833	LC	2	<1960	A	V	U	EK	St	EH	ES	LK	EP	PH	PS	PK			OP	PeP	Ks	KiL				InL	
			≥1960	A	V	U	EK	St	EH	ES	LK	EP		PS	PK	KP	Kn	OP	PeP	Ks	KiL	SoL		InL		
latipennis J.Sahlberg, 1880	VU	100*	<1960																							
			≥1960																							InL
confusus J.Sahlberg, 1876	LC	10	<1960		V	U	St	EH	ES	LK	EP	PH	PS	PK					PeP	Ks	KiL				InL	
			≥1960	A	V	U	EK	St	EH	ES		PH	PS	PK	KP	Kn	OP	PeP	Ks					EnL	InL	
vinnulus Casey, 1884	LC	30	<1960			U	EK	St	EH	ES		EP	PH	PS	PK	KP	Kn					KiL	SoL		InL	
			≥1960			U		EH			PH	PS	PK		Kn	OP						KiL	SoL		InL	
labilis Erichson, 1840	LC	60	<1960				St	EH	ES										PeP	Ks	KiL		EnL	InL		
			≥1960													PK		OP		Ks		SoL	EnL	InL		
fuscipes Gravenhorst, 1802	LC	20	<1960	A	V	U	St	EH	ES	LK	EP	PH	PS	PK	KP	Kn	OP	PeP	Ks	KiL	SoL	EnL	InL			
			≥1960		V	U		EH	ES			PS	PK	KP	OP	PeP	Ks	KiL	SoL			InL				
kongsbergensis Munster, 1912	NT	100	<1960			U																				
			≥1960			U	EK			EP																
argus Gravenhorst, 1806	LC	2	<1960	A	V	U	St	EH	ES	LK	EP	PH	PS	PK	KP	Kn	OP	PeP	Ks	KiL	SoL	EnL	InL			
			≥1960	A	V	U	EK	St	EH	ES	LK	EP	PH	PS	PK	KP		OP	PeP	Ks	KiL	SoL	EnL	InL		
ageus Casey, 1884	LC	30	<1960															OP	PeP	Ks	KiL		EnL	InL		
			≥1960																OP	PeP	Ks	KiL			InL	
europaeus Puthz, 1966	LC	10	<1960	A	V	U	St	EH			EP	PH	PS	PK	KP	Kn	OP	PeP	Ks	KiL	SoL					
			≥1960	A	V	U	EK	St	EH		LK	EP	PH		PK	KP	Kn		PeP	Ks				InL		
cautus Erichson, 1839	NT	80	<1960	A	V	U	EK		EH	ES		PH		PK												
			≥1960			U	EK		EH		EP											Ks				
subarcticus Poppius, 1907	VU	80	<1960																			KiL	EnL			
			≥1960																							InL
pusillus Stephens, 1833	LC	40	<1960		V	U			ES					PS	KP	Kn	OP									
			≥1960	A	V	U	EK	St	EH			PH	PK			OP		Ks	KiL							
nanus Stephens, 1833	LC	10	<1960	A	V	U	St	EH	ES	LK	EP	PH			KP	Kn	OP	PeP	Ks		SoL					
			≥1960	A	V	U	EK	St	EH	ES	LK	EP	PH	PS	PK	KP	Kn	OP		Ks	KiL	SoL				

intermedius Donisthorpe, 1936	LC	4	<1960	V	U	St	EH	LK	PH	PK	OP									
			≥1960	A V U EK St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP KiL SoL InL																
batychrus (Gyllenhal, 1827)	LC	20	<1960	A	V	U	St	EH	ES	PH	Kn									
			≥1960	A V U EK St EH EP PK KP																
Phacophallus																				
parumpunctatus (Gyllenhal, 1827)	LC	40	<1960	V	U	St	EH	ES	PH	KP										
			≥1960	A V U EK EH ES EP PH PK																
Gauropterus																				
fulgidus (Fabricius, 1787)	LC	40	<1960	V	U															
			≥1960	V U EK EH PH																
Gyroyhnus																				
punctulatus (Paykull, 1789)	LC	6	<1960	A	V	U	St	EH	ES	LK	EP	PH	PS	PK	KP	Kn	PeP			
			≥1960	A V U EK St EH ES LK EP PH PS PK KP OP Ks																
fracticornis (Müller, 1776)	LC	10	<1960	A	V	U	St	EH	ES	PH	PS	Kn								
			≥1960	A V U EK St EH ES LK EP PK KP Ks																
angustus Stephens, 1833	LC	2	<1960	A	V	U	EK	St	EH	ES	LK	EP	PH	PS	PK	KP	Kn	OP		SoL
			≥1960	A V U EK St EH ES LK EP PH PS PK KP OP PeP Ks KiL EnL																
atratus (Heer, 1839)	LC	10	<1960	A	V	U	St	EH	ES	PH	KP									
			≥1960	V U EK St EH ES EP PH PS PK Kn OP PeP Ks																
Nudobius																				
lentus (Gravenhorst, 1806)	LC	2	<1960	A	V	U	St	EH	ES	LK	PH	PS	PK	KP	Kn	PeP	Ks	KiL	SoL	
			≥1960	A V U EK St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks SoL																
Hypnogyra																				
glabra (Nordmann, 1837)	VU	100	<1960																	
			≥1960	V																
Xantholinus																				
linearis (Olivier, 1795)	LC	4	<1960	A	V	U	St	EH	ES	LK	PH	PS	PK							
			≥1960	A V U EK St EH ES LK PH PS PK KP OP																
longiventris Heer, 1839	LC	20	<1960	V	U			ES	LK	EP										
			≥1960	A V U EH ES																
gallicus Coiffait, 1956	LC	60	<1960																	
			≥1960	U ES																
tricolor (Fabricius, 1787)	LC	2	<1960	A	V	U	EK	St	EH	ES	LK	EP	PH	PS	PK	KP	Kn	OP	PeP	InL
			≥1960	A V U EK St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL																
laevigatus Jacobsen, 1847	LC	6	<1960	V	U			EH	ES	PS	PK	Kn								
			≥1960	V U EK St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP Ks																
Othius																				
punctulatus (Goeze, 1777)	LC	4	<1960	V	U	St	EH	ES	LK	EP	PH	PS	PK	KP	OP					
			≥1960	A V U EK St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn																
lapidicola Kiesenwetter, 1848	LC	4	<1960	V	U	St	EH	ES	PH	PK	KP	Kn	PeP	Ks	KiL	SoL	EnL	InL		
			≥1960	A V U EK St EH ES LK PH PS PK Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL																
angustus Stephens, 1833	LC	30	<1960	A	U			EH							PeP	KiL	EnL			
			≥1960	A V U St EH ES OP PeP Ks KiL SoL EnL InL																
volans J.Sahlberg, 1876	LC	30	<1960	U				ES		PS					Ks					
			≥1960	V U St EH ES EP PK Kn PeP Ks																
subuliformis Stephens, 1833	LC	2	<1960	A	V	U	St	EH		PH	PK	KP	OP	PeP						
			≥1960	A V U EK St EH ES LK EP PH PS PK Kn OP PeP Ks																
Atrecus																				
pilicornis (Paykull, 1790)	LC	2	<1960	V	U	St	EH		PH	PS	KP	Kn	OP	PeP	Ks	KiL			InL	
			≥1960	V U EK St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL																
affinis (Paykull, 1789)	LC	6	<1960	A	V	U	St	EH	ES	PH	PK									
			≥1960	A V U EK St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks																
longiceps (Fauvel, 1873)	LC	15	<1960	V	U	St	EH		PH				PeP							
			≥1960	V U EK EH ES PH PS PK KP OP PeP Ks																
Erichsonius																				
cinerascens (Gravenhorst, 1802)	LC	4	<1960	A	V	U	St	EH	ES	LK	EP	PH	PS	PK	KP	Kn	PeP			
			≥1960	A V U EK St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks																

carbonarius (Gravenhorst, 1802)	LC	4	<1960	A	V	U	EK	St	EH	ES	LK	EP	PH	PS	PK	KP	Kn	OP	PeP	Ks		SoL			
			≥1960	A	V	U	EK	St	EH	ES	LK	EP	PH	PS	PK	KP				OP	Ks				
alpinus Eppelsheim, 1875	NT	100	<1960																						
			≥1960	A							LK														
albipes (Gravenhorst, 1802)	LC	4	<1960	A	V	U		St	EH	ES	LK		PH	PS	PK	KP	Kn	OP	PeP	Ks	KiL		EnL		
			≥1960	A	V	U	EK	St	EH	ES	LK	EP	PH	PS	PK	KP	Kn	OP		Ks	KiL	SoL		InL	
caucasicus Nordmann, 1837	EN	100*	<1960		V	U																			
			≥1960							ES															
ebeninus (Gravenhorst, 1802)	RE	100*	<1960		V	U			EH					PS	PK	KP									
			≥1960																						
concinus (Gravenhorst, 1802)	LC	6	<1960	A	V	U	EK	St	EH	ES	LK		PH	PS	PK	KP									
			≥1960	A	V	U	EK	St	EH	ES	LK	EP		PS	PK	KP	Kn	OP							
debilis (Gravenhorst, 1802)	LC	2	<1960		V	U		St	EH	ES		EP	PH	PS	PK	KP	Kn		PeP		KiL	SoL			
			≥1960	A	V	U	EK	St	EH	ES	LK	EP	PH	PS	PK	KP			OP		Ks	KiL		InL	
splendens (Fabricius, 1793)	LC	6	<1960	A	V	U	EK	St	EH	ES	LK	EP	PH	PS	PK										
			≥1960	A	V	U	EK	St	EH	ES	LK	EP	PH	PS	PK		Kn		PeP	Ks				InL	
punctus (Gravenhorst, 1802)	RE	100*	<1960		V	U																			
			≥1960																						
fumarius (Gravenhorst, 1806)	NE	100	<1960						EH																
			≥1960	A					EH																
umbratilis (Gravenhorst, 1802)	LC	4	<1960	A	V	U		St	EH	ES	LK	EP	PH	PS		KP									
			≥1960	A	V	U	EK	St	EH	ES	LK	EP	PH	PS	PK				OP						
nigrita (Gravenhorst, 1806)	LC	2	<1960	A	V	U		St	EH	ES		EP	PH	PS	PK	KP	Kn	OP	PeP	Ks	KiL	SoL		InL	
			≥1960	A	V	U	EK	St	EH	ES	LK	EP	PH	PS	PK	KP	Kn	OP	PeP	Ks	KiL	SoL			
laevicollis (Lacordaire, 1835)	NA	100	<1960																						
			≥1960								LK														
longicornis Stephens, 1832	LC	60	<1960	A	V	U		St	EH	ES		EP	PH	PS	PK		Kn			Ks					
			≥1960		V	U	EK		EH	ES		EP									Ks				
parvicornis (Gravenhorst, 1802)	LC	30	<1960	A	V	U		St	EH	ES	LK		PH	PS	PK	KP		OP	PeP	Ks					
			≥1960	A	V	U	EK	St	EH	ES	LK				PK					Ks					
rubripennis Stephens, 1832	LC	10	<1960		V	U		St	EH	ES	LK		PH	PS	PK										
			≥1960		V	U	EK		EH	ES	LK		PH	PS	PK										
furcifer Renkonen, 1937	LC	20	<1960		V	U			EH									OP	PeP	Ks	KiL	SoL			
			≥1960	A	V	U			EH				PH		KP			OP		Ks					
micans (Gravenhorst, 1802)	LC	20	<1960	A	V	U		St	EH	ES	LK	EP	PH	PS	PK	KP	Kn	OP	PeP	Ks					
			≥1960	A	V	U	EK	St	EH	ES	LK	EP	PH	PS	PK	KP	Kn	OP	PeP						
micantoides Benick & Lohse, 1956	LC	4	<1960																						
			≥1960	A	V	U	EK	St	EH		LK			PS	PK	KP	Kn	OP	PeP						
Neobisnius																									
villosulus (Stephens, 1833)	LC	80	<1960			U																			
			≥1960			U	EK		EH																
lathrobioides (Baudi, 1848)	LC	20	<1960			U		St	EH																
			≥1960	A	V	U	EK		EH	ES			PH	PS	PK							SoL			
procerulus (Gravenhorst, 1806)	NA	100*	<1960			U																			
			≥1960																						
Cafius																									
xantholoma (Gravenhorst, 1806)	LC	30	<1960	A	V	U																			
			≥1960	A	V	U	EK																		
Dinothenarus																									
pubescens (DeGeer, 1774)	VU	60	<1960	A	V	U	EK	St	EH	ES	LK	EP	PH	PS	PK	KP	Kn	OP	PeP						
			≥1960		V	U	EK		EH	ES	LK		PH	PS			Kn								
Ontholestes																									
tessellatus (Geoffroy, 1785)	LC	6	<1960	A	V	U	EK	St	EH	ES		EP	PH	PS	PK	KP	Kn	OP	PeP	Ks		SoL	EnL	InL	
			≥1960	A	V	U	EK	St	EH	ES	LK	EP	PH	PS	PK	KP	Kn	OP	PeP	Ks		KiL		EnL	
murinus (Linnaeus, 1758)	LC	10	<1960	A	V	U	EK	St	EH	ES		EP	PH	PS	PK	KP	Kn	OP	PeP		KiL	SoL		InL	
			≥1960	A	V	U	EK	St	EH	ES	LK	EP		PS	PK							KiL		InL	

fulgidus (Fabricius, 1793)	RE	100	<1960																	KiL				
			≥1960						EP															
mesomelinus (Marsham, 1802)	LC	2	<1960	A	V	U	EK	St	EH	ES		EP	PH	PS	PK	KP	Kn			PeP	KiL			
			≥1960	A	V	U	EK	St	EH	ES	LK	EP	PH	PS	PK	KP	Kn	OP	PeP	Ks	KiL			
maurus (Sahlberg, 1830)	LC	4	<1960		V	U		St	EH				PH	PS	PK	KP								
			≥1960	A	V	U	EK	St	EH	ES	LK	EP	PH	PS	PK		Kn	OP	PeP					
cruentus (Olivier, 1795)	LC	20	<1960	A	V	U			EH	ES			PH	PS	PK									
			≥1960	A	V	U	EK	St	EH	ES	LK	EP		PS										
brevicornis (Thomson, 1860)	LC	15	<1960		V	U																		
			≥1960	A	V	U	EK	St	EH	ES	LK	EP	PH	PS	PK	KP	Kn	OP	PeP	Ks				
puncticollis (Thomson, 1867)	VU	100	<1960			U			EH															
			≥1960			U																		
brevis Erichson, 1840	LC	4	<1960	A	V	U		St	EH	ES			PH	PS	PK	KP						KiL		InL
			≥1960	A	V	U	EK	St	EH	ES	LK		PH	PS	PK	KP	Kn	OP	PeP	Ks	KiL	SoL		InL
vexans Eppelsheim, 1881	NA	100	<1960																					
			≥1960			U				LK														
microps Gravenhorst, 1847	NT	30	<1960		V	U																		
			≥1960	V	U	EK		EH	ES	LK		PH	PS	PK		Kn								
lundbergi Palm, 1972	VU	60	<1960																					
			≥1960											PK		Kn	OP	PeP	Ks					
tenellus (Gravenhorst, 1806)	LC	4	<1960		V	U			EH			EP	PH			KP								
			≥1960	V	U	EK	St	EH	ES		EP	PH	PS	PK	KP	Kn	OP	PeP	Ks	KiL	SoL			
scitus (Gravenhorst, 1806)	LC	10	<1960	A	V	U		St	EH	ES			PH	PS	PK									
			≥1960	A	V	U	EK	St	EH	ES	LK		PH	PS	PK									
xanthopus Erichson, 1839	LC	2	<1960	A	V	U		St	EH	ES	LK		PH	PS	PK	KP	Kn			PeP				
			≥1960	A	V	U	EK	St	EH	ES	LK	EP	PH	PS	PK	KP	Kn	OP	PeP	Ks	KiL			
cinctus (Paykull, 1790)	LC	20	<1960	A	V	U		St	EH	ES		EP	PH			KP	Kn							
			≥1960	A	V	U	EK	St	EH	ES		EP	PH		PK									
plagiatus Mannerheim, 1843	LC	2	<1960	A	V	U	EK	St	EH	ES		EP	PH	PS	PK	KP	Kn	OP	PeP	Ks	KiL	SoL		InL
			≥1960	A	V	U	EK	St	EH	ES	LK	EP	PH	PS	PK	KP	Kn	OP	PeP	Ks	KiL	SoL	EnL	InL
fuliginosus (Gravenhorst, 1802)	LC	2	<1960	A	V	U		St	EH	ES	LK	EP	PH	PS	PK	KP	Kn			PeP				
			≥1960	A	V	U	EK	St	EH	ES	LK	EP	PH	PS	PK	KP	Kn	OP	PeP	Ks	KiL	SoL		
curtipennis Bernhauer, 1908	LC	10	<1960	A	V	U			EH				PS											
			≥1960	A	V	U	EK	St	EH	ES	LK				PK						KiL			
subunicolor Korge, 1961	LC	30	<1960						EH															InL
			≥1960	A	V										PS	PK	KP				KiL	SoL	EnL	InL
molochinus (Gravenhorst, 1806)	LC	2	<1960	A	V	U	EK	St	EH	ES	LK	EP	PH	PS	PK	KP	Kn	OP	PeP	Ks	KiL		EnL	InL
			≥1960	A	V	U	EK	St	EH	ES		EP	PH	PS	PK	KP	Kn	OP	PeP	Ks	KiL	SoL	EnL	InL
lucidulus Erichson, 1839	LC	6	<1960	A	V	U			EH	ES														
			≥1960	A	V	U	EK	St	EH	ES		EP	PH	PS	PK	KP		OP	PeP	Ks		SoL		
picipes (Mannerheim, 1830)	NT	80	<1960		V	U				ES														
			≥1960	A	V	U																		
nemoralis Baudi, 1848	NE	100	<1960			U																		
			≥1960		V				EH															
umbrinus Erichson, 1839	LC	6	<1960	A	V	U		St	EH	ES			PS	PK	KP	Kn	OP	PeP	Ks	KiL	SoL		InL	
			≥1960	A	V	U	EK	St	EH	ES			PH	PS	PK	KP		OP						InL
fumatus (Stephens, 1833)	NE	100*	<1960																					
			≥1960					EH																
sublimbatus Mäklin, 1853	LC	40	<1960																		KiL		EnL	InL
			≥1960																					
nigriceps Kraatz, 1857	LC	60	<1960		V																			
			≥1960	A	V	U			EH			EP												
pseudolimbatus Strand, 1938		80	<1960																					
			≥1960																	PeP	Ks		SoL	
limbatus (Heer, 1834)	LC	4	<1960		V	U		St	EH	ES			PH	PS	PK	KP	Kn	OP	PeP		KiL		InL	
			≥1960	A	V	U	EK	St	EH	ES		EP	PH	PS	PK	KP	Kn	OP						

fossor (Linnaeus, 1758)	LC	4	<1960	A	V	U	EK	St	EH	ES	LK	EP	PH	PS	PK	KP								
			≥1960	A	V	U	EK	St	EH	ES	LK	EP	PH	PS	PK	KP								
haemorrhoidalis (Linnaeus, 1758)	LC	10	<1960	A	V	U	EK	St	EH	ES	LK	EP		PS	PK	KP								
			≥1960	A	V	U	EK	St	EH	ES	LK	EP	PH	PS	PK									
brevis Erichson, 1848	LC	40	<1960	A	V							EP												
			≥1960	A	V	U									PK									
arenarius (Olivier, 1789)	RE	100*	<1960						ES															
			≥1960		V																			
rufipes (Linnaeus, 1758)	LC	2	<1960	A	V	U	EK	St	EH	ES	LK	EP	PH	PS	PK	KP	Kn	OP	PeP	Ks				
			≥1960	A	V	U	EK	St	EH	ES	LK	EP	PH	PS	PK	KP	Kn	OP	PeP	Ks	KiL			
depressus (Kugelann, 1792)	LC	2	<1960	A	V	U	EK	St	EH	ES	LK	EP	PH	PS	PK	KP	Kn	OP	PeP	Ks	KiL	SoL		
			≥1960	A	V	U	EK	St	EH	ES	LK	EP	PH	PS	PK	KP	Kn	OP	PeP	Ks	KiL	SoL		
luridus (Fabricius, 1775)	RE	100*	<1960		V	U		St																
			≥1960																					
pusillus (Herbst, 1789)	NT	10	<1960	A	V	U	EK	St	EH	ES	LK	EP	PH	PS	PK	KP	Kn	OP			KiL			
			≥1960	A	V	U	EK	St	EH	ES	LK	EP	PH	PS	PK	KP	Kn	OP						
coenosus (Panzer, 1798)	RE	100*	<1960		V	U			EH	ES	LK													
			≥1960																					
contaminatus (Herbst, 1783)	NT	80	<1960	A																				
			≥1960	A																				
conspurcatus (Linnaeus, 1758)	LC	40	<1960	A	V	U	EK	St	EH	ES	LK	EP	PH	PS	PK	KP								
			≥1960	A		U	EK	St	EH	ES		EP		PS	PK									
paykulli Bedel, 1907	NT	100	<1960																					
			≥1960	A																				
distinctus (Müller, 1776)	LC	20	<1960	A	V	U	EK	St	EH	ES				PS	PK	KP								
			≥1960	A	V	U	EK	St	EH	ES	LK					PK								
punctatosulcatus Sturm, 1805	NT	40	<1960	A		U			ES	LK					PK									
			≥1960	A		U			EH	ES	LK			PH		PK				OP	PeP			
sphacelatus (Panzer, 1798)	VU	60	<1960	A	V	U	EK	St	EH	ES		EP	PH	PS	PK	KP	Kn	OP						
			≥1960	A		U	EK		EH						PK									
prodromus (Brahm, 1790)	LC	4	<1960	A	V	U	EK	St	EH	ES	LK	EP	PH	PS	PK					Ks				
			≥1960	A	V	U	EK	St	EH	ES	LK	EP	PH	PS	PK				OP	Ks				
serotinus (Creutzer, 1799)	EN	100	<1960		V																			
			≥1960						EH	ES														
tomentosus (Müller, 1776)	NA	100*	<1960												PK									
			≥1960																					
merdarius (Fabricius, 1775)	EN	80	<1960	A	V	U	EK	St	EH	ES	LK	EP	PH	PS	PK									
			≥1960		V	U	EK			ES			PH											
fimetarius (Linnaeus, 1758)	LC	2	<1960	A	V	U	EK	St	EH	ES	LK	EP	PH	PS	PK	KP	Kn	OP	PeP	Ks	KiL	SoL	InL	
			≥1960	A	V	U	EK	St	EH	ES	LK	EP	PH	PS	PK	KP	Kn	OP	PeP	Ks				
foetens (Fabricius, 1787)	NT	30	<1960	A	V	U		St	EH	ES		EP	PH	PS	PK	KP		OP				SoL		
			≥1960	A		U	EK		EH	ES	LK		PH		PK	KP								
fasciatus (Olivier, 1789)	LC	2	<1960		V	U		St	EH	ES		EP	PH	PS	PK	KP	Kn		PeP		KiL	SoL	InL	
			≥1960	A	V	U	EK	St	EH	ES	LK	EP	PH	PS	PK		Kn		PeP	Ks	KiL	SoL	EnL	InL
borealis Gyllenhal, 1827	LC	2	<1960	A	V	U		St	EH	ES		EP	PH	PS	PK	KP		OP	PeP	Ks	KiL		EnL	InL
			≥1960	A	V	U	EK	St	EH	ES	LK	EP	PH	PS	PK	KP	Kn	OP	PeP	Ks	KiL	SoL	EnL	InL
nemoralis Erichson, 1848	LC	4	<1960	A	V	U		St	EH				PH		PK									
			≥1960		V	U	EK	St	EH	ES		EP		PS	PK		Kn	OP	PeP	Ks				
lapponum Gyllenhal, 1806	LC	6	<1960		V	U			EH			EP	PH				Kn		PeP	Ks	KiL	SoL	EnL	InL
			≥1960			U	EK	St	EH	ES					PK	KP	Kn	OP	PeP	Ks	KiL	SoL	EnL	InL
piceus Gyllenhal, 1808	LC	4	<1960		V	U			EH			EP	PH		PK	KP	Kn	OP	PeP	Ks	KiL	SoL	EnL	InL
			≥1960	A	V	U	EK	St	EH	ES			PH	PS	PK		Kn	OP	PeP	Ks	KiL	SoL	EnL	InL
ater (DeGeer, 1774)	LC	4	<1960	A	V	U	EK	St	EH	ES	LK	EP	PH	PS	PK	KP	Kn	OP						
			≥1960	A	V	U	EK	St	EH	ES	LK		PH	PS	PK		Kn			Ks		SoL		
sordidus (Fabricius, 1775)	VU	40	<1960	A	V	U	EK	St	EH	ES	LK	EP	PH	PS	PK	KP	Kn			Ks				
			≥1960	A		U	EK	St	EH	ES	LK					PK	Kn							

<i>formaneki</i> Jacobson, 1913	LC	30	<1960																								
			≥1960		U	St	EH	ES			PH	PK			OP						SoL						
Chrysobothris																											
<i>chrysostigma</i> (Linnaeus, 1758)	LC	6	<1960		V	U	St	EH	ES		EP	PH	PS	PK	KP		OP	PeP	Ks	KiL	SoL						
			≥1960		V	U	EK	St	EH	ES	LK	EP	PH	PS	PK	KP	Kn	OP	PeP	Ks	KiL	SoL					
Agrilus																											
<i>ater</i> (Linnaeus, 1767)	VU	60	<1960		V	U																					
			≥1960			U		EH																			
<i>laticornis</i> (Illiger, 1803)	VU	100*	<1960			U																					
			≥1960			U																					
<i>sulcicollis</i> Lacordaire, 1835	NT	80	<1960		V	U		EH																			
			≥1960		V																						
<i>mendax</i> Mannerheim, 1837	LC	30	<1960		V	U	St	EH							PK												
			≥1960		V	U		EH	ES			PH															
<i>subauratus</i> Gebler, 1833	LC	60	<1960		V	U	St	EH						PK													
			≥1960			U	EK	EH	ES					PK													
<i>pratensis</i> (Ratzeburg, 1837)	LC	40	<1960		V	U	EK	EH	ES						Kn												
			≥1960		V	U		EH	ES	LK									OP								
<i>pseudocyanus</i> Kiesenw., 1857 <i>delphinensis</i> auct. nec Abeille de Perrin, 1897	CR	100*	<1960										PS														
			≥1960																								
<i>betuleti</i> (Ratzeburg, 1837)	LC	30	<1960		V	U	EK		ES					PK													
			≥1960		V	U	EK	St	EH	ES	LK	PH	PK														
<i>integerrimus</i> (Ratzeburg, 1837)	EN	100	<1960		V			EH																			
			≥1960					EH	ES																		
<i>viridis</i> (Linnaeus, 1758)	LC	4	<1960		A	V	U	EK	St	EH	ES	LK	EP	PH	PS	PK	KP		OP	PeP	Ks	KiL					
			≥1960		V	U	EK	St	EH	ES	LK	EP	PH	PS	PK	KP		OP	PeP		KiL			InL			
<i>cuprescens</i> Ménériés, 1832	NE	100	<1960		V			ES																			
			≥1960		V																						
<i>paludicola</i> Krogerus, 1922	LC	4	<1960		V	U	St	EH	ES			PH	PK	KP							KiL						
			≥1960		V	U	EK	St	EH	ES	LK	EP	PH	PS	PK	KP		OP	PeP	Ks							
Trachys																											
<i>minutus</i> (Linnaeus, 1758)	LC	4	<1960		A	V	U	EK	St	EH	ES	LK		PH	PS	PK	KP		OP								
			≥1960		A	V	U	EK	St	EH	ES	LK	EP	PH	PS	PK	KP	Kn									
Habroloma																											
<i>nanum</i> (Paykull, 1799)	LC	30	<1960		A	V	U	St	EH	ES	LK		PH	PK													
			≥1960		A	V	U	EK	St	EH	ES																
Byrrhidae																											
Simplocaria																											
<i>semistriata</i> (Fabricius, 1794)	LC	2	<1960		A	V	U	EK	St	EH	ES	LK	EP	PH	PS	PK	KP		OP	PeP	Ks	KiL					
			≥1960		A	V	U	EK	St	EH	ES	LK	EP	PH	PS	PK	KP	Kn	OP	PeP	Ks		SoL		InL		
<i>metallica</i> (Sturm, 1807)	LC	60	<1960			V																		EnL			
			≥1960																				KiL	EnL	InL		
Morychus																											
<i>aeneus</i> (Fabricius, 1775)	LC	10	<1960		V	U	St	EH	ES						KP		OP										
			≥1960			U	EK	EH	ES	LK		PH	PK	KP	Kn	OP		Ks									
Arctobyrrhus																											
<i>dovrensis</i> Münster, 1902	NT	80	<1960																						InL		
			≥1960																					EnL	InL		
Cytilus																											
<i>sericeus</i> (Forster, 1771)	LC	1	<1960		A	V	U	EK	St	EH	ES	LK	EP	PH	PS	PK	KP		OP	PeP	Ks	KiL	SoL		InL		
			≥1960		A	V	U	EK	St	EH	ES	LK	EP	PH	PS	PK	KP	Kn	OP	PeP	Ks	KiL	SoL	EnL	InL		
<i>auricomus</i> (Duftschmid, 1825)	LC	2	<1960		A	V	U	St	EH	ES		EP	PH	PS	PK	KP	Kn	OP	PeP	Ks	KiL	SoL		InL			
			≥1960		A	V	U	EK	EH	ES	LK	EP	PH	PS	PK	KP	Kn	OP	PeP	Ks	KiL	SoL	EnL	InL			
Byrrhus																											
<i>fasciatus</i> (Forster, 1771)	LC	1	<1960		A	V	U	St	EH	ES	LK	EP	PH	PS	PK	KP	Kn	OP	PeP	Ks	KiL	SoL	EnL	InL			
			≥1960		A	V	U	EK	St	EH	ES	LK		PH	PS	PK	KP	Kn	OP	PeP	Ks	KiL	SoL	EnL	InL		

Heteroceridae**Heterocerus**

flexuosus Stephens, 1829	EN	100	<1960	A	U	St							KP						
				≥1960	A	V	U	EK						KP					
obsoletus Curtis, 1828	NT	100	<1960	A															
				≥1960	A	V													
marginatus (Fabricius, 1787)	LC	30	<1960	V	U	St	EH	ES											
				≥1960	V	U	St	EH	LK										
fenestratus (Thunberg, 1784)	LC	30	<1960	A	V	U	St	EH				PK							
				≥1960	A	V	U	EK	St	EH	LK								
fuscus Kiesenwetter, 1843	LC	10	<1960	A	V	U	St	EH	ES	EP	PH	PS	PK	KP	OP				
				≥1960	A	V	U	EK	St	EH	ES	LK	PH	PK	Kn				

Augyles

hispidulus (Kiesenwetter, 1843)	NT	80	<1960				ES				PK	KP					
				≥1960	U							KP	OP				
intermedius (Kiesenwetter, 1843)	LC	40	<1960	A	U		EH	LK					OP				
				≥1960	A	U	EK	St	EH	ES		PH	PS	PK	OP		

Psephenidae**Eubria**

palustris (Germar, 1818)	VU	100*	<1960														
				≥1960							PK						

Eucnemidae**Melasis**

buprestoides (Linnaeus, 1761)	EN	100	<1960				EH										
				≥1960	A												

Hylochaeres

cruentatus (Gyllenhal, 1808)	EN	100	<1960	V													
				≥1960	U		EH										

Xylophilus

corticalis (Paykull, 1800)	EN	100	<1960														
				≥1960			EH										

Hylis

procerulus (Mannerheim, 1823)	LC	10	<1960	V	U	St												
				≥1960	V	U	EK	St	EH	ES	LK	PH	PS	PK				
cariniceps (Reitter, 1902)	NT	100	<1960	A														
				≥1960	A	V												
foveicollis (Thomson, 1874)	LC	80	<1960	V	U													
				≥1960	A	V												
olexai (Palm, 1955)	NA	100	<1960															
				≥1960	A		EK											

Microrhagus

lepidus Rosenhauer, 1847	LC	30	<1960	V	U	St												
				≥1960	V	U	EK	St	EH	ES		PH	PS	PK				
pygmaeus (Fabricius, 1792)	LC	10	<1960	A	V	U	EK	St	EH	ES								
				≥1960	A	V	U	EK	St	EH	ES	LK	EP	PS	PK	KP		

Dirrhagofarsus

attenuatus (Mäklin, 1845)	CR	100	<1960														
				≥1960	U												

Rhacopus

sahlbergi (Mannerheim, 1823)	NT	80	<1960	V	U	St	EH			PH		KP					
				≥1960	A	V		EH							OP	PeP	Ks

Eucnemis

capucina Ahrens, 1812	NT	20	<1960								PS						
				≥1960	A	V	U	EK	EH	ES	LK	PH	PS	PK			

Pheletes

<i>aeneoniger</i> (DeGeer, 1774)	LC	2	<1960	A	V	U	EK	St	EH	ES	LK	EP	PH	PS	PK	KP	Kn	OP	PeP	Ks	KiL	SoL		InL
			≥1960	A	V	U	EK	St	EH	ES	LK	EP	PH	PS	PK	KP	Kn	OP	PeP	Ks	KiL	SoL	EnL	

Diacanthous

<i>undulatus</i> (DeGeer, 1774)	LC	4	<1960		V	U		St	EH				PH	PS	PK	KP	Kn	OP	PeP	Ks	KiL		EnL	InL
			≥1960			U	EK		EH	ES	LK	EP	PH	PS	PK	KP	Kn	OP	PeP	Ks	KiL	SoL	EnL	InL

Denticollis

<i>linearis</i> (Linnaeus, 1758)	LC	1	<1960	A	V	U	EK	St	EH	ES	LK	EP	PH	PS	PK	KP	Kn	OP	PeP	Ks	KiL	SoL	EnL	InL
			≥1960	A	V	U	EK	St	EH	ES	LK	EP	PH	PS	PK	KP	Kn	OP	PeP	Ks	KiL	SoL	EnL	InL
<i>borealis</i> (Paykull, 1800)	LC	15	<1960			U		St	EH	ES			PH	PS	PK	KP					KiL		EnL	InL
			≥1960			U			EH	ES	LK		PH	PS	PK		Kn	OP	PeP	Ks	KiL	SoL	EnL	InL

Cidnopus

<i>aeruginosus</i> (Olivier, 1790)	LC	10	<1960	A	V	U		St	EH	ES	LK	EP	PH	PS	PK	KP	Kn		PeP	Ks				
			≥1960	A	V	U		St	EH	ES	LK				PK	KP	Kn	OP		Ks				

Limonius

<i>minutus</i> (Linnaeus, 1758)	LC	30	<1960	A	V	U																		
			≥1960	A	V																			

Ctenicera

<i>pectinicornis</i> (Linnaeus, 1758)	LC	6	<1960	A	V	U	EK	St	EH	ES	LK	EP	PH	PS	PK	KP	Kn	OP						
			≥1960	A	V	U	EK	St	EH	ES	LK	EP	PH	PS	PK	KP	Kn	OP	PeP					
<i>cuprea</i> (Fabricius, 1775)	LC	10	<1960										PH		PK	KP	Kn	OP		Ks				
			≥1960											PS	PK	KP	Kn	OP	PeP	Ks				

Liotrichus

<i>affinis</i> (Paykull, 1800)	LC	4	<1960		V	U		St	EH	ES		EP	PH	PS	PK	KP	Kn	OP	PeP	Ks	KiL	SoL	EnL	InL
			≥1960	A	V	U	EK	St	EH	ES		EP	PH	PS	PK	KP	Kn	OP	PeP	Ks	KiL	SoL	EnL	InL

Orithales

<i>serraticornis</i> (Paykull, 1800)	LC	2	<1960		V	U		St	EH		LK	EP	PH	PS	PK	KP	Kn	OP	PeP	Ks	KiL	SoL	EnL	InL
			≥1960	A	V	U	EK	St	EH	ES		EP	PH	PS	PK	KP	Kn	OP	PeP	Ks	KiL	SoL	EnL	InL

Actenicerus

<i>sjaelandicus</i> (Müller, 1764)	LC	2	<1960	A	V	U	EK	St	EH	ES	LK	EP	PH	PS	PK	KP	Kn	OP	PeP	Ks				InL
			≥1960	A	V	U	EK	St	EH	ES	LK	EP	PH	PS	PK	KP	Kn	OP	PeP	Ks				

Prosternon

<i>tessellatum</i> (Linnaeus, 1758)	LC	2	<1960	A	V	U	EK	St	EH	ES	LK	EP	PH	PS	PK	KP	Kn	OP	PeP		KiL	SoL	EnL	InL
			≥1960	A	V	U	EK	St	EH	ES	LK	EP	PH	PS	PK	KP	Kn	OP	PeP	Ks	KiL		InL	

Anostirus

<i>castaneus</i> (Linnaeus, 1758)	LC	6	<1960	A	V	U	EK	St	EH	ES		EP	PH	PS	PK	KP		OP						InL
			≥1960	A	V	U	EK	St	EH	ES	LK	EP	PH	PS	PK	KP	Kn	OP		Ks		SoL		

Pseudanostirus

<i>globicollis</i> (Germar, 1843)	VU	80	<1960		V																			
			≥1960		V																			

Aplotarsus

<i>incanus</i> (Gyllenhal, 1827)	LC	2	<1960		V	U	EK	St	EH	ES	LK	EP	PH	PS	PK	KP	Kn	OP	PeP	Ks	KiL	SoL	EnL	InL
			≥1960	A	V	U	EK	St	EH	ES	LK	EP	PH	PS	PK	KP	Kn	OP	PeP	Ks	KiL	SoL		InL

Paraphotistus (Selatosomus (part.))

<i>impressus</i> (Fabricius, 1792)	LC	2	<1960	A	V	U	EK	St	EH	ES	LK	EP	PH	PS	PK	KP	Kn	OP	PeP	Ks	KiL	SoL	EnL	InL
			≥1960	A	V	U	EK	St	EH	ES	LK	EP	PH	PS	PK	KP	Kn	OP	PeP	Ks	KiL	SoL	EnL	InL
<i>nigricornis</i> (Panzer, 1799)	NT	60	<1960		V	U		St					PH		PK	KP	Kn			Ks				
			≥1960		V	U	EK		EH															

Selatosomus

<i>cruciatus</i> (Linnaeus, 1758)	LC	6	<1960	A	V	U	EK	St	EH	ES	LK		PH	PS	PK	KP	Kn	OP	PeP					
			≥1960	A	V	U	EK	St	EH	ES	LK	EP	PH	PS	PK		Kn	OP	PeP	Ks				
<i>melancholicus</i> (Fabricius, 1798)	LC	2	<1960		V	U	EK	St	EH	ES	LK	EP	PH	PS	PK	KP	Kn	OP	PeP	Ks	KiL	SoL	EnL	InL
			≥1960		V	U	EK	St	EH	ES	LK	EP	PH	PS	PK	KP	Kn	OP	PeP	Ks	KiL	SoL	EnL	InL
<i>aeneus</i> (Linnaeus, 1758)	LC	2	<1960	A	V	U	EK	St	EH	ES	LK	EP	PH	PS	PK	KP	Kn	OP	PeP	Ks	KiL	SoL	EnL	InL
			≥1960	A	V	U	EK	St	EH	ES	LK	EP	PH	PS	PK	KP	Kn	OP	PeP	Ks	KiL	SoL	EnL	InL

Eanus

<i>costalis</i> (Paykull, 1800)	LC	2	<1960				St	EH		LK	EP	PH	PS	PK	KP	Kn	OP	PeP	Ks	KiL	SoL	EnL	InL
			≥1960				EK St	EH ES			EP	PH PS	PK	KP	Kn	OP	PeP	Ks	KiL	SoL	EnL	InL	

Negastrius

<i>pulchellus</i> (Linnaeus, 1761)	LC	40	<1960			U	St								KP		OP	PeP	Ks	KiL	SoL		InL
			≥1960	A	U		St								KP		OP	PeP	Ks	KiL	SoL		InL

<i>arenicola</i> (Boheman, 1854)	NE	15	<1960																				
			≥1960			U												PeP					InL

Zorochros

<i>minimus</i> (Lacordaire, 1835)	LC	10	<1960	A	V	U	St				EP				KP		OP	PeP	Ks		SoL		InL
			≥1960	A	V	U	EK St				EP				PK	KP	Kn	OP	PeP	Ks	KiL	SoL	InL

Fleutiauxellus

<i>maritimus</i> (Curtis, 1840)	NT	80	<1960																		KiL		
			≥1960																				EnL InL

<i>algidus</i> (J.Sahlberg, 1883)	NT	100	<1960															PeP	Ks	KiL			InL
			≥1960																Ks				InL

Neohypdonus

<i>arcticus</i> Candèze, 1860	LC	40	<1960																	Ks	KiL		InL
			≥1960				St													Ks	KiL	SoL	EnL InL

Ampedus

<i>cinnabarinus</i> (Eschscholtz, 1829)	EN	100	<1960	A	V	U	St	EH	ES														
			≥1960				EK	EH ES															

<i>sanguineus</i> (Linnaeus, 1758)	EN	100	<1960		V	U		EH	ES		EP				KP								
			≥1960		U		St	ES						PK									

<i>pomona</i> (Stephens, 1830)	LC	4	<1960		V	U	EK	St	EH	ES	LK	EP	PH	PS	PK	KP	Kn	OP			KiL		
			≥1960	A	V	U	EK St	EH ES	LK	EP	PH	PS	PK	KP	Kn	OP	PeP	Ks	KiL	SoL			

<i>sanguinolentus</i> (Schrank, 1776)	LC	30	<1960	A	V	U	EK	St	EH						PK								
			≥1960	A	V	U	EK St	EH															

<i>nigroflavus</i> (Goeze, 1777)	LC	15	<1960	A	V	U							PH	PS									
			≥1960	A	V	U	EK St	EH ES					PH	PS	PK								

<i>pomorum</i> (Herbst, 1784)	LC	4	<1960	A	V	U	EK	St	EH	ES	LK	EP	PH	PS	PK	KP							
			≥1960	A	V	U	EK St	EH ES	LK	EP	PH	PS	PK	KP	Kn	OP	PeP	Ks					

<i>suecicus</i> Palm, 1976	LC	40	<1960		V		St	EH			EP	PH			Kn								
			≥1960					EH ES				PH	PS	PK	Kn		PeP	Ks					

<i>balteatus</i> (Linnaeus, 1758)	LC	2	<1960	A	V	U	EK	St	EH	ES	LK	EP	PH	PS	PK	KP	Kn	OP	PeP	Ks			
			≥1960	A	V	U	EK St	EH ES	LK	EP	PH	PS	PK	KP	Kn	OP	PeP	Ks	KiL				

<i>lepidus</i> (Mäklin, 1876)	VU	80	<1960													Kn							
			≥1960													PK	Kn	PeP					

<i>praeustus</i> (Fabricius, 1792)	VU	60	<1960	A	V	U	St	EH	ES			PH	PS	PK									
			≥1960		V	U		EH ES		EP													

<i>tristis</i> (Linnaeus, 1758)	LC	1	<1960	A	V	U	EK	St	EH	ES	LK	EP	PH	PS	PK	KP	Kn	OP	PeP	Ks	KiL	SoL	EnL	InL
			≥1960	A	V	U	EK St	EH ES	LK	EP	PH	PS	PK	KP	Kn	OP	PeP	Ks	KiL	SoL		InL		

<i>erythronus</i> (Müller, 1821)	LC	6	<1960		V	U	St	EH	ES	LK		PH	PS	PK	KP								
			≥1960		V	U	EK St	EH ES			EP	PH	PS	PK	KP				Ks				

<i>nigrinus</i> (Herbst, 1784)	LC	1	<1960	A	V	U	EK	St	EH	ES		EP	PH	PS	PK	KP	Kn	OP	PeP	Ks	KiL	SoL	EnL	InL
			≥1960	A	V	U	EK St	EH ES	LK	EP	PH	PS	PK	KP	Kn	OP	PeP	Ks	KiL	SoL	EnL	InL		

Sericus

<i>brunneus</i> (Linnaeus, 1758)	LC	1	<1960	A	V	U	EK	St	EH	ES	LK	EP	PH	PS	PK	KP	Kn	OP	PeP	Ks	KiL	SoL	EnL	InL
			≥1960	A	V	U	EK St	EH ES	LK	EP	PH	PS	PK	KP	Kn	OP	PeP	Ks	KiL	SoL	EnL	InL		

Agriotes

<i>ustulatus</i> (Schaller, 1783)	NE	100*	<1960						ES														
			≥1960																				

<i>lineatus</i> (Linnaeus, 1767)	LC	6	<1960	A	V	U	EK	St	EH	ES	LK	EP		PS				OP					
			≥1960	A	V	U	EK St	EH ES	LK	EP				PS	PK	KP		OP					

<i>obscurus</i> (Linnaeus, 1758)	LC	4	<1960	A	V	U	EK	St	EH	ES	LK	EP	PH	PS	PK	KP	Kn	OP					
			≥1960	A	V	U	EK St	EH ES	LK	EP	PH	PS	PK	KP	Kn	OP	PeP	Ks	KiL				

raptor Sturm, 1837	LC	4	<1960	A	V	U	EK	St	EH	ES		EP	PH	PS	PK	KP	Kn	OP	PeP	Ks	KiL			InL			
			≥1960	A	V	U		St	EH	ES	LK	EP	PH	PS	PK	KP	Kn			Ks							
Dryophilus																											
pusillus (Gyllenhal, 1808)	LC	40	<1960	A	V	U																					
			≥1960	A	V	U																					
Xestobium																											
rufovillosum (DeGeer, 1774)	NT	80	<1960	A																							
			≥1960	A																							
Episernus																											
angulicollis Thomson, 1863	LC	10	<1960			U	EK		EH		LK		PH		PK		Kn	OP	PeP	Ks	KiL			EnL			
			≥1960		V	U	EK		EH					PS	PK	KP	Kn	OP	PeP	Ks	KiL	SoL	EnL	InL			
Ernobius																											
longicornis (Sturm, 1837)	LC	15	<1960	A	V	U			EH	ES	LK		PH											EnL			
			≥1960	A	V	U	EK	St	EH				PH	PS	PK							KiL		EnL	InL		
nigrinus (Sturm, 1837)	LC	10	<1960	A	V	U			EH	ES	LK	EP			PK							KiL					
			≥1960	A	V	U	EK	St	EH	ES	LK		PH		PK		Kn	OP	PeP	Ks	KiL	SoL		InL			
explanatus (Mannerheim, 1843)	LC	4	<1960		V	U	EK	St	EH	ES			PH	PS	PK	KP	Kn	OP	PeP	Ks	KiL		EnL	InL			
			≥1960		V	U	EK	St	EH	ES		EP	PH	PS	PK	KP	Kn	OP	PeP	Ks	KiL	SoL		InL			
mollis (Linnaeus, 1758)	LC	15	<1960	A	V	U	EK	St	EH	ES		EP	PH	PS	PK	KP	Kn			Ks	KiL						
			≥1960	A	V	U	EK	St	EH	ES		EP	PH			KP	Kn	OP	PeP								
angusticollis (Ratzeburg, 1837)	VU	80	<1960	A	V	U																					
			≥1960	A	V	U			EH																		
abietinus (Gyllenhal, 1808)	LC	60	<1960	A	V																						
			≥1960	A	V	U	EK																				
abietis (Fabricius, 1792)	LC	10	<1960	A	V	U	EK	St	EH	ES			PH														
			≥1960	A	V	U	EK	St	EH	ES			PH	PS		KP											
pini (Sturm, 1837)	VU	100	<1960																								
			≥1960	A																							
Stegobium																											
paniceum (Linnaeus, 1758)	NA	15	<1960	A	V	U	EK	St	EH	ES			PH	PS	PK	KP	Kn	OP			KiL		EnL				
			≥1960		V	U	EK	St	EH	ES					i			OP									
Anobium																											
punctatum (DeGeer, 1774)	LC	20	<1960	A	V	U		St	EH	ES	LK	EP	PH	PS	PK	KP	Kn	OP	PeP								
			≥1960	A	V	U	EK	St	EH	ES		EP			KP		OP										
canaliculatum (Thomson, 1863)	LC	40	<1960	A	V	U																					
			≥1960	A	V	U	EK																				
fulvicorne Sturm, 1837	EN	100	<1960		V																						
			≥1960		V																						
rufipes Fabricius, 1792	LC	6	<1960	A	V	U		St	EH	ES			PH	PS	PK	KP											
			≥1960	A	V	U	EK	St	EH	ES	LK	EP	PH	PS	PK	KP	Kn	OP	PeP								
thomsoni (Kraatz, 1881)	LC	4	<1960	A	V	U	EK		EH	ES			PH	PS	PK	KP											
			≥1960	A	V	U	EK	St	EH	ES		EP	PH	PS	PK	KP	Kn	OP	PeP	Ks							
Microbregma																											
emarginata (Duftschmid, 1825)	LC	10	<1960	A	V	U			EH			EP	PH	PS	PK	KP	Kn		PeP								
			≥1960	A	V	U		St	EH	ES			PH	PS	PK	KP	Kn		PeP	Ks							
Hadrobregmus																											
pertinax (Linnaeus, 1758)	LC	2	<1960	A	V	U	EK	St	EH	ES		EP	PH	PS	PK	KP	Kn	OP	PeP	Ks	KiL						
			≥1960	A	V	U	EK	St	EH	ES	LK	EP	PH	PS	PK	KP	Kn	OP	PeP	Ks	KiL	SoL					
confusus (Kraatz, 1881)	LC	4	<1960		V	U	EK	St	EH	ES	LK	EP	PH	PS	PK	KP		OP	PeP								
			≥1960		V	U	EK	St	EH	ES	LK	EP	PH	PS	PK	KP	Kn	OP	PeP			SoL					
Priobium																											
carpini (Herbst, 1793)	NT	80	<1960			U	EK			ES	LK			PS	PK	KP											
			≥1960			U	EK		EH	ES			PH		PK												
Ptilinus																											
fuscus Geoffroy, 1785	LC	6	<1960	A	V	U	EK	St	EH	ES	LK		PH	PS	PK	KP											
			≥1960	A	V	U	EK	St	EH	ES	LK	EP	PH	PS	PK	KP	Kn		PeP								

Calitys

<i>scabra</i> (Thunberg, 1784)	LC	10	<1960	V	U	St	EH			PH			Kn						
			≥1960	V	U	EK	St	EH	ES		PH	PK	Kn		Ks			EnL	

Nemozoma

<i>elongatum</i> (Linnaeus, 1761)	LC	30	<1960	A	V	U													
			≥1960	A	V	U	EK	St	EH										

Tenebroides

<i>mauritanicus</i> (Linnaeus, 1758)	NA	100*	<1960	V	U		EH	ES			PS						KiL		
			≥1960		U														

Cleridae**Tillus**

<i>elongatus</i> (Linnaeus, 1758)	LC	30	<1960	A	V	U	St	EH											
			≥1960	A	V	U	EK	St	EH	ES		PS							

Opilo

<i>domesticus</i> (Sturm, 1837)		i	<1960		i														
			≥1960		i														

Thanasimus

<i>formicarius</i> (Linnaeus, 1758)	LC	2	<1960	A	V	U	EK	St	EH	ES	LK	EP	PH	PS	PK	KP	Kn	OP	PeP	Ks	KiL	SoL		
			≥1960	A	V	U	EK	St	EH	ES	LK	EP	PH	PS	PK	KP	Kn	OP	PeP	Ks		SoL	EnL	

<i>femoralis</i> (Zetterstedt, 1828)	LC	2	<1960	A	V	U	St	EH	ES	LK	EP	PH	PS	PK	KP	Kn	OP	PeP		KiL	SoL		InL
			≥1960	A	V	U	EK	St	EH	ES		PH	PS	PK	KP	Kn	OP	PeP	Ks	KiL	SoL		InL

Tarsostenus

<i>univittatus</i> (Rossi, 1792)		i	<1960																				
			≥1960		i		i																

Korynetes

<i>caeruleus</i> (DeGeer, 1775)	NA	100*	<1960	V				ES															
			≥1960																				

Necrobia

<i>ruficollis</i> (Fabricius, 1775)	NA	100	<1960	V																			
			≥1960		U		EH				PK												

<i>violacea</i> (Linnaeus, 1758)	LC	4	<1960	A	V	U	St	EH	ES	LK	EP	PH	PS	PK	KP		OP		Ks	KiL		EnL	InL	
			≥1960	A	V	U	EK	St	EH	ES	LK	EP	PH	PS	PK	KP	Kn	OP	PeP	Ks	KiL		EnL	InL

<i>rufipes</i> (DeGeer, 1775)	LC	60	<1960	V	U	EK	EH																
			≥1960	V	U	EK	St	ES			PK		OP										

Rhadalidae**Aplocnemus**

<i>impressus</i> (Marsham, 1802)	LC	60	<1960		U																		
			≥1960	V	EK	EH	ES			PS	PK												

<i>nigricornis</i> (Fabricius, 1792)	LC	6	<1960	A	V	U	EK	St	EH	ES		EP	PH	PS				PeP					
			≥1960	A	V	U	EK	St	EH	ES		PH	PS	PK	KP	Kn	OP						

<i>tarsalis</i> (Sahlberg, 1822)	LC	10	<1960		U	St	EH	ES		EP	PH						PeP	Ks	KiL				InL
			≥1960	V	U	EK	St	EH	ES		PS	PK		OP	PeP	Ks	KiL	SoL	EnL	InL			

Semijulistus

<i>callosus</i> (Solsky, 1868)	NA	100	<1960																				
			≥1960								KP	OP											

Dasytidae**Dasytes**

<i>niger</i> (Linnaeus, 1761)	LC	2	<1960	A	V	U	EK	St	EH	ES	LK	EP	PH	PS	PK	KP	Kn	OP	PeP	Ks			InL
			≥1960	A	V	U	EK	St	EH	ES	LK	EP	PH	PS	PK	KP	Kn	OP	PeP	Ks			

<i>obscurus</i> Gyllenhal, 1813	LC	2	<1960	A	V	U	EK	St	EH	ES		EP	PH	PS	PK	KP	Kn	OP	PeP	Ks	KiL		EnL
			≥1960	V	U	EK	St	EH	ES	LK	EP	PH	PS	PK	KP	Kn	OP	PeP	Ks	KiL	SoL	EnL	InL

<i>cyaneus</i> (Fabricius, 1775)	LC	40	<1960	A																			
			≥1960	A	V																		

<i>fuscus</i> (Illiger, 1801)	NT	60	<1960		U			ES	LK														
			≥1960		U	EK		ES			PK						Ks						

<i>linariae</i> (Stephens, 1830)	LC	6	<1960	A	V	U		St	EH	ES	LK	EP	PH	PS	PK												
			≥1960	A	V	U	EK	St	EH	ES	LK	EP	PH	PS	PK	KP	Kn	OP	PeP								
Nitidulidae																											
Carpophilus																											
<i>ligneus</i> Murray, 1864			<1960		i				i																		
			≥1960										i														
<i>dimidiatus</i> (Fabricius, 1792)			<1960			i			i																		
			≥1960		i																						
<i>marginellus</i> Motschulsky, 1858	LC	6	<1960																								
			≥1960	A	V	U	EK	St	EH	ES	LK	EP	PH	PS	PK	KP	Kn										
<i>hemipterus</i> (Linnaeus, 1758)	LC	40	<1960		V	U			EH																		
			≥1960		V	U	EK		EH				PH			KP											
Epuraea																											
<i>melanocephala</i> (Marsham, 1802)	NA	100	<1960																								
			≥1960	A																							
<i>guttata</i> (Olivier, 1811)	NT	100	<1960		V																						
			≥1960		V																						
<i>hilleri</i> Reitter, 1877	LC	30	<1960						EH	ES			PH		PK												
			≥1960			U	EK		EH	ES			PH	PS	PK		Kn		PeP	Ks							
<i>neglecta</i> (Heer, 1841)	LC	10	<1960			U			EH	ES	LK		PH	PS	PK												
			≥1960			V	U	EK		EH	ES	LK		PH	PS	PK		Kn	OP								
<i>pallescens</i> (Stephens, 1832)	LC	2	<1960	A	V	U		St	EH	ES	LK		PH	PS	PK	KP	Kn	OP	PeP		KiL	SoL		InL			
			≥1960	A	V	U	EK	St	EH	ES	LK	EP	PH	PS	PK	KP	Kn	OP	PeP	Ks	KiL	SoL	EnL				
<i>laeviuscula</i> (Gyllenhal, 1827)	LC	4	<1960	A	V	U			EH				PH	PS	PK				PeP		KiL						
			≥1960		V	U	EK	St	EH	ES			PH	PS	PK	KP	Kn	OP	PeP	Ks	KiL	SoL	EnL	InL			
<i>rufobrunnea</i> Sjöberg, 1939	LC	30	<1960						EH																		
			≥1960		V	U	EK		EH	ES			PH	PS	PK	KP	Kn										
<i>deubeli</i> Reitter, 1898	LC	10	<1960		V	U			EH																		
			≥1960		V	U		St	EH	ES			PH		PK	KP	Kn	OP	PeP	Ks		SoL					
<i>thoracica</i> Tournier, 1872	LC	4	<1960	A	V	U		St	EH		LK	EP	PH		PK	KP	Kn	OP	PeP	Ks	KiL						
			≥1960	A	V	U	EK	St	EH	ES			PH		PK	KP	Kn	OP	PeP	Ks	KiL	SoL		InL			
<i>angustula</i> Sturm, 1844	LC	2	<1960		V	U			EH				PH	PS	PK		Kn		PeP		KiL		EnL				
			≥1960	A	V	U	EK	St	EH	ES	LK	EP	PH	PS	PK	KP	Kn	OP	PeP	Ks	KiL	SoL	EnL	InL			
<i>oblonga</i> (Herbst, 1793)	LC	4	<1960	A	V	U		St	EH	ES		EP		PS	PK	KP		OP	PeP								
			≥1960	A	V	U	EK	St	EH	ES		EP	PH	PS	PK	KP	Kn	OP	PeP	Ks	KiL	SoL		InL			
<i>longipennis</i> Sjöberg, 1939	LC	40	<1960																								
			≥1960						EH					PS	PK		Kn			Ks							
<i>fussii</i> Reitter, 1875	LC	15	<1960		V	U			EH		LK			PS	PK		Kn	OP	PeP	Ks	KiL						
			≥1960		V	U		St	EH	ES	LK			PH	PS	PK		Kn	OP	PeP	Ks		SoL				
<i>boreella</i> (Zetterstedt, 1828)	LC	1	<1960		V	U	EK	St	EH	ES			PH	PS	PK	KP	Kn	OP	PeP	Ks	KiL	SoL	EnL	InL			
			≥1960	A	V	U	EK	St	EH	ES			PH	PS	PK	KP	Kn	OP	PeP	Ks	KiL	SoL	EnL	InL			
<i>opalizans</i> J.Sahlberg, 1889	LC	4	<1960	A	V	U		St	EH	ES		EP	PH		PK	KP			PeP		KiL	SoL	EnL	InL			
			≥1960	A	V	U	EK	St	EH		LK	EP	PH		PK	KP	Kn	OP	PeP	Ks	KiL	SoL	EnL	InL			
<i>marseuli</i> Reitter, 1873	LC	2	<1960	A	V	U	EK	St	EH	ES	LK		PH	PS	PK	KP	Kn		PeP	Ks	KiL			InL			
			≥1960	A	V	U	EK	St	EH	ES	LK	EP	PH	PS	PK	KP	Kn	OP	PeP	Ks	KiL	SoL	EnL	InL			
<i>pygmaea</i> (Gyllenhal, 1808)	LC	2	<1960		V	U		St	EH	ES	LK	EP	PH	PS	PK	KP	Kn		PeP	Ks	KiL			InL			
			≥1960	A	V	U	EK	St	EH	ES	LK	EP	PH	PS	PK	KP	Kn	OP	PeP	Ks	KiL	SoL	EnL	InL			
<i>longula</i> Erichson, 1845	NT	100	<1960		V																						
			≥1960		U																						
<i>binotata</i> Reitter, 1873	LC	2	<1960	A	V	U			EH	ES	LK	EP	PH	PS	PK	KP			PeP								
			≥1960	A	V	U	EK	St	EH	ES	LK	EP	PH	PS	PK	KP	Kn	OP	PeP	Ks	KiL	SoL		InL			
<i>placida</i> Mäklin, 1853	LC	4	<1960		V	U			EH	ES	LK	EP	PH	PS	PK	KP	Kn	OP	PeP	Ks		SoL		InL			
			≥1960	A	V	U		St	EH	ES	LK	EP	PH	PS	PK	KP	Kn	OP	PeP	Ks	KiL	SoL		InL			
<i>terminalis</i> (Mannerheim, 1843)	LC	2	<1960	A	V	U		St	EH	ES	LK		PH	PS	PK	KP	Kn	OP	PeP	Ks	KiL			InL			
			≥1960		V	U	EK	St	EH	ES	LK	EP	PH	PS	PK	KP	Kn	OP	PeP	Ks	KiL	SoL		InL			
<i>longiclavis</i> Sjöberg, 1939	LC	40	<1960		V	U			EH																		
			≥1960	A		U	EK	St	EH	ES	LK			PS	PK			OP									

Thalycra

<i>fervida</i> (Olivier, 1790)	LC	10	<1960	A	V	U			EH	ES								KP	OP								
			≥1960	A	V	U		St	EH	ES				PH	PS	PK	Kn	OP	PeP	Ks	KiL	SoL	EnL	InL			

Cyllodes

<i>ater</i> (Herbst, 1792)	NT	60	<1960			U																					
			≥1960				EK		ES	LK				PK													

Cychramus

<i>variegatus</i> (Herbst, 1792)	LC	6	<1960	A	V	U	EK	St	EH	ES			PH	PS	PK												
			≥1960	A	V	U	EK	St	EH	ES	LK		PH	PS	PK		Kn	OP	PeP								
<i>luteus</i> (Fabricius, 1787)	LC	4	<1960	A	V	U		St	EH	ES	LK	EP	PH	PS	PK												
			≥1960	A	V	U	EK	St	EH	ES	LK	EP	PH	PS	PK	Kn		PeP									

Cryptarcha

<i>strigata</i> (Fabricius, 1787)	NT	80	<1960		V			St																			
			≥1960	A	V																						
<i>undata</i> (Olivier, 1790)	VU	100	<1960																								
			≥1960	V																							

Glischrochilus

<i>quadriguttatus</i> (Fabricius, 1777)	RE	100*	<1960			U																					
			≥1960																								
<i>grandis</i> Tournier, 1872)	NA	100	<1960																								
			≥1960	V		EK		ES																			
<i>hortensis</i> (Geoffroy, 1785)	LC	4	<1960	A	V	U	EK	St	EH	ES	LK	EP	PH	PS	PK	Kn	OP	PeP									
			≥1960	A	V	U	EK	St	EH	ES	LK	EP	PH	PS	PK	Kn	OP	PeP	Ks								
<i>quadripunctatus</i> (Linnaeus, 1761)	LC	2	<1960	A	V	U	EK	St	EH	ES	LK	EP	PH	PS	PK	Kn	OP	PeP	Ks	KiL	SoL		InL				
			≥1960	A	V	U	EK	St	EH	ES	LK	EP	PH	PS	PK	Kn	OP	PeP	Ks	KiL	SoL	EnL	InL				

Pityophagus

<i>ferrugineus</i> (Linnaeus, 1761)	LC	2	<1960	A	V	U	EK	St	EH	ES	LK	EP	PH	PS	PK	Kn	OP	PeP				EnL					
			≥1960	A	V	U	EK	St	EH	ES	LK	EP	PH	PS	PK	Kn	OP	PeP	Ks		SoL		InL				

Cybocephalus

<i>politus</i> (Gyllenhal, 1813)	LC	10	<1960	A	V	U		St	EH	ES	LK	EP	PH		PK	Kn											
			≥1960	A	V	U	EK	St	EH	ES		EP	PH	PS	PK	Kn		PeP	Ks								

Monotomidae

Cyanostolus

<i>aeneus</i> (Richter, 1820)	VU	100	<1960			U		St	ES																		
			≥1960	V	U																						

Rhizophagus

<i>grandis</i> Gyllenhal, 1827	LC	6	<1960			U						EP								Ks	KiL						
			≥1960	A	V	U	EK	St	EH	ES			PH	PS	PK	Kn	OP	PeP	Ks	KiL	SoL		InL				
<i>depressus</i> (Fabricius, 1792)	LC	4	<1960	A	V	U		St	EH	ES	LK		PH	PS	PK	Kn											
			≥1960	V	U	EK	St	EH	ES				PH		PK	Kn	OP	PeP	Ks	KiL							
<i>ferrugineus</i> (Paykull, 1800)	LC	1	<1960	A	V	U		St	EH	ES	LK	EP	PH	PS	PK	Kn		PeP	Ks	KiL			InL				
			≥1960	A	V	U	EK	St	EH	ES	LK	EP	PH	PS	PK	Kn	OP	PeP	Ks	KiL	SoL	EnL	InL				
<i>parallelocolis</i> Gyllenhal, 1827	LC	10	<1960	A	V	U		EH					PH														
			≥1960	A	V	U	EK	St	EH	ES	LK		PH	PS	PK	Kn		PeP									
<i>perforatus</i> Erichson, 1845	NA	100	<1960			U																					
			≥1960			U																					
<i>picipes</i> (Olivier, 1790)	LC	30	<1960			U																					
			≥1960			U	EK		EH			EP			PK												
<i>dispar</i> (Paykull, 1800)	LC	1	<1960	A	V	U	EK	St	EH	ES	LK	EP	PH	PS	PK	Kn	OP	PeP	Ks	KiL			InL				
			≥1960	A	V	U	EK	St	EH	ES	LK	EP	PH	PS	PK	Kn	OP	PeP	Ks	KiL	SoL		InL				
<i>bipustulatus</i> (Fabricius, 1792)	LC	4	<1960	A	V	U		St	EH	ES			PH	PS	PK	Kn		OP	PeP								
			≥1960	A	V	U	EK	St	EH	ES	LK	EP	PH	PS	PK	Kn	OP	PeP	Ks	KiL	SoL						
<i>nitidulus</i> (Fabricius, 1798)	LC	4	<1960		V	U		St	EH			EP	PH	PS	PK												
			≥1960	A	V	U	EK	St	EH	ES	LK	EP	PH	PS	PK	Kn	OP	PeP	Ks	KiL							
<i>fenestralis</i> (Linnaeus, 1758)	LC	2	<1960	A	V	U	EK	St	EH	ES	LK		PH	PS	PK	Kn	OP	PeP	Ks	KiL			InL				
			≥1960	A	V	U	EK	St	EH	ES	LK	EP	PH	PS	PK	Kn	OP	PeP	Ks	KiL	SoL		InL				

<i>cribratus</i> Gyllenhal, 1827	LC	4	<1960	V	U	St	EH	ES	LK	PH	PS	PK	PeP									
			≥1960	V	U	EK	St	EH	ES	LK	EP	PH	PS	PK	Kn	OP	PeP	Ks	KiL			
<i>puncticollis</i> Sahlberg, 1837	RE	100*	<1960			St																
			≥1960																			
Monotoma																						
<i>conicicollis</i> Chevrolat, 1837	LC	4	<1960	A	V	U	St	EH	ES		PH	PS	PK	OP			KiL	SoL				
			≥1960	V	U	EK	St	EH	ES		EP	PH		PK	Kn	OP	PeP	Ks	SoL			
<i>angusticollis</i> (Gyllenhal, 1827)	LC	6	<1960	A	V	U	St	EH	ES		PH	PS	PK									
			≥1960	V	U	EK		EH	ES		PH	PS	PK			OP	PeP	KiL				
<i>spinicollis</i> Aubé, 1837	NT	80	<1960	V	U		EH	ES				PK					Ks					
			≥1960	V	U		EH					PK										
<i>picipes</i> Herbst, 1793	LC	2	<1960	A	V	U	St	EH	ES	LK	PH	PS	PK	Kn	OP	PeP	KiL	SoL	InL			
			≥1960	A	V	U	EK	St	EH	ES	LK	EP	PH	PS	PK	Kn	OP	PeP	Ks	KiL	SoL	InL
<i>brevicollis</i> Aubé, 1837	LC	40	<1960	A	V	U		EH			PH		PK	Kn	OP	PeP						
			≥1960		U	EK	St	EH	ES	LK	EP	PH		PK				Ks				
<i>bicolor</i> Villa, 1835	LC	30	<1960	V	U		EH		LK	PH	PS	PK										
			≥1960	V	U	EK		EH		LK	EP	PH		PK								
<i>quadricollis</i> Aubé, 1837	LC	40	<1960		U		EH	ES		PH												
			≥1960	A	V	U	EK		EH		EP	PH		PK				Ks				
<i>testacea</i> Motschulsky, 1845	NT	100	<1960	V	U																	
			≥1960		U	EK		EH														
<i>longicollis</i> (Gyllenhal, 1827)	LC	4	<1960	A	V	U	St	EH	ES	LK	PH		PK	Kn								
			≥1960	A	V	U	EK		EH	ES	LK	EP	PH		PK		OP	Ks	KiL			
Silvanidae																						
Uleiota																						
<i>planata</i> (Linnaeus, 1761)	RE	100	<1960	V	U																	
			≥1960		U			ES														
Dendrophagus																						
<i>crenatus</i> (Paykull, 1799)	LC	4	<1960	A	V	U	EK	St	EH	ES	EP	PH	PS	PK	Kn	PeP	Ks	KiL	SoL	EnL	InL	
			≥1960	V	U	EK	St	EH	ES	LK		PH	PS	PK	Kn	OP	PeP	Ks	KiL	SoL	InL	
Cryptamorpha																						
<i>desjardinsi</i> Guérin-Ménéville, 1844		i	<1960																			
			≥1960	i							i											
Psammoecus																						
<i>bipunctatus</i> (Fabricius, 1792)	LC	40	<1960																			
			≥1960	A	U	EK	St		ES	LK			PK									
Airaphilus																						
<i>elongatus</i> (Gyllenhal, 1813)	LC	40	<1960	A	V	U	St															
			≥1960	A	V	U	EK	St														
<i>perangustus</i> Lindberg, 1943	VU	100	<1960	A	V		St															
			≥1960	A	U		St	EH														
Ahasverus																						
<i>advena</i> (Waltl, 1834)	LC	10	<1960		U								PK									
			≥1960	A	V	U	EK	St	EH	ES	LK	EP	PH	PS	PK	Kn	OP					
Oryzaephilus																						
<i>surinamensis</i> (Linnaeus, 1758)	NA	15	<1960	V	U		EH			EP	PH											
			≥1960	A	V	U		EH			PH			Kn								
<i>mercator</i> (Fauvel, 1889)	NA	20	<1960	V	U		EH			EP			PK									
			≥1960		U		EH			EP			PK									
Silvanus																						
<i>bidentatus</i> (Fabricius, 1792)	LC	20	<1960	V	U	EK		EH	ES	LK	PH	PS	PK									
			≥1960	V	U	EK		EH	ES	LK		PH	PS	PK	Kn	OP		Ks				
<i>unidentatus</i> (Olivier, 1790)	EN	80	<1960	V	U		EH	ES			PS	PK										
			≥1960		U	EK		EH	ES			PS	PK	Kn								

basalis Erichson, 1846	LC	60	<1960	U												PeP				
			≥1960	V U													PeP	KiL		
mesomela (Herbst, 1792)	LC	6	<1960	A V U	St	EH				PS						OP				
			≥1960	A V U EK St EH ES LK EP PH PS PK KP OP PeP InL																
rubella Heer, 1841	LC	4	<1960	A V U	St	EH ES	LK EP	PH PS	PK				PeP	KiL						
			≥1960	A V U EK St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks																
atricapilla Stephens, 1830	NT	100	<1960	A V U	EH															
			≥1960	V																
mongolica Johnson, 1970	LC	80	<1960						PS											
			≥1960	U EH LK PK Kn Ks																
nitidula (Marsham, 1802)	LC	2	<1960	V U	St	EH	EP	PH PS	PK KP	Kn OP										
			≥1960	A V U EK St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks SoL InL																
fulvipennis Mannerheim, 1846	NT	80	<1960										KiL	SoL	EnL	InL				
			≥1960	PeP InL																
rubida Reitter, 1875	NA	100*	<1960																	
			≥1960	U																
rubricollis Bris. de Barn., 1863	NT	100	<1960	V U	EH		PH													
			≥1960	U EH LK																
hislopi Wollaston, 1857	LC	4	<1960	V U	EH ES		PH PS	PK KP			PeP									
			≥1960	V U EK St EH ES EP PS PK Kn OP PeP Ks KiL SoL InL																
turgida Erichson, 1846	LC	4	<1960	A V U	EH															
			≥1960	A V U EK St EH ES LK PH PS PK KP Kn OP PeP																
apicalis Erichson, 1846	LC	1	<1960	A V U	St	EH ES	LK EP	PH PS	PK KP		OP	PeP	Ks	KiL					InL	
			≥1960	A V U EK St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL																
testacea Stephens, 1830	LC	2	<1960	A V U EK St	EH ES	LK EP	PH PS	PK KP		OP	PeP	Ks	KiL		EnL	InL				
			≥1960	A V U EK St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks																
impressa Erichson, 1846	LC	4	<1960	V U EK St	EH ES								KiL							
			≥1960	A V U EK St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL																
fimetarii (Fabricius, 1792)	LC	30	<1960	U			PH													
			≥1960	A V U EK EH LK PH																
umbrina (Gyllenhal, 1827)	LC	2	<1960	A V U EK St	EH ES		PH PS	PK KP		OP		KiL								
			≥1960	A V U EK St EH ES LK PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL																
diluta Erichson, 1846	NA	100*	<1960	U																
			≥1960																	
pulchra Erichson, 1846	LC	80	<1960	U																
			≥1960	V U EK PH																
<i>barani</i> Brisout de Barneville, 1863	DD	100	<1960	V	EH															
			≥1960	Kn SoL																
sparreschneideri Munster, 1928	LC	60	<1960										KiL							
			≥1960	Ks KiL SoL EnL InL																
nigriventris Stephens, 1830	NE	100*	<1960	U	EH															
			≥1960																	
puncticollis Thomson, 1868	LC	60	<1960	U	EH ES		PH				OP									
			≥1960	U EH Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL																
nigrirostris Stephens, 1830	LC	2	<1960	A V U	St	EH ES	LK EP	PH PS	PK KP	Kn OP		KiL								
			≥1960	A V U EK St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL InL																
alpina Heer, 1841	LC	4	<1960	V U	St	EH						PeP								
			≥1960	V U EK St EH ES PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL InL																
subangulata J.Sahlberg, 1926	LC	4	<1960	V	EH								Ks							
			≥1960	A V U EK St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL InL																
abietina Reitter, 1888	LC	40	<1960		EH															
			≥1960	St EH ES PK Kn PeP Ks																
bescidica Reitter, 1888	NT	60	<1960		ES							PeP								
			≥1960	EH ES PS PK Kn PeP InL																
grossepunctata Reitter, 1896	NE	100	<1960																	
			≥1960	Ks																

Stephostethus

lardarius (DeGeer, 1775)	LC	2	<1960	A	V	U	St	EH	ES	LK	EP	PH	PS	PK	KP	Kn	OP	PeP	Ks	KiL	SoL		
			≥1960	A	V	U	EK	St	EH	ES	LK	EP	PH	PS	PK	KP	Kn	OP	PeP	Ks	KiL		
attenuatus (Mannerheim, 1844)	VU	100*	<1960																				
			≥1960																				SoL
angusticollis (Gyllenhal, 1827)	NT	80	<1960							LK													
			≥1960	V							LK												
pandellei (Bris. de Barn., 1863)	LC	2	<1960	V	U	St	EH	ES	LK		PH	PS	PK				OP						
			≥1960	V	U	EK	St	EH	ES	LK		PH	PS	PK	KP	Kn	OP	PeP	Ks	KiL			
cinnamopterus (Mannerh., 1844)	NT	80	<1960																				InL
			≥1960																			KiL	SoL
variolosus (Mannerheim, 1844)	LC	6	<1960		U		EH	ES	LK		PH	PS	PK	KP			OP	PeP	Ks	KiL	SoL	EnL	InL
			≥1960	V	U		St	EH	ES	LK	EP	PH	PS	PK	KP			OP	PeP	Ks	KiL	SoL	EnL
alternans (Mannerheim, 1844)	LC	40	<1960		U		EH																
			≥1960	A	V	U	EK		EH	ES			PH						PeP				
rugicollis (Olivier, 1790)	LC	2	<1960	A	V	U		EH	ES	LK		PH		PK	KP								InL
			≥1960	A	V	U	EK	St	EH	ES	LK	EP	PH	PS	PK	KP	Kn	OP	PeP	Ks	KiL	SoL	EnL

Thes

bergrothi (Reitter, 1881)	LC	15	<1960	A	V	U	St	EH	ES		EP	PH		PK									
			≥1960	V	U	EK	St	EH	ES		EP	PH	PS			Kn	OP				KiL		

Cartodere

bifasciata (Reitter, 1877)	NA	100	<1960																				
			≥1960		U																		
nodifer (Westwood, 1839)	LC	10	<1960	A	V	U																	
			≥1960	A	V	U	EK	St	EH	ES		EP	PH		PK								
constricta (Gyllenhal, 1827)	LC	6	<1960	V	U	St	EH	ES	LK		PH	PS	PK										
			≥1960	A	V	U	EK	St	EH	ES	LK	EP	PH	PS	PK	KP	Kn	OP	PeP	Ks		SoL	

Corticaria

pubescens (Gyllenhal, 1827)	LC	4	<1960	A	V	U	St	EH	ES	LK	EP	PH	PS	PK	KP	Kn	OP	PeP	Ks	KiL	SoL	EnL		
			≥1960	A	V	U	EK	St	EH	ES	LK	EP	PH	PS	PK	KP	Kn	OP	PeP			SoL		
dentiventris Poppius, 1904	NT	100	<1960		U																		InL	
			≥1960																		Ks	KiL	SoL	
pineti Lohse, 1960	NT	80	<1960																					
			≥1960		U	EK			ES											PeP	Ks	KiL		
crenulata (Gyllenhal, 1827)	NT	60	<1960																					
			≥1960	A	V	U																		
fulva (Comolli, 1837)	NA	100	<1960	A	V	U		EH																
			≥1960		U																			
umbilicata (Beck, 1817)	LC	2	<1960	A	V	U	St	EH	ES	LK		PH	PS	PK	KP				Ks				InL	
			≥1960	A	V	U	EK	St	EH	ES	LK	EP	PH	PS	PK	KP	Kn		PeP	Ks		SoL	EnL	InL
aphictoides Reitter, 1898 <i>porochini</i> John., 2007	NT	60	<1960	V	U	St	EH	ES				PS	PK	KP			PeP							
			≥1960	V	U	EK		EH				EP		PK										
impressa (Olivier, 1790)	LC	4	<1960	A	V	U	St	EH	ES	LK	EP	PH	PS	PK	KP			OP	PeP			SoL	InL	
			≥1960	A	V	U	EK	St	EH	ES	LK	EP	PH	PS	PK	KP	Kn	OP	PeP	Ks				
lapponica (Zetterstedt, 1838)	LC	2	<1960	A	V	U	St	EH				PH	PS		KP			PeP	Ks	KiL	SoL	EnL	InL	
			≥1960	A	V	U	EK	St	EH	ES	LK	EP	PH	PS	PK	KP	Kn	OP	PeP	Ks	KiL	SoL		InL
saginata Mannerheim, 1844	LC	10	<1960	A	V	U		EH	ES	LK								PeP	Ks	KiL				
			≥1960	A	V	U	EK	St	EH	ES	LK		PH	PS	PK	KP	Kn		PeP	Ks		SoL		
serrata (Paykull, 1798)	LC	15	<1960	A	V	U	St	EH	ES		EP	PH	PS	PK	KP						KiL		EnL	
			≥1960	A		U	EK		EH	ES			PH	PS						Ks				
subamurensis Saluk, 1993	LC	80	<1960																					
			≥1960		U	EK		EH	ES			PH		PK		Kn		PeP			SoL			
cucujiformis Reitter, 1881	VU	100*	<1960																					
			≥1960												PK									
orbicollis Mannerheim, 1853	LC	6	<1960															OP	PeP	Ks	KiL		EnL	InL
			≥1960					St	EH	ES			PH		PK	KP	Kn	OP	PeP	Ks	KiL	SoL	EnL	InL

fagi Waltl, 1839	VU	100	<1960																				
			≥1960	V																			
dentatus Mellié, 1848	LC	15	<1960	A	V									PeP	Ks								
			≥1960	A	V	U	EK	EH	ES		PH	PS	PK	Kn	OP		Ks	KiL					
bidentatus (Olivier, 1790)	LC	2	<1960	A	V	U		EH			PH				PeP	Ks	KiL						
			≥1960	A	V	U	EK	EH	ES	EP	PH	PS	PK	KP	Kn	OP	PeP	Ks	KiL	SoL	EnL	InL	
fissicornis Mellié, 1848	LC	30	<1960																				
			≥1960		U	EK	EH	ES	LK	PH	PS												
vestitus Mellié, 1848	VU	100	<1960	V				EH															
			≥1960	A	V																		
festivus (Panzer, 1793)	LC	30	<1960	A	V	U																	
			≥1960	A	V	U	EK	St	EH														
Ennearthron																							
cornutum (Gyllenhal, 1827)	LC	4	<1960	A	V	U		St	EH	ES		PH	PS	PK			PeP						
			≥1960	A	V	U	EK	St	EH	ES	LK	PH	PS	PK	Kn	OP	PeP	Ks			EnL		
palmi Lohse, 1966	LC	40	<1960																				
			≥1960	V			EH	ES	LK		PS	PK			OP	PeP							
Dolichocis																							
laricinus (Mellié, 1848)	LC	2	<1960	V	U		St	EH			EP	PH				PeP	Ks	KiL			InL		
			≥1960	V	U	EK	St	EH	ES	LK	EP	PH	PS	PK	Kn	OP	PeP	Ks	KiL	SoL		InL	
Orthocis																							
alni (Gyllenhal, 1813)	LC	2	<1960	A	V	U		St	EH	ES	LK		PH	PS	PK	KP		PeP		KiL	SoL		
			≥1960	A	V	U	EK	St	EH	ES	LK	EP	PH	PS	PK	KP	Kn	OP	PeP	Ks	KiL	SoL	EnL
linearis (J.Sahlberg, 1900)	LC	40	<1960																				
			≥1960				St	EH			PH	PS	PK	KP		OP	PeP	Ks	KiL			InL	
Hadreule																							
elongatula (Gyllenhal, 1827)	LC	6	<1960	V	U			EH								PeP							
			≥1960	V	U	EK	St	EH	ES	LK	PH	PS	PK	Kn		PeP			SoL				
Sulcaxis																							
nitidus (Fabricius, 1792)	LC	2	<1960	A	V	U		St	EH	ES		PH	PS	PK	KP		OP	PeP					
			≥1960	A	V	U	EK	St	EH	ES	LK	EP	PH	PS	PK	KP	Kn	OP	PeP	Ks	KiL		InL
fronticornis (Panzer, 1809)	LC	15	<1960	A	V	U		St	EH	ES		EP		PS	PK	KP	Kn		PeP				
			≥1960	A	U	EK	EH	ES	LK			PS	PK			OP	PeP		KiL				
Wagaicis																							
wagai (Wankowicz, 1869)	CR	100	<1960																				
			≥1960			EK						PK											
Ropalodontus																							
strandi Lohse, 1969	LC	2	<1960	V				EH	ES			PH		PK	Kn	PeP		KiL	SoL		InL		
			≥1960	A	V	U	EK	St	EH	ES	LK	EP	PH	PS	PK	Kn	OP	PeP	Ks	KiL	SoL		InL
Octotemnus																							
glabriculus (Gyllenhal, 1827)	LC	2	<1960	A	V	U		EH				PS	PK	KP									
			≥1960	A	V	U	EK	St	EH	ES	LK	EP	PH	PS	PK	KP	Kn	OP	PeP	Ks	KiL		
mandibularis (Gyllenhal, 1813)	RE	100*	<1960	A																			
			≥1960																				
Tetratomidae																							
Tetratoma																							
fungorum Fabricius, 1790	LC	40	<1960	A																			
			≥1960	A	V	U	St																
ancora Fabricius, 1790	LC	2	<1960	V	U		St	EH	ES			PH	PS	PK	KP		OP	PeP			SoL	EnL	InL
			≥1960	V	U	EK	St	EH	ES	LK	EP	PH	PS	PK	KP	Kn	OP	PeP	Ks	KiL	SoL	EnL	InL
Hallomenus																							
binotatus (Quensel, 1790)	LC	4	<1960	A	V	U		St	EH	ES		EP	PH		PK								
			≥1960	A	V	U	EK	St	EH	ES		EP	PH	PS	PK	KP	Kn	OP	PeP	Ks	KiL		
axillaris (Illiger, 1807)	LC	6	<1960	A	V	U		St	EH	ES		EP	PH	PS				OP					
			≥1960	A	V	U	EK	St	EH	ES		EP	PH	PS	PK	KP	Kn	OP	PeP				

laevigatus (Fabricius, 1781)		i	<1960	<input type="checkbox"/>													
			≥1960	<input type="checkbox"/>													
Tribolium																	
madens (Charpentier, 1825)		100	<1960	<input type="checkbox"/>													
			≥1960	<input type="checkbox"/>	U	<input type="checkbox"/>											
castaneum (Herbst, 1797)	NA	15	<1960	<input type="checkbox"/>													
			≥1960	<input type="checkbox"/>	V U EK	<input type="checkbox"/>	OP	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>							
destructor Uyttenboogart, 1933	NA	6	<1960	<input type="checkbox"/>													
			≥1960	<input type="checkbox"/>	V U	St EH	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	EP	PS	<input type="checkbox"/>	KP	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
confusum Jacquelin du Val, 1861	NA	15	<1960	<input type="checkbox"/>													
			≥1960	<input type="checkbox"/>	V U EK	EH	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	PH	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	OP	<input type="checkbox"/>	KiL	<input type="checkbox"/>	
Latheticus																	
oryzae Waterhouse, 1880		i	<1960	<input type="checkbox"/>	i	<input type="checkbox"/>											
			≥1960	<input type="checkbox"/>													
Uloma																	
culinaris (Linnaeus, 1758)	NA	100	<1960	<input type="checkbox"/>													
			≥1960	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	EK	<input type="checkbox"/>	ES	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	PK	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
rufa (Piller & Mitterpacher, 1783)	LC	40	<1960	<input type="checkbox"/>													
			≥1960	<input type="checkbox"/>	V U EK	EH ES	<input type="checkbox"/>	PK	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
Nalassus																	
dermestoides (Illiger, 1798)		i	<1960	<input type="checkbox"/>													
			≥1960	<input type="checkbox"/>	i	<input type="checkbox"/>											
Blaps																	
mortisaga (Linnaeus, 1758)	RE	100*	<1960	<input type="checkbox"/>													
			≥1960	<input type="checkbox"/>	V	<input type="checkbox"/>											
lethifera Marsham, 1802		i	<1960	<input type="checkbox"/>													
			≥1960	<input type="checkbox"/>													
mucronata Latreille, 1804		i	<1960	<input type="checkbox"/>													
			≥1960	<input type="checkbox"/>													
Opatrum																	
riparium Scriba, 1865	LC	40	<1960	<input type="checkbox"/>													
			≥1960	<input type="checkbox"/>	V U EK	EH ES	<input type="checkbox"/>										
sabulosum (Linnaeus, 1761)	EN	80	<1960	<input type="checkbox"/>													
			≥1960	<input type="checkbox"/>	A V U EK	<input type="checkbox"/>											
Melanimon																	
tibialis (Fabricius, 1781)	LC	15	<1960	<input type="checkbox"/>													
			≥1960	<input type="checkbox"/>	V U EK	St EH ES LK	<input type="checkbox"/>	PK	<input type="checkbox"/>	OP	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
Gnatocerus																	
cornutus (Fabricius, 1798)	NA	100*	<1960	<input type="checkbox"/>													
			≥1960	<input type="checkbox"/>	OP	<input type="checkbox"/>											
maxillosus (Fabricius, 1801)		i	<1960	<input type="checkbox"/>													
			≥1960	<input type="checkbox"/>													
Cynaesus																	
angustus (LeConte, 1851)	LC	40	<1960	<input type="checkbox"/>													
			≥1960	<input type="checkbox"/>	V U EK	EH	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	EP PH	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	KP	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Alphitophagus																	
bifasciatus (Say, 1824)	LC	30	<1960	<input type="checkbox"/>													
			≥1960	<input type="checkbox"/>	A V U EK	St EH ES	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	PH PS	PK	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Diaperis																	
boleti (Linnaeus, 1758)	LC	6	<1960	<input type="checkbox"/>													
			≥1960	<input type="checkbox"/>	A V U EK	St EH ES LK	<input type="checkbox"/>	PH PS	PK	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						
Neomida																	
haemorrhoidalis (Fabricius, 1787)	VU	60	<1960	<input type="checkbox"/>													
			≥1960	<input type="checkbox"/>	A V U EK	EH ES	<input type="checkbox"/>	PS PK	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						

Platydema

violacea (Fabricius, 1790)	CR	100*	<1960																					
			≥1960		U																			

Pentaphyllus

testaceus (Hellwig, 1792)	VU	100	<1960	V																			
			≥1960	V																			

Scaphidema

metallica (Fabricius, 1792)	LC	6	<1960	A	V	U	St	EH	ES	LK	EP	PH		PK	KP		OP						InL
			≥1960	A	V	U	EK	St	EH	ES	LK	EP	PH	PS		KP	Kn	OP			KiL		InL

Crypticus

quisquilius (Linnaeus, 1761)	EN	80	<1960	A	V	U	EK																
			≥1960	A	V	U																	

Myrmechixenus

subterraneus Chevrolat, 1835	LC	40	<1960	A	V	U	St	EH	ES		EP						KP						
			≥1960	A	V	U	EK	St	EH	ES	LK	EP	PH	PS		KP						SoL	
vaporariorum Guérin-Ménév., 1843	LC	30	<1960			U																	
			≥1960		V	U	EK	St	EH	ES			PH	PS	PK								

Corticeus

unicolor Piller & Mitterp., 1783	NA	100	<1960																				
			≥1960			U																	
longulus (Gyllenhal, 1827)	LC	30	<1960	V	U	EK	St	EH	ES	LK		PH	PS	PK	KP			PeP					
			≥1960	V	U	EK	St	EH	ES			PH	PS	PK		Kn			Ks				
fraxini (Kugelann, 1794)	NT	30	<1960	V	U		St	EH				PH	PS					PeP		KiL			
			≥1960		U			ES				PH	PK	KP	Kn		PeP	Ks		SoL			
suturalis (Paykull, 1800)	LC	10	<1960	V	U		St	EH				PH					PeP						
			≥1960	V	U	EK		EH	ES			PH	PS	PK		Kn	OP	PeP	Ks				
bicolor (Olivier, 1790)	LC	20	<1960	A	V	U	St	EH				PH					PeP						
			≥1960	V	U	EK		EH	ES			PH	PS	PK		Kn	PeP	Ks	KiL				
linearis (Fabricius, 1790)	LC	4	<1960	A	V	U	EK	St	EH	ES	LK	EP	PH	PS	PK			PeP	Ks				
			≥1960	A	V	U	EK	St	EH	ES		EP	PH	PS	PK	KP	Kn	OP	PeP	Ks	KiL	SoL	InL

Allecula

morio (Fabricius, 1787)	RE	100*	<1960	V																			
			≥1960																				

Hymenophorus

doublieri Mulsant, 1851	CR	100	<1960					EH	ES				PS										
			≥1960	A				EH															

Prionychus

ater (Fabricius, 1775)	LC	40	<1960	A	V	U																	
			≥1960	A	V	U																	
melanarius (Germar, 1813)	VU	100	<1960			EK																	
			≥1960			EK																	

Pseudocistela

ceramboides (Linnaeus, 1758)	LC	20	<1960	A	V	U	St						PH										
			≥1960	V	U	EK	St	EH	ES				PH	PS	PK								

Isomira

murina (Linnaeus, 1758)	LC	40	<1960	A	V	U						EP											
			≥1960	A	V																		

Mycetochara

flavipes (Fabricius, 1792)	LC	2	<1960	A	V	U	EK	St	EH	ES	LK	EP	PH	PS	PK	KP		PeP					
			≥1960	A	V	U	EK	St	EH	ES	LK	EP	PH	PS	PK	KP	Kn	OP	PeP	Ks	KiL	SoL	InL
axillaris (Paykull, 1799)	LC	6	<1960	A	V	U	St	EH					PH	PS									
			≥1960	A	V	U	EK	St	EH	ES	LK		PH	PS	PK	KP	Kn	OP	PeP				
humeralis (Fabricius, 1787)	NT	80	<1960	V			St																
			≥1960	V																			
obscura (Zetterstedt, 1838)	LC	4	<1960	A	V	U	St	EH			LK	EP	PH	PS				OP	PeP				
			≥1960	V	U	EK	St	EH	ES			EP	PH	PS	PK	KP	Kn	OP	PeP	Ks	KiL	SoL	InL

Chlorophorus

herbstii (Brahm, 1790)	EN	100*	<1960																						
			≥1960	A	U																				

Clytus

arietis (Linnaeus, 1758)	NT	100	<1960	A	V	i																			
			≥1960	A																					

Lamia

textor (Linnaeus, 1758)	LC	15	<1960			V	U	EK	St	EH	ES	LK	EP	PH	PS	PK	Kn	OP						KiL		
			≥1960	A	V	U	EK	St	EH	ES	LK	EP	PH	PS	PK	Kn	OP	PeP	Ks							

Monochamus

sartor (Fabricius, 1787)	NT	30	<1960			V	U		St	EH			EP	PH	PS	PK	Kn		PeP							
urussovii (Fischer v. Waldheim, 1805)			≥1960			V	U	EK		EH	ES		EP	PH	PS	PK	Kn		OP	PeP	Ks	KiL				

sutor (Linnaeus, 1758)	LC	4	<1960	A	V	U	EK	St	EH	ES	LK	EP	PH	PS	PK	Kn	OP	PeP	Ks	KiL	SoL	EnL	InL			
			≥1960	A	V	U	EK	St	EH	ES	LK	EP	PH	PS	PK	Kn	OP	PeP	Ks	KiL	SoL	EnL	InL			

galloprovincialis (Olivier, 1795)	LC	6	<1960			V	U	EK		EH	ES		EP	PH	PS	PK	Kn	OP	PeP							
			≥1960	A	V	U	EK	St	EH	ES	LK	EP	PH	PS	PK	Kn	OP		Ks							

Mesosa

myops (Dalman, 1817)	VU	100	<1960			V																				
			≥1960			V																				

Oplosia

cinerea (Mulsant, 1839)	VU	60	<1960			V	U																			
			≥1960			V	U			EH																

Pogonocherus

hispidus (Linnaeus, 1758)	NT	80	<1960	A	V	U																				
			≥1960	A	V																					

fasciculatus (DeGeer, 1775)	LC	2	<1960	A	V	U	EK	St	EH	ES	LK	EP	PH	PS	PK	Kn	OP	PeP	Ks	KiL	SoL	EnL	InL			
			≥1960	A	V	U	EK	St	EH	ES	LK	EP	PH	PS	PK	Kn	OP	PeP	Ks	KiL	SoL	EnL	InL			

decoratus Fairmaire, 1855	LC	15	<1960	A	V	U	EK	St	EH	ES			PH	PS	PK	Kn	OP		Ks							
			≥1960	A	V	U	EK	St	EH	ES			EP	PH	PS	PK	Kn	OP	PeP	Ks		SoL	InL			

Exocentrus

lusitanus (Linnaeus, 1767)	NT	30	<1960			V	U		St	EH																
			≥1960			V	U			EH	ES	LK														

Aegomorphus

clavipes (Schrank, 1781)	LC	10	<1960			V	U	EK	St	EH	ES	LK	EP		PS		Kn									
			≥1960			V	U	EK	St	EH	ES	LK	EP	PH	PS	PK										

Acanthocinus

aedilis (Linnaeus, 1758)	LC	2	<1960	A	V	U	EK	St	EH	ES	LK	EP	PH	PS	PK	Kn	OP	PeP	Ks	KiL	SoL	EnL	InL			
			≥1960	A	V	U	EK	St	EH	ES	LK	EP	PH	PS	PK	Kn	OP	PeP	Ks	KiL	SoL	EnL	InL			

griseus (Fabricius, 1792)	LC	20	<1960			V	U		St	EH	ES		EP	PH												
			≥1960			V	U	EK			ES	LK		PH	PS	PK	Kn		Ks							

Leiopus

nebulosus (Linnaeus, 1758)	NT	60	<1960	A	V	U																				
			≥1960	A	V	U																				

punctulatus (Paykull, 1800)	RE	100	<1960			V																				
			≥1960							ES																

Agapanthia

villosviridescens (DeGeer, 1775)	LC	10	<1960																							
			≥1960			V	U	EK	St	EH	ES	LK		PH	PK											

Saperda

carcharias (Linnaeus, 1758)	LC	4	<1960	A	V	U	EK	St	EH	ES	LK	EP	PH	PS	PK	Kn	OP									
			≥1960	A	V	U	EK	St	EH	ES	LK	EP	PH	PS	PK	Kn	OP	PeP	Ks	KiL						

similis Laicharting, 1784	LC	30	<1960			V	U		St	EH				PS		Kn										
			≥1960			V	U			EH				PS	PK											

populnea (Linnaeus, 1758)	LC	4	<1960			V	U	EK	St	EH	ES	LK	EP	PH	PS	PK	Kn	OP	PeP	Ks	KiL			EnL	InL	
			≥1960			V	U	EK	St	EH	ES	LK	EP	PH	PS	PK	Kn	OP	PeP	Ks	KiL	SoL	EnL	InL		

<i>scalaris</i> (Linnaeus, 1758)	LC	4	<1960	A	V	U	EK	St	EH	ES	LK	EP	PH	PS	PK	KP	Kn	OP		Ks	KiL	SoL	EnL	InL		
			≥1960	A	V	U	EK	St	EH	ES	LK	EP	PH	PS	PK		Kn	OP	PeP	Ks	KiL	SoL		InL		
<i>perforata</i> (Pallas, 1773)	LC	20	<1960		V	U	EK	St	EH	ES	LK		PH	PS	PK	KP			PeP							
			≥1960		V	U	EK		EH	ES			PH	PS	PK		Kn	OP	PeP							
Stenostola																										
<i>dubia</i> (Laicharting, 1784)	NT	30	<1960			U			EH																	
			≥1960		V	U			EH																	
Oberea																										
<i>oculata</i> (Linnaeus, 1758)	LC	15	<1960		V	U		St	EH	ES	LK	EP	PH	PS	PK	KP										
			≥1960		V	U	EK	St	EH	ES	LK	EP	PH	PS	PK	KP			OP	PeP						
Phytoecia																										
<i>cylindrica</i> (Linnaeus, 1758)	LC	60	<1960							ES	LK				PK											
			≥1960				EK			ES	LK				PK											
Tetrops																										
<i>praeusta</i> (Linnaeus, 1758)	LC	6	<1960	A	V	U	EK	St	EH	ES	LK	EP		PS	PK	KP										
			≥1960	A	V	U	EK	St	EH	ES	LK	EP	PH	PS	PK	KP	Kn									
Megalopodidae																										
Zeugophora																										
<i>scutellaris</i> Suffrian, 1840	LC	60	<1960	A	V	U			EH	ES	LK				PK											
			≥1960	A	V	U			EH	ES																
<i>subspinosa</i> (Fabricius, 1781)	LC	4	<1960	A	V	U	EK	St	EH	ES	LK	EP	PH	PS	PK		Kn			Ks						
			≥1960		V	U	EK	St	EH	ES	LK	EP	PH	PS	PK	KP	Kn	OP	PeP	Ks		SoL		InL		
<i>turneri</i> Power, 1863	LC	80	<1960	A	V	U			EH	ES		EP														
			≥1960		V	U		St	EH	ES																
Orsodacnidae																										
Orsodacne																										
<i>cerasi</i> (Linnaeus, 1758)	NT	80	<1960		V																					
			≥1960		V				EH																	
Chrysomelidae																										
Macrolepa																										
<i>appendiculata</i> (Panzer, 1794)	LC	60	<1960			U				ES				PS		KP						KiL				
			≥1960		V				EH				PH		PK					Ks				EnL		
<i>mutica</i> (Fabricius, 1792)	LC	20	<1960	A	V	U		St				EP			KP		OP									
			≥1960	A	V	U	EK	St				EP					OP							EnL		
<i>pubipennis</i> (Reuter, 1875)	VU	60	<1960	A	V	U						EP			KP		OP									
			≥1960	A	V	U	EK	St				EP					OP									
Donacia																										
<i>clavipes</i> Fabricius, 1792	LC	6	<1960	A	V	U	EK	St	EH	ES	LK	EP	PH	PS	PK	KP	Kn	OP		Ks						
			≥1960	A	V	U	EK	St	EH	ES	LK	EP	PH	PS	PK	KP		OP								
<i>crassipes</i> Fabricius, 1775	LC	4	<1960	A	V	U	EK	St	EH	ES		EP	PH	PS	PK	KP	Kn	OP		Ks						
			≥1960	A	V	U	EK	St	EH	ES		EP	PH	PS	PK		Kn	OP		Ks						
<i>dentata</i> Hoppe, 1795	LC	15	<1960		V	U	EK	St	EH	ES		EP		PS	PK	KP			PeP							
			≥1960		V	U	EK	St	EH	ES	LK		PH	PS	PK		Kn		PeP							
<i>versicolorea</i> (Brahm, 1790)	LC	15	<1960	A	V	U	EK	St	EH	ES		EP	PH	PS	PK	KP		OP	PeP							
			≥1960		V	U	EK	St	EH	ES	LK	EP		PS	PK				PeP							
<i>semicuprea</i> Panzer, 1796	RE	100*	<1960							ES																
			≥1960																							
<i>fennica</i> (Paykull, 1800)	LC	60	<1960			U		St	EH	ES			PH													
			≥1960			U	EK	St	EH																	
<i>sparganii</i> Ahrens, 1810	LC	20	<1960		V	U			EH	ES			PH	PS	PK	KP	Kn	OP								
			≥1960		V		EK	St	EH	ES	LK		PH	PS	PK											
<i>aquatica</i> (Linnaeus, 1758)	LC	2	<1960	A	V	U	EK	St	EH	ES	LK	EP	PH	PS	PK	KP	Kn	OP	PeP	Ks	KiL	SoL		InL		
			≥1960	A	V	U	EK	St	EH	ES	LK	EP	PH	PS	PK	KP	Kn	OP	PeP	Ks	KiL	SoL	EnL	InL		
<i>impressa</i> Paykull, 1799	LC	6	<1960	A	V	U	EK	St	EH	ES	LK	EP	PH	PS	PK	KP										
			≥1960		V	U	EK	St	EH	ES		EP	PH	PS	PK	KP			PeP							

Gastrophysa

<i>polygona</i> (Linnaeus, 1758)	LC	6	<1960	A	V	U	EK	St	EH	ES	LK	EP	PH	PS	PK	Kn	OP	PeP	Ks	KiL	SoL		
			≥1960	A	V	U	EK	St	EH	ES	LK	EP	PH		PK	Kn	OP	PeP					InL
<i>viridula</i> (DeGeer, 1775)	LC	6	<1960						ES						PK	Kn		PeP	Ks				
			≥1960												PK	Kn	OP	PeP	Ks	KiL	SoL		InL

Phaedon

<i>cochleariae</i> (Fabricius, 1792)	LC	4	<1960	A	V	U		St	EH	ES	LK	EP	PH	PS	PK			PeP				EnL	
			≥1960		V	U	EK	St	EH	ES	LK	EP	PH		PK	Kn	OP	PeP					
<i>armoraciae</i> (Linnaeus, 1758)	LC	4	<1960	A	V	U	EK	St	EH	ES	LK	EP	PH	PS	PK	Kn	OP	PeP	Ks	KiL	SoL		InL
			≥1960	A	V	U	EK	St	EH	ES	LK	EP	PH	PS	PK	Kn	OP	PeP	Ks	KiL	SoL		
<i>concinus</i> (Stephens, 1831)	LC	6	<1960	A	V	U	EK	St	EH	ES	LK	EP	PH	PS	PK	Kn	OP	PeP	Ks	KiL	SoL	EnL	InL
			≥1960		V		EK	St	EH	ES		EP	PH		PK	Kn	OP	PeP	Ks	KiL	SoL		InL

Hydrothassa

<i>glabra</i> (Herbst, 1783)	EN	80	<1960	A	V	U		St	EH	ES	LK	EP	PH	PS	PK	Kn							
			≥1960	A		U	EK			ES	LK		PH	PS	PK	Kn							
<i>marginella</i> (Linnaeus, 1758)	LC	2	<1960	A	V	U	EK	St	EH	ES	LK	EP	PH	PS	PK	Kn	OP	PeP	Ks	KiL	SoL		InL
			≥1960	A	V	U	EK	St	EH	ES		EP	PH	PS	PK	Kn	OP	PeP	Ks		SoL		
<i>hannoveriana</i> (Fabricius, 1775)	NT	40	<1960		V	U		St	EH	ES			PH	PS	PK	Kn	OP			KiL			
			≥1960		V	U		St	EH	ES	LK				PK		OP						

Prasocuris

<i>phellandrii</i> (Linnaeus, 1758)	LC	6	<1960	A	V	U	EK	St	EH	ES		EP	PH	PS	PK	Kn	OP			KiL			
			≥1960	A	V	U	EK	St	EH	ES	LK		PH	PS		Kn	OP						

Plagiodes

<i>versicolora</i> (Laicharting, 1781)	LC	1	<1960	A	V	U	EK	St	EH	ES	LK	EP	PH	PS	PK	Kn	OP	PeP	Ks	KiL	SoL	EnL	InL
			≥1960	A	V	U	EK	St	EH	ES	LK	EP	PH	PS	PK	Kn	OP	PeP	Ks	KiL	SoL	EnL	InL

Chrysomela

<i>cuprea</i> Fabricius, 1775	NT	60	<1960		V	U			EH				PH		PK	Kn			Ks				InL
			≥1960		U			EH											Ks				InL
<i>lapponica</i> Linnaeus, 1758	LC	30	<1960		V	U		St	EH	ES	LK	EP	PH	PS	PK		OP		Ks	KiL	SoL	EnL	InL
			≥1960		V	U	EK	St	EH	ES		EP	PH	PS		Kn	OP		Ks	KiL	SoL	EnL	InL
<i>collaris</i> Linnaeus, 1758	LC	15	<1960	A	V	U		St	EH	ES	LK	EP	PH	PS	PK	Kn	OP	PeP	Ks	KiL	SoL	EnL	InL
			≥1960	A	U			EH	ES		EP	PH	PS		Kn	OP	PeP	Ks			EnL	InL	
<i>vigintipunctata</i> (Scopoli, 1763)	LC	30	<1960																				
			≥1960		U	EK		EH	ES	LK	EP	PH		PK									
<i>populi</i> Linnaeus, 1758	LC	2	<1960	A	V	U	EK	St	EH	ES	LK	EP	PH	PS	PK	Kn	OP	PeP					InL
			≥1960	A	V	U	EK	St	EH	ES	LK	EP	PH	PS	PK	Kn	OP	PeP		KiL			
<i>tremula</i> Fabricius, 1787	LC	6	<1960	A	V	U	EK	St	EH	ES	LK	EP	PH	PS	PK		OP	PeP				EnL	
			≥1960	A	V	U	EK	St	EH	ES				PS	PK	Kn	OP			KiL		InL	
<i>saliceti</i> (Weise, 1884)	NA	100	<1960			U																	
			≥1960				EK																

Plagiosterna

<i>aenea</i> (Linnaeus, 1758)	LC	6	<1960	A	V	U	EK	St	EH	ES	LK	EP	PH	PS	PK	Kn	OP	PeP	Ks	KiL	SoL		
			≥1960	A	V	U	EK	St	EH	ES		EP	PH	PS	PK	Kn	OP		Ks				

Gonioctena

<i>flavicornis</i> (Suffrian, 1851)	VU	80	<1960		V			St	EH						PK			PeP	Ks				
			≥1960						ES									PeP					
<i>viminalis</i> (Linnaeus, 1758)	LC	2	<1960	A	V	U	EK	St	EH	ES	LK	EP	PH	PS	PK	Kn	OP	PeP	Ks	KiL	SoL		InL
			≥1960	A	V	U	EK	St	EH	ES	LK	EP	PH	PS	PK	Kn	OP	PeP	Ks	KiL		InL	
<i>decemnotata</i> (Marsham, 1802)	LC	4	<1960	A	V	U	EK	St	EH	ES	LK		PH	PS	PK	Kn	OP	PeP	Ks				
			≥1960		V	U	EK	St	EH	ES		EP	PH	PS	PK	Kn	OP						
<i>linnaeana</i> (Schranck, 1781)	LC	15	<1960			U			ES		EP		PS					PeP	Ks	KiL	SoL	EnL	InL
			≥1960										PS					PeP	Ks	KiL	SoL	EnL	InL
<i>arctica</i> Mannerheim, 1853	LC	10	<1960							LK								PeP	Ks	KiL	SoL	EnL	InL
			≥1960															PeP	Ks	KiL	SoL	EnL	InL
<i>sundmani</i> (Jacobson, 1901)		100	<1960																				
			≥1960																Ks				

tabidus (Fabricius, 1775)	NT	60	<1960	V	U			ES															
			≥1960			U	EK		EH	ES													
lycopi (Foudras, 1860)	RE	100*	<1960	V	U		St	EH															
			≥1960																				
melanocephalus (DeGeer, 1775)	LC	4	<1960	A	V	U	EK	St	EH	ES	LK	EP	PH	PS	PK	Kn							
			≥1960	A	V	U	EK	St	EH	ES	LK	EP	PH		PK		Kn						
kutscherae (Rye, 1872)	LC	40	<1960																				
			≥1960	A	V	U	EK		EH	ES			PH		PK								
curtus (Allard, 1861)	NT	80	<1960	A	V	U		St	EH	ES				PS	PK								
			≥1960		V	U	EK		EH	ES			PH		PK								
exsoletus (Linnaeus, 1758)	NA	100	<1960																				
			≥1960	A	V																		
lewisii Baly, 1874	LC	20	<1960																				
			≥1960		V	U	EK	St	EH	ES	LK		PH		PK								
pratensis (Panzer, 1794)	LC	40	<1960	A	V							EP											
			≥1960	A	V	U																	
reichei (Allard, 1860)		40	<1960	A	V	U																	
			≥1960	A	V	U			EH														
longiseta Weise, 1889	LC	20	<1960		V	U		EH	ES	LK													
			≥1960	A	V	U	EK	St	EH	ES	LK												
ganglbaueri Heikertinger, 1912	LC	40	<1960		U			EH															
			≥1960	A	V	U	EK	St	EH				PH										
atricillus (Linnaeus, 1761)	LC	15	<1960	A	V	U	EK	St		ES			PH	PS	PK								
			≥1960	A	V	U	EK	St	EH		LK		PH										
suturellus (Duftschmid, 1825)	LC	6	<1960	A	V	U		EH	ES			PH											
			≥1960	A	V	U	EK	St	EH	ES	LK	EP	PH	PS	PK		Kn						
nasturtii (Fabricius, 1792)	LC	4	<1960	A	V	U		EH	ES	LK	EP	PH	PS	PK									
			≥1960	A	V	U	EK	St	EH	ES	LK		PH		PK	Kn	OP						
apicalis (Beck, 1817)	VU	60	<1960	A	V	U		St	EH	ES			PH	PS	PK	Kn							
			≥1960			EK		EH	ES		EP	PH			Kn								
holsaticus (Linnaeus, 1758)	LC	6	<1960	A	V	U		St	EH	ES		EP	PH	PS	PK	Kn	OP	PeP	Ks				
			≥1960	A		U	EK	St	EH	ES	LK	EP	PH	PS	PK	Kn	OP		KS	KiL	SoL	EnL	
luridus (Scopoli, 1763)	LC	4	<1960	A	V	U	EK	St	EH	ES	LK	EP	PH	PS	PK	Kn	OP	PeP		KiL			
			≥1960	A	V	U	EK	St	EH	ES	LK	EP	PH	PS	PK	Kn	OP	PeP					
fulgens (Foudras, 1860)	VU	100	<1960		V	U			ES														
			≥1960		U							PH											
brunneus (Duftschmid, 1825)	LC	40	<1960	A	V	U		EH	ES														
			≥1960	A	V	U		EH											PeP				
nigerrimus (Gyllenhal, 1827)	LC	40	<1960	A	V	U		St	EH	ES	LK			PK									
			≥1960		V	U	EK		EH		LK		PH		PK		PeP		KiL				
parvulus (Paykull, 1799)	VU	80	<1960	A	V	U	EK	St	EH	ES													
			≥1960		U	EK																	
Altica																							
aenesens Weise, 1888	VU	80	<1960				EK		ES	LK													
			≥1960			EK		ES	LK														
lythri Aubé, 1843	LC	10	<1960		V	U	EK	St	EH	ES	LK				KP		OP	PeP					
			≥1960	A	V	U	EK	St	EH	ES	LK	EP			PK	Kn	OP	PeP		KiL			
carduorum (Guérin-Ménév., 1858)	NA	100	<1960																				
			≥1960												PK								
quercetorum Foudras, 1860	NA	100*	<1960																				
			≥1960		U																		
tamaricis Schrank, 1785	LC	80	<1960														PeP			SoL			
			≥1960																		KiL	SoL	
engstromi J.Sahlberg, 1893	LC	40	<1960		U									KP		OP							
			≥1960		V	U	EK		EH	ES								PeP					
oleracea (Linnaeus, 1758)	LC	10	<1960	A	V	U		St	EH	ES	LK	EP	PH	PS	PK	Kn	OP	PeP	Ks	KiL			InL
			≥1960	A	V	U	EK		EH	ES		EP	PH	PS	PK		Kn	OP	PeP	Ks			

Platyrrhinus

<i>resinosus</i> (Scopoli, 1763)	NT	40	<1960	A	V	U		St	EH	ES				PH		PK	KP		OP	PeP						
			≥1960			U	EK		EH	ES	LK				PS	PK						Ks	KiL	SoL		

Platystomos

<i>albinus</i> (Linnaeus, 1758)	LC	2	<1960	A	V	U	EK	St	EH	ES	LK	EP	PH	PS	PK	KP	Kn	OP				KiL				
			≥1960	A	V	U	EK	St	EH	ES	LK	EP	PH	PS	PK	KP	Kn	OP	PeP			KiL	SoL			

Anthrribus

<i>fasciatus</i> Forster, 1771	RE	100*	<1960		V			St				EP														
			≥1960																							

<i>scapularis</i> Gebler, 1833	LC	20	<1960		V			St	EH	ES	LK	EP	PH		PK	KP		OP				KiL	SoL			
			≥1960		V	U	EK	St	EH			EP	PH		PK	KP	Kn	OP	PeP			KiL	SoL	EnL		

<i>nebulosus</i> Forster, 1771	LC	4	<1960	A	V	U	EK	St	EH	ES	LK	EP	PH	PS	PK	KP		OP	PeP	Ks					InL
			≥1960	A	V	U	EK	St	EH	ES	LK	EP	PH	PS	PK	KP	Kn	OP	PeP			KiL	SoL		

Araecerus

<i>fasciculatus</i> (DeGeer, 1775)		i	<1960			i																				
			≥1960																							

Choragus

<i>sheppardi</i> Kirby, 1819	VU	100*	<1960																							
			≥1960		V																					

Attelabidae

Temnocerus

<i>nanus</i> (Paykull, 1792)	LC	4	<1960	A	V	U		St	EH	ES	LK	EP	PH	PS	PK	KP		OP	PeP						
			≥1960	A	V	U	EK	St	EH	ES	LK	EP	PH	PS	PK	KP	Kn	OP	PeP						

<i>coeruleus</i> (Fabricius, 1798)	LC	6	<1960	A	V	U	EK	St	EH	ES	LK	EP	PH	PS	PK	KP		OP	PeP						
<i>tomentosus</i> (Gyllenhal, 1839)			≥1960	A	V	U	EK	St	EH	ES	LK	EP	PH	PS	PK	KP	Kn	OP	PeP						

<i>longiceps</i> (Thomson, 1888)	LC	6	<1960	A		U			EH	ES	LK	EP	PH		PK			OP	PeP						
			≥1960		V	U	EK	St	EH	ES	LK	EP			PK	KP	Kn	OP	PeP	Ks					

Neocoenorrhinus

<i>germanicus</i> (Herbst, 1797)	LC	15	<1960	A	V	U			EH	ES	LK			PS	PK			OP							
			≥1960	A	V	U	EK	St	EH	ES	LK			PS	PK										

<i>aequatus</i> (Linnaeus, 1767)	LC	30	<1960		V	U																			
			≥1960	A	V	U																			

Involvulus (Rhynchites)

<i>cupreus</i> (Linnaeus, 1758)	LC	6	<1960	A	V	U	EK	St	EH	ES	LK		PH	PS	PK			OP							
			≥1960	A	V	U	EK	St	EH	ES	LK	EP	PH	PS	PK										

Byctiscus

<i>betulae</i> (Linnaeus, 1758)	LC	4	<1960	A	V	U	EK	St	EH	ES	LK	EP	PH	PS	PK	KP	Kn	OP	PeP	Ks					
			≥1960	A	V	U	EK	St	EH	ES	LK	EP	PH	PS	PK	KP	Kn	OP	PeP	Ks					

<i>populi</i> (Linnaeus, 1758)	LC	4	<1960	A	V	U	EK	St	EH	ES	LK	EP	PH	PS	PK	KP	Kn	OP	PeP			KiL			
			≥1960		V	U	EK	St	EH	ES	LK	EP	PH	PS	PK	KP	Kn		PeP			KiL	SoL		

Caenorhinus (Deporaus (part.))

<i>mannerheimii</i> (Hummel, 1823)	LC	10	<1960		V	U		St	EH	ES	LK		PH	PS	PK										
			≥1960		V	U	EK	St	EH	ES	LK	EP	PH	PS	PK			Kn							

Deporaus

<i>betulae</i> (Linnaeus, 1758)	LC	1	<1960	A	V	U	EK	St	EH	ES	LK	EP	PH	PS	PK	KP	Kn	OP	PeP	Ks	KiL	SoL	EnL	InL
			≥1960	A	V	U	EK	St	EH	ES	LK	EP	PH	PS	PK	KP	Kn	OP	PeP	Ks	KiL	SoL	EnL	InL

Apoderus

<i>coryli</i> (Linnaeus, 1758)	LC	6	<1960	A	V	U		St	EH	ES	LK	EP	PH	PS	PK	KP	Kn	OP							
			≥1960		V	U	EK	St	EH	ES	LK	EP	PH	PS	PK			OP				KiL			

Brentidae

Omphalapion

<i>laevigatum</i> (Paykull, 1792)	RE	100*	<1960	A	V		EK	St																	
			≥1960																						

<i>hookerorum</i> (Kirby, 1808)	LC	4	<1960	A	V	U	EK	St	EH	ES	LK	EP	PH	PS	PK	KP		OP	PeP						
			≥1960	A	V	U	EK	St	EH	ES	LK	EP	PH	PS	PK	KP	Kn								

Bothrynoderes

affinis (Schrank, 1781)	NT	80	<1960	A	U														
			≥1960	A	V	U													

Cyphocleonus

trisolcatus (Herbst, 1795)	RE	100*	<1960					ES											
			≥1960																

Cleonis

pigra (Scopoli, 1763)	LC	20	<1960	A	V	U	EK	St	EH	ES	LK			PS	PK		Kn		
			≥1960	A	V	U	EK		EH	ES	LK			PS	PK				

Gronops

inaequalis Boheman, 1842	LC	40	<1960	A	U				ES										
			≥1960	A	V	U	EK	St											

Brachypera (Hypera (part.))

zoilus (Scopoli, 1763)	LC	40	<1960	A	V	U													
			≥1960	A	V	U													

dauci (Olivier, 1807)	NA	100	<1960																
			≥1960				EK												

Hypera

conmaculata (Herbst, 1795)	LC	6	<1960	A	V	U		St	EH	ES	LK	EP	PH	PS	PK			PeP	
<i>pollux (Fabricius, 1796)</i>			≥1960		V	U	EK	St	EH	ES	LK		PH	PS	PK	KP	Kn	PeP	KiL

rumicis (Linnaeus, 1758)	LC	6	<1960	A	V	U	EK	St	EH	ES	LK	EP	PH	PS	PK	KP	Kn	OP	PeP
			≥1960	A	V	U	EK	St	EH	ES	LK	EP	PH	PS	PK		Kn		KiL

meles (Fabricius, 1792)	LC	6	<1960	A	V	U		St	EH	ES	LK	EP	PH			KP			
			≥1960	A	V	U	EK	St	EH	ES	LK	EP		PS	PK	KP		OP	

fornicata (Penecke, 1928)	LC	10	<1960						EH		LK	EP			PK	KP			
			≥1960				U	EK	EH	ES	LK		PH	PS	PK	KP		OP	PeP

arator (Linnaeus, 1758)	LC	10	<1960	A	V	U	EK	St	EH	ES	LK	EP	PH	PS	PK		Kn	OP	PeP
			≥1960	A	V	U	EK	St	EH	ES	LK	EP	PH	PS	PK	KP		PeP	Ks

diversipunctata (Schrank, 1798)	LC	60	<1960		V	U			EH	ES									
			≥1960				EK		EH	ES	LK								

miles (Paykull, 1792)	LC	2	<1960	A	V	U		St	EH	ES	LK	EP	PH	PS	PK	KP		OP	
<i>suspiciosa (Herbst, 1795)</i>			≥1960	A	V	U	EK	St	EH	ES	LK	EP	PH	PS	PK	KP	Kn	OP	PeP

ornata (Capiomont, 1868)	NT	100	<1960																EnL
<i>obovata (Csiki, 1934)</i>			≥1960																EnL

denominanda (Capiomont, 1868)	LC	60	<1960	A							LK								
			≥1960	A	V				ES	LK			PS	PK					

postica (Gyllenhal, 1813)	NT	60	<1960	A	U		St								KP				
			≥1960	A	U														

plantaginis (DeGeer, 1775)	LC	60	<1960	A	U														
			≥1960	A	U	EK													

nigrirostris (Fabricius, 1775)	LC	2	<1960	A	V	U	EK	St	EH	ES	LK	EP	PH	PS	PK	KP	Kn	OP	PeP
			≥1960	A	V	U	EK	St	EH	ES	LK	EP	PH	PS	PK	KP	Kn	OP	PeP

viciae (Gyllenhal, 1813)	LC	40	<1960					St	EH										
			≥1960	A													OP	PeP	

Limobius

borealis (Paykull, 1792)	LC	40	<1960	A	V	U			EH						PK				Ks
			≥1960	A	V	U	EK		ES		EP			PK				PeP	KiL

Ellescus

scanicus (Paykull, 1792)	LC	20	<1960		V	U			ES	LK								PeP	
			≥1960		V	U	EK		EH	ES		EP							

bipunctatus (Linnaeus, 1758)	LC	6	<1960	A	V	U		St	EH	ES	LK	EP	PH	PS	PK	KP	Kn	OP	PeP
			≥1960		V	U	EK	St	EH	ES	LK	EP	PH	PS	PK	KP	Kn	OP	PeP

Dorytomus

tremulae (Fabricius, 1787)	LC	10	<1960	A	V	U			EH	ES	LK					KP			
			≥1960		V	U	EK		EH	ES	LK	EP	PH	PS	PK		Kn	OP	PeP

tortrix (Linnaeus, 1761)	LC	6	<1960	A	V	U	EK	St	EH	ES		EP	PH	PS	PK	KP		OP	
			≥1960	A	V	U	EK		EH	ES	LK	EP	PH	PS	PK	KP		OP	PeP

Cryptorhynchus

lapathi (Linnaeus, 1758)	LC	4	<1960	A	V	U	St	EH	ES	LK	EP	PH	PS	PK	KP	Kn	OP	PeP	Ks	KiL			InL
			≥1960	A	V	U	EK	St	EH	ES	LK	EP	PH	PS	PK	KP	Kn	OP	PeP	Ks	KiL		EnL

Acalles

echinatus (Germar, 1824)	LC	30	<1960	A	V	U																	
			≥1960	A	V	U	EK																

Baris

artemisiae (Panzer, 1794)	LC	60	<1960		V																		
			≥1960		V		EK		EH	ES													

Limnobaris

t-album (Linnaeus, 1758)	LC	10	<1960		V			EH			EP		PS		KP		OP	PeP	Ks				
			≥1960	A	V	U		St	EH	ES		EP	PH		PK	KP	Kn	OP	PeP	Ks			

dolorosa (Goeze, 1777)	LC	2	<1960	A	V	U	EK	St	EH	ES	LK	EP	PH	PS	PK	KP	Kn	OP	PeP	Ks	KiL			
<i>pilistriata</i> (Stephens, 1831)			≥1960	A	V	U	EK	St	EH	ES	LK	EP	PH	PS	PK	KP	Kn	OP	PeP	Ks	KiL	SoL	EnL	InL

Eubrychius

velutus (Beck, 1817)	LC	60	<1960	A	V	U	St													Ks			InL
			≥1960			U	EK	St											OP				

Phytobius

leucogaster (Marsham, 1802)	LC	40	<1960	A	V		St	EH	ES				PS				OP						
			≥1960		V	U	EK	St	EH	ES			PH		PK	KP		OP					

Pelenomus

commari (Panzer, 1795)	LC	10	<1960	A	V	U	St	EH	ES	LK	EP	PH	PS		KP		OP	PeP		KiL		EnL
<i>comari</i> (Herbst, 1795)			≥1960	A	V	U	EK	St	EH	ES	LK		PH		PK	KP		PeP				

waltoni (Boheman, 1843)	LC	60	<1960		V	U		EH															
			≥1960		V	U	EK		EH		LK				PK								

canaliculatus (Fåhraeus, 1843)	LC	30	<1960	A	V	U		EH		LK	EP				KP						KiL		
			≥1960	A	V	U		St	EH		LK		PH		PK	KP		OP	PeP				

quadrituberculatus (Fabr., 1787)	LC	6	<1960	A	V	U	St	EH	ES	LK	EP	PH	PS	PK		Kn				Ks			
			≥1960	A	V	U	EK	St	EH	ES	LK	EP	PH	PS	PK	KP	Kn		OP		Ks		

velaris (Gyllenhal, 1827)	LC	20	<1960		V	U		EH	ES		EP		PS	PK								SoL	InL	
			≥1960		V	U		St	EH	ES	LK	EP	PH	PS	PK	KP	Kn		PeP		KiL	SoL	EnL	InL

quadricorniger (Colonnelli, 1986)	NA	100	<1960																				
			≥1960								LK												

Neophytobius

muricatus (Bris. de Barn., 1867)	LC	80	<1960							LK				PK	KP								
			≥1960	A		U	EK		EH		LK			PS									

quadrinodosus (Gyllenhal, 1813)	VU	100	<1960	A	V	U			ES														
			≥1960	A																			

Rhinoncus

albicinctus Gyllenhal, 1837	NA	100	<1960																				
			≥1960			U			ES														

perpendicularis (Reich, 1797)	LC	6	<1960	A		U		EH	ES				PS				OP						
			≥1960	A	V	U	EK	St	EH	ES	LK		PH	PS	PK								

inconspectus (Herbst, 1795)	LC	30	<1960		V	U			ES	LK													
			≥1960	A	V	U	EK	St	EH		LK												

pericarpus (Linnaeus, 1758)	LC	2	<1960	A	V	U	St	EH	ES	LK	EP	PH	PS	PK	KP		OP						
			≥1960	A	V	U	EK	St	EH	ES	LK	EP	PH	PS	PK	KP	Kn	OP	PeP				

bruchoides (Herbst, 1784)	LC	6	<1960	A	V	U	St	EH	ES	LK	EP		PS	PK									
			≥1960	A	V	U	EK	St	EH	ES	LK		PH	PS	PK	KP		OP					

castor (Fabricius, 1792)	LC	1	<1960	A	V	U	St	EH	ES	LK		PH	PS	PK	KP	Kn	OP	PeP	Ks	KiL			InL	
			≥1960	A	V	U	EK	St	EH	ES	LK	EP	PH	PS	PK	KP	Kn	OP	PeP	Ks	KiL	SoL	EnL	InL

Auleutes

epilobii (Paykull, 1800)	LC	2	<1960	A	V	U	St	EH	ES	LK	EP	PH	PS	PK	KP	Kn	OP	PeP	Ks				
			≥1960	A	V	U	EK	St	EH	ES	LK	EP	PH	PS	PK	KP	Kn	OP	PeP	Ks			

Microplontus (Ceutorhynchus (part.))

rugulosus (Herbst, 1795)	LC	60	<1960	A	V	U																	
			≥1960	V	U	EK		ES	LK														
melanostigma (Marsham, 1802)	NT	80	<1960																				
			≥1960	A																			
triangulum (Boheman, 1845)	LC	10	<1960	V	U	EK		EH	ES	LK		PH	PS	PK									
			≥1960	V	U	EK	St	EH	ES	LK	EP	PH		PK	KP	OP							
campestris (Gyllenhal, 1837)	LC	60	<1960																				
			≥1960			EK		ES	LK														

Hadroplontus (Ceutorhynchus (part.))

litura (Fabricius, 1775)	LC	6	<1960	A	V	U		EH	ES		EP		PS									
			≥1960	A	V	U	EK	St	EH	ES	LK	EP	PH	PS	PK	KP	Kn					

Mogulones (Ceutorhynchus (part.))

pallidicornis Gougelet & Bris., 1860	VU	100	<1960																				
			≥1960			U																	
asperifoliarum (Gyllenhal, 1813)	EN	100	<1960	A																			
			≥1960						ES	LK													
larvatus (Schultze, 1897)	NT	80	<1960	V	U																		
			≥1960	V	U																		

Sirocalodes

depressicollis (Gyllenhal, 1813)	LC	20	<1960	A	V	U		EH	ES	LK			PS		KP			PeP					
			≥1960	A	V	U	EK		EH	ES	LK		PH										
quercicola (Paykull, 1792)	LC	30	<1960	A	V	U		St	EH	LK			PS										
			≥1960	A	V	U	EK	St	EH	LK		PH		PK	KP								

Calosirus

apicalis (Gyllenhal, 1827)	LC	30	<1960			U		EH														
			≥1960	V	U	EK	St	EH	LK				PK			PeP						

Trichosirocalus

troglodytes (Fabricius, 1787)	LC	40	<1960	A	V	U																	
			≥1960	A	V																		
barnevillei (Grenier, 1866)	LC	15	<1960	A	V	U		EH	ES	LK	EP		PS	PK	KP								
			≥1960	V	U	EK	St	EH	ES	LK	EP	PH		PK	KP								

Nedyus

quadrimaculatus (Linnaeus, 1758)	LC	4	<1960	A	V	U	EK	St	EH	ES	LK	EP	PH	PS	PK	KP	Kn	OP	PeP				
			≥1960	A	V	U	EK	St	EH	ES	LK	EP	PH	PS	PK	KP	Kn	OP	PeP	Ks		SoL	

Orobitis

cyaneus (Linnaeus, 1758)	LC	4	<1960	A	V	U		St	EH	ES	LK	EP	PH	PS	PK	KP	Kn	OP		Ks			
			≥1960	A	V	U	EK	St	EH	ES	LK	EP	PH		PK	KP	Kn	OP					

Hylurgops

glabratus (Zetterstedt, 1828)	LC	2	<1960	V	U	EK	St	EH	ES	LK	EP	PH	PS	PK	KP	Kn	OP	PeP	Ks	KiL	SoL		InL
			≥1960	V	U		St	EH	ES		EP	PH	PS	PK	KP	Kn	OP	PeP	Ks	KiL	SoL	EnL	InL
palliatu (Gyllenhal, 1813)	LC	2	<1960	A	V	U	EK	St	EH	ES	LK	EP	PH	PS	PK	KP	Kn	OP	PeP	Ks	KiL		
			≥1960	A	V	U	EK	St	EH	ES	LK	EP	PH	PS	PK	KP	Kn	OP	PeP	Ks	KiL	SoL	

Hylastes

brunneus Erichson, 1836	LC	1	<1960	A	V	U	EK	St	EH	ES	LK	EP	PH	PS	PK	KP	Kn	OP	PeP	Ks	KiL	SoL	EnL	InL
			≥1960	A	V	U	EK	St	EH	ES	LK	EP	PH	PS	PK	KP	Kn	OP	PeP	Ks	KiL	SoL	EnL	InL
cunicularius Erichson, 1836	LC	1	<1960	A	V	U	EK	St	EH	ES	LK	EP	PH	PS	PK	KP	Kn	OP	PeP	Ks	KiL	SoL	EnL	InL
			≥1960	A	V	U	EK	St	EH	ES	LK	EP	PH	PS	PK	KP	Kn	OP	PeP	Ks	KiL	SoL	EnL	InL
attenuatus Erichson, 1836	NA	100	<1960																					
			≥1960			V																		
angustatus (Herbst, 1793)	NA	100a	<1960																					
			≥1960			U																		
opacus Erichson, 1836	LC	4	<1960	A	V	U		St	EH	ES	LK		PH	PS	PK	KP	Kn							
			≥1960	A	V	U	EK	St	EH	ES	LK		PH	PS	PK	KP	Kn	OP	PeP	Ks		SoL		

